

BREVI NOTE

GIOVANNI CUMBO

DOPPIA NIDIFICAZIONE DELLA RONDINE ROSSICCIA
CECROPIS DAURICA (LAXMANN, 1769) (*Aves Hirundinidae*) IN SICILIA

Double breeding of Red-rumped Swallow Cecropis daurica (Laxmann, 1769) (Aves Hirundinidae) in Sicily

La Rondine rossiccia *Cecropis daurica* in Italia è un migratore transahariano poco comune; si osservano piccoli numeri soprattutto in primavera. Nell'isola di Ustica, tra marzo ed aprile 2014 e 2015, osservati da 2-5 a 10 individui al giorno. Frequenta ambienti rocciosi e scogliere. Rara e localizzata in Italia, nidifica su sporgenze rocciose o in manufatti quali ponti e abitazioni. In Italia si riproduce solo in poche regioni, perlopiù con coppie isolate, tranne un caso in Calabria (BRICHETTI & FRACASSO, 2007; URSO & MINGOZZI, 2009); la popolazione complessiva italiana, in recente espansione, rimane comunque molto piccola. Ha colonizzato anche la Sicilia, ove è riportata come nidificante irregolare in 8 quadranti 10x10 km distribuiti tra le provincie di Agrigento, Siracusa e Trapani (IENTILE & MASSA, 2008). La Rondine rossiccia è inserita nella Lista Rossa Nazionale (PERONACE *et al.*, 2011), è specie esclusivamente insettivora, sensibile alle pratiche agricole intensive e all'uso di insetticidi.

Nel giugno del 2014 la nidificazione di questa specie è stata segnalata anche in provincia di Palermo, ove la riproduzione è stata portata a termine nel mese di settembre (CUMBO, 2014).

Nel 2015 la coppia di Rondini rossicce è tornata a nidificare nello stesso sito dell'anno precedente (all'interno di un residence in località Buonfornello), utilizzando il nido costruito nel 2014. Il primo avvistamento è avvenuto l'8 giugno, quando la coppia veniva osservata intenta ad entrare ed uscire frequentemente dal nido, segno della presenza della nidiate. Il 19 giugno si notava la presenza di almeno quattro individui nelle vicinanze del nido, con imbeccata di un adulto in volo. Il 20 giugno venivano osservate sei rondini rossicce, la coppia con i giovani involati, entrare in serata al nido per trascorrervi la notte; la nidificazione si poteva ritenere conclusa.

Tuttavia, il 15 luglio la coppia di Rondini rossicce riprendeva le attività riproduttive con ingressi frequenti al nido. Il 24 luglio veniva accertata la presenza di nidifici all'interno del nido, da cui si udivano i versi di richiamo. Il 14 agosto è stato possibile osservare l'ingresso serale al nido di sei individui, la coppia di adulti e quattro giovani, constatando così la seconda nidificazione della stagione avvenuta con successo.

Si tratta del secondo anno di nidificazione della Rondine rossiccia, nello stesso sito e nello stesso nido del primo anno; l'aspetto ulteriormente interessante è stato l'accertamento di una doppia nidificazione, nota nell'areale della specie (CRAMP, 1988; TURNER, 1989), ma che finora non risulta sia stata esplicitamente indicata per l'Italia (BRICHETTI & FRACASSO, 2007).

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2007. Ornitologia Italiana. 4. Apodidae-Prunellidae. *A. Perdisa*, Bologna, 441 pp.
- CRAMP S. (ed.), 1988. The Birds of the Western Palearctic. Vol. V. *Oxford Univ. Press*, Oxford, 1063 pp.
- CUMBO G., 2014. Nidificazione di rondine rossiccia *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769) in provincia di Palermo. *Naturalista sicil.*, 38: 389-390.
- IENTILE R. & MASSA B., 2008. Uccelli (Aves). Pp. 115-211 in: AA.VV., Atlante della biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. *ARPA Sicilia*, Palermo.
- PERONACE V., CECERE J., GUSTIN M. & RONDININI C., 2012. Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia. *Avocetta*, 36: 11-58.
- TURNER A., 1989. A handbook to the Swallows and Martins. *C. Helm*, London, 258 pp.
- URSO S. & MINGOZZI T., 2009. "Colonia" riproduttiva di Rondine rossiccia *Cecropis daurica* in un borgo disabitato in Aspromonte (Calabria). Pp. 145-147 in: Atti XV Conv. ital. Orn., *Alula*, 16 (1-2).

Indirizzo dell'autore — G. CUMBO, via Tramontana, 28 - 90144 Palermo (I); e.mail: giovanni.cumbo@gmail.com