

VITTORIO EMANUELE ORLANDO

DESIGNAZIONE DI LECTOTYPI DELLE COLLEZIONI
DEL MUSEO REGIONALE DI TERRASINI (Palermo).
MOLLUSCA

RIASSUNTO

Si designano i *lectotypi* di *Eobania vermiculata* r. *prioloi* T. De Stefani, 1947 e di *Conus mediterraneus* v. *rufatra* A. De Gregorio, 1885.

SUMMARY

Designation of lectotypi in the collection of the Museo Regionale di Terrasini (Mollusca). The Author fixes the *lectotypi* of the following taxa: *Eobania vermiculata* r. *prioloi* De Stefani, 1947 and *Conus mediterraneus* v. *rufatra* A. De Gregorio, 1885.

Per motivi redazionali la presente nota va in stampa successivamente alla lista di ARNONE & ORLANDO (1993). Essa ha lo scopo di fissare i *lectotypi* di due Molluschi, ed esattamente due varietà (ex coll. T. De Stefani inglobata nella raccolta Orlando) ora conservate presso il Museo di Terrasini.

Poiché all'atto dell'istituzione dei nuovi taxa gli Autori non avevano identificato gli *holotypi*, gli esemplari delle serie originali devono essere considerati tutti *sintypi*.

Ho ritenuto quindi opportuno designare i *lectotypi*, selezionando l'esemplare più aderente alla diagnosi originale degli Autori.

La prima forma è istituita da DE STEFANI (1947) con una serie tipica composta da 44 esemplari; l'altra da DE GREGORIO (1885) formata da 30 esemplari confluita nella raccolta De Stefani in seguito ad eventi bellici. Tenuto con-

to dell'aleatorietà dei taxa segnalati come razza uno e come varietà l'altro, non sono entrato nel merito della loro validità.

Eobania vermiculata razza *prioloi* T. De Stefani, 1947

Diagnosi originale: *haec mutatio differt a specie typica his characteribus: dimensionibus constanter minoribus; forma depressiore; colore praecipue albo; exemplaria vittata rariora sunt; extremo anfractu extenso in postrema parte, qui in juvenibus, videtur inclinari raptim in basim* (DE STEFANI 1947:21).

Lectotypus: 29336 / 1 - TD VEO ora MRT

Paralectotypi: 29336 / 2/43 - idem

Locus typicus: collina ad ovest dell'abitato di Licata (AG)

Dimensioni (mm.)	altezza (H)	larghezza (L)	H/L
<i>lectotypus</i>	13,2	21	0,638
<i>paralectotypus</i> 2	12	20,1	0,597
<i>paralectotypus</i> 3	14,1	24,6	0,573

La moderna posizione sistematica è la seguente:

Famiglia *Helicidae*, Sottofamiglia *Helicinae*, Genere *Eobania*, specie *vermiculata* (MÜLLER, 1774).

Conus mediterraneus varietà *rufatra* A. De Gregorio, 1885

Diagnosi originale: è di color sordido, con fondo giallo rossastro che tende a farsi scuro seppia; è spesso incrostata (DE GREGORIO 1885:112).

Lectotypus: 30761 / 1 ADG TD VEO ora MRT

Paralectotypi: 30761 / 2/30 - idem

Locus typicus: zona delle spugne, Barberia (Mediterraneo)

Dimensioni (mm.)	altezza (H)	larghezza (L)	H/L
<i>lectotypus</i>	13	6,9	1,884
<i>paralectotypus</i> 2	13,9	7,6	1,828
<i>paralectotypus</i> 3	14,8	7,6	1,947

La moderna posizione sistematica è la seguente:

Famiglia *Conidae*, Genere *Conus*, specie *mediterraneus* (HWASS in BRUGUIERE, 1792).

ADG = ex coll. A. De Gregorio - MRT = coll. Museo Regionale di Terrasini - TD = ex coll. T. De Stefani - VEO = ex coll. V.E. Orlando.

BIBLIOGRAFIA

- ARNONE M. e ORLANDO V.E., 1993 — I tipi delle raccolte del Museo Regionale di Terrasini. V Contributo: *Mollusca (Gastropoda: Neotaenioglossa, Ptenoglossa, Neogastropoda, Saccoglossa, Stylommatophora)*. — *Naturalista sicil.*, Palermo, s. IV, 17: 255-263.
- DE GREGORIO A., 1885 — Altre varietà, forme e sottospecie dipendenti dal *C. mediterraneus* (Hwas) Brug. tipo — *Boll. Soc. malacol. ital.*, 11: 109-119.
- DE STEFANI T., 1947 — Studi geologici e paleontologici V. 1. — Palermo, *Tip. La Comm.*: 21, t. 1 f. 2,3.

Indirizzo dell'Autore — V.E. ORLANDO, Via Palermo 180 - 90049 TERRASINI (PA) (I).