



Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner har vært oppbevart i bibliotekshyller før den omhyggelig ble skannet av Google som del av et prosjekt for å gjøre verdens bøker tilgjengelige på nettet.

Den har levd så lenge at opphavretten er utløpt, og boken kan legges ut på offentlig domene. En offentlig domene-bok er en bok som aldri har vært underlagt opphavsrett eller hvis juridiske opphavrettigheter har utløpt. Det kan variere fra land til land om en bok finnes på det offentlige domenet. Offentlig domene-bøker er vår port til fortiden, med et vell av historie, kultur og kunnskap som ofte er vanskelig å finne fram til.

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som finnes i det originale eksemplaret, vises også i denne filen - en påminnelse om bokens lange ferd fra utgiver til bibliotek, og til den ender hos deg.

Retningslinjer for bruk

Google er stolt over å kunne digitalisere offentlig domene-materiale sammen med biblioteker, og gjøre det bredt tilgjengelig. Offentlig domene-bøker tilhører offentligheten, og vi er simpelthen deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, så for å kunne opprettholde denne tjenesten, har vi tatt noen forholdsregler for å hindre misbruk av kommersielle aktører, inkludert innføring av tekniske restriksjoner på automatiske søk.

Vi ber deg også om følgende:

- Bruk bare filene til ikke-kommersielle formål
Google Book Search er designet for bruk av enkeltpersoner, og vi ber deg om å bruke disse filene til personlige, ikke-kommersielle formål.
- Ikke bruk automatiske søk
Ikke send automatiske søker til Googles system. Ta kontakt med oss hvis du driver forskning innen maskinoversettelse, optisk tegngjenkjenning eller andre områder der tilgang til store mengder tekst kan være nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig domene-materiale til slike formål, og kan være til hjelp.
- Behold henvisning
Google- "vannmerket" som du finner i hver fil, er viktig for å informere brukere om dette prosjektet og hjelpe dem med å finne også annet materiale via Google Book Search. Venligst ikke fjern.
- Hold deg innenfor loven
Uansett hvordan du bruker materialet, husk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen at vår vurdering av en bok som tilhørende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken også er offentlig tilgjengelig for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt opphavrett, og vi kan ikke gi veileder knyttet til om en bestemt anvendelse av en bestemt bok, er tillatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker opp på Google Book Search kan brukes på hvilken som helst måte, hvor som helst i verden. Erstatningsansvaret ved brudd på opphavrettigheter kan bli ganske stort.

Om Google Book Search

Googles mål er å organisere informasjonen i verden og gjøre den universelt tilgjengelig og utnyttbar. Google Book Search hjelper leserne med å oppdage verdens bøker samtidig som vi hjelper forfattere og utgivere med å nå frem til nytt publikum. Du kan søke gjennom hele teksten i denne boken på <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

3 2044 106 415 268

T685L

W. G. FARLOW.

LICHENOGRAPHIA SIGULA

AUCTORE

FRANCESCO TORNABENE

BENEDICTINO - CASINENSI

IN R. STUDIORUM UNIVERSITATE CATANAE

BOTANICES ANTECESSORE

See gatta inem Giorn.
Bot. Ital. XIV. no. 4, 1807.

CATANÆ

TYPIS ACADEMIE JOENIE

APUD FELICEM SCIUTO
1849.

Xanthus



LECTURIS

Cum tanta Siciliae sit latitudo temperies telluris qualitas, ut arborum fruticum herbarumque copia agnoscatur, botanici ad fanerogamas et aeteogamas plantas recognoscendas sedulo incumbere omni tempore judicarunt, ibique novas invenire cupientes, novitate ac varietate animum oblectate.

Verum non puto cellulosas plantas seu cryptogamas Siciliae deserere, quod pro locorum natura et aeris opportunitate multa sint botanicis utilia; quare lichettes nostros colligere, adumbrare, ac describere curavi. Nam si voluptate adlecti ad frondes ac flores animum flectimus, cur ad lichenes qui magnitudine, forma, colore, et fructificatione sint varii non flectimus?

Quamvis enim istorum stationes humida sint loca, tamen in arida evascuntur quamplurimi illis numero ac bonitate aequales, ita ut vulcanica, calcaria, silicea saxa, arbores, musci, madida terra ubique habent suos; atque apud nos montes, et colles, abores, et planities illos possident, qui longissimas ac dissitas regiones incolunt, et aridi ac sicci in locis mari proximis ad meridiem versis observantur, dum frigidus in elatis sublimioribus ac humentibus regionibus jacent.

Igitur Lichenographiam Siculam conciuuavi, ubi non solum Siciliae verum etiam et insularum adiacentium lichenes in unaquaque regione collectos observavi ac disposui.

Aetnam montium Siciliae, magnitudine ac celsitudine maximum (pertingit enim ad 10213 pedes parisientes) primum perspexi, ac lichenes ibi inventos diligenter descripti; deinde Nembrodum aliarumque terrarum. Denique in conspectu generum et specierum omnium adlaboravi, ut facile quisque cernere possit quaenam ex naturae dono nobis proveniant.

Species quamplurimae depingere volui, usus opera Salvatoris Ceci, et Marii Sciuto. Veementer enim doleo quod fucatas magisquam veras tabulas quandoque clarissimi lichenum scriptores pree oculis habent. Nostrae autem figurae naturalem habitum, magnitudinem, colorem proferunt, et aliqua fructificationis organa consulta lente mihi sunt aucta. Habitus et colores valde sunt necessarii in lichenibus dignoscendis; ac characteres genericos ex thallo et apotheciis depromptos, specierum diagnosin, descriptionemque singulatim per organa diligenter effinxii. Synonyma brevitate contraxi, ne nimia eruditio obscuram redderet veritatem. Stationes autem notavi, habitationes, tempore quoisque ad fructificationem perveniant.

Angli, Galli, Suevi, Alemanni ceterique septentrionalis plagae botanici lichenibus student, et species eorum possident; meridionalis vero non parum interest istorum vegetabilium numerum varietatemque agnoscere ad geographiam botanicam, floram, et collectionem naturalium rerum cujuscumque regionis comprehendam.

❧

Lichenographiam ergo Siculam accipe benigne
laector, quam typis mandavero, et scientiae profu-
turam opinor.

Catanae die 20 agusti 1845 (1).

(1) Opus Septimo Italorum literatorum Conventu exhibitum,
xxi septembris mcccxlv Neapoli, et summatim in actibus ejus-
dem Conventus expositum. Vide Atti della 7. adunanza degli
Scienziati Italiani vol. 7 pag. 889 et seg. Napoli 1845 in fol.
Atti dell' Acc. Gioenia 2. Serie T. 2 pag. 369. Breve notizia
dei lavori fitognostici presentati al 7. Congresso degli Scien.
Italiani in Napoli dal P. D. Francesco Tornabene casinese.
Quadro storico della Botanica in Sicilia pag. 65. Catania 1847
in 8. per Fr. Tornabene della Congr. di Monte Casino.

LICHENES

Endlicher Gen. Plant. Vind. 1836—40 Cl. II Algae § 3.
Lichenes *Juss.* gen. 6. *Hoff.* En. lich. Desc. ed Adumbr. lich. Lips. 1798-99 vol. 3 f. *Acharius* Prodr. lich. 1798, 8.
 Meth. lich. Hamb. 1803-8. *Lichenum* Syn. Lundae 1814, 8.
Lichenogr. Univers. Götting. 1810, 4. *Fries* Act. Holm. *Lichenographia Europaea* refor. Lundae 1831, 8. *Eschweiller* Syst. lich. Norimber. 1824, 4. *Meyer* Über die Ent. der flecht. *Fée* Meth. lich. Paris 1825, 4. *Cryptog. des ècorc. exotiques* Paris 1825, 4. Dict. Class. ix 360. *Agardh* lichen. Univers. *Lamark et De-Candolle* Fl. fr. et *Synops. fl. gall. or.* iv pag. 68. *Duby* Bot. Gall. pars 2 or. cxix pag. 593. *Alph. DC.* Introd. à l' étud. de la Botaniq. fam. 203 pag. 354. *A. Rich.* Nouv. Elem. de Bot. fam. 3 pag. 171. *Linn.* Gen. Pl. 1202. Syst. veget. 1202 pag. 957. Sp. pl. pag. 1606. Syst. Nat. cur. Gm. 1202. *Tournefort* Inst. r. herb. 325 pag. 566. *Michel.* N. pl. gen. 36 - 53. *Dillenius* Hist. Musc. *Lichenoides* 124, *Coralloides* 75, *Usnea* 56.

« Plantae consistentia, colore, forma variae. saepe perennes, calidis temporibus torpentes, brumalibus et frigidis reviviscentes, virides aut in aqua virescentes, detritae colorem viridem in parte erosa exhibentes, saepius siccae et opacae, liquidum ambientem absorbentes et in totam substantiam spontaneè transvehentes.

Vegetationis organa sunt *Frondes* seu *Thalli* membranacei aut crustacei simplices aut lobati, nunc sublignosi aut filamentosi et ramescentes, nunc squamasi. denique pulverulentii; dupli strato constituti *corticale* et *medullare* seu *thallode* et *hypothalode*.

Organæ fructificationis sunt *Hypothecium* seu *Excipulum* et *Sporidium*. Hypothecia, quoad nexum cum thallo, variant *immersa* et *superficilia* seu *innata*, *adnata*, *sessilia* (in ambitu tota libera) ac *elevata*. Fulcrum apotheciorum a thallode formalium dicitur *podetium*, *podicellus*, aut *stipes*. Forma typica *Hypotheciorum* est *rotunda*, at raro *normalis*; tamen

oblonga, linearis, compositione passim ramosa (lirelliformis) occurrit. *Excipulum clausum dicitur peritecium; urceolatum excip.* valde excavatum, ambiū constrictum; *scutelliforme convexulum, elevato-marginalum; peltiforme dilatatum, planum absque margine prominente; cephaloideum convexum. marginem (passim reflexum) reprimentem; disciforme medium inter scutellatum et peltatum; tuberculatum medium inter disciforme et cephaloideum.* Hypothecia et Sporidia *Apothecia* constituant. Omnia apothecia thallode formata primitus sunt clausa, *Sporula* seu *Sporidia* in ascis continentia; deinde si status apothecii tam cito absolvitur, ut lamina jam primitus non clausa, ne marginibus quidem conniventibus sese offerat. *apothecia aperta* dicuntur; si vero lamina excavati excipuli (*nucleum*) disco est munita, *apothecia clausa* appellantur.

Habitatio. Lichenes per totum orbem sparsi, et norticis magis quam meridionalibus regionibus vulgarissimi.

Statio. Ad saxa cujuscumque naturae. super muscos et arbores, in elatis ac planis regionibus, semper ad humida et frigida loca, paucissimi ad sicca saxa adhaerentes, et hiemis tempore crescentes, apothecia et sporula ferentes.

I. UMBILICARIA

Endlich. Or. IX Idiothalami Trib. IV Pyxineae gen. 145 pag. 13. Fries lich. Europ. Or. I Gymnocarpi Tr. III Graph. gen. 18. Lud. Eman. Schaefer Lich. Europ. Meth. Art. cl. 1 lich. discoidei or. 3 patelliferae gen. 18. Meth. Nat. cl. 1 lich. discoid. or. 5 Umbil. gen. 9.

Thallus coriaceus aut cartilagineus umbilicato-affixus peltatus, junior monophyllus, adultior lobatus ac compositus, horizontalis. Apothecia primitus clausa, mox aperta, orbiculata, atra, libera. Discus rimosus, aut saepius in gyros lirellasve debiscentes abiens.

Umbilicaria Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. vol. I pag. 9. Schaefer in Seringe Mus. Helv. I, 113 et seq. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 408. Duby Bot. Gall. gen. 11 pag. 595. Fée Meth. 55. Dict. Class. XII c. Merat. Fl. Paris.

Gyrophora Ach. lich. 226. Fl. Dan. tab. 177 G. B. tab. 2066—84—86. Fée Meth. 54. Dict. Class. Fries S.O.V.

Gyromium Wahlenb. Fl. Suec.

Capnia Vent. pag. 200.

Lecidea species Meyer.

Lichenes umbilicati spec. Linn.

Lichenoides species Dill..

1. U. PUSTULATA.

Fries lich. europ. 301 pag. 350. Duby Bot. gall. 4 pag. 595. Hoffm. Descr. et Adumbr. tab. 28 et 29. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 411. Schaeer. Mus. 1 pag. 113. Garovaglio lich. Ital. sub tit. lich. Provinc. Comen. et Vallis-Tellinae 1836—43. Dec. 12 n. 6.

Thallus coriaceus, plicatus, margine eroso-dentatus ciliolatus bullosus, papulosus, cinereo-viridis, aut olivaceo-fuscus; siccus cinereo-fuscus, aut fuliginosus; hypothallus reticulato-lacunosus, subfuscus, foveolatus, foveolis rotundatis, centro pedicellatus, pedicello brevissimo ac vix conspicuo, saxo adnato; bipollicaris et ultra latus. Apothecia simplicia scutellata, thallode marginata; disco atro, primitus papillato convexo, inde gyrose-plicato, dein plano, margine crasso, excipulo convexo, atro.

Junio, Julio.

Gyrophora pustulata Ach. lich. Univers.

Lecidea pustulata Ach. Meth. lich. pag. 85.

Gyromium pustulatum Walh. Ups. n. 954. Aspergren bleking. pag. 86. Fl. Suecica n. 1676 pag. 858.

Lichen pustulatus Fl. Suecica n. 1107 et auct. Bot. Suec. tab. 65. Fl. Dan. tab. 597 f. 2. Engl. Bot. tab. 1283. Westr. Fargl. tab. 13.

Lichen crustae modo saxis adnascens, verrucosus, cinereus et veluti deustus Fl. Fr. n. 549. Vaill. Bot. Par. tab. 20 f. 9.

Lichen pulmonarius saxatilis inferne reticulatus et lacunatus, superne cinereus, ac verrucosus, receptaculis florum, et seminibus nigricantibus, et veluti deustis Mich. N. Pl. Gen. or. 18 pag. 89 tab. 47.

Lichen fronde cinerea, inferne lacunata arbusculis superne nigris Hall. Helv. n. 1996.

Lichen fronde lobata fusca subtus lacunata, surture marginali concolore Neck. Meth. 75.

Lichenoides pustulatum cinereum et veluti ambustum Dill. Hist. Musc. 227 tab. 30 fig. 131.

Icones. Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab. 28 f. 1, 2
et tab. 29 fig. 4 optima.

Suec. Bot. tab. 65.

Engl. Bot. 1283.

Vestr. Fargl. tab. 13.

Vaill. Bot. Par. tab. 20 f. 9 optima.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 47 optima.

Habitatio. In regione subalpina Europae et Americae.

Statio. Actnae Bronte ad saxa silicea 2549 p. p. ex
Gussone. Monte Scuderi prope Messanam 2294 p.p. ex Gussone.

2. U. POLYRRHIZOS.

Sihenh. Sched. Crit. v pag. 3 ex Fries lich. europ.
308 pag. 358.

Thallus coriaceus, levis, centro plicatus irregulariter
sinuatus, erosus, denticulato-ciliatus, aeneofuscus; hypothallus
ater, fibrillosus pannosus. ex fibrillis brevissimis densissimis
ramosis saxo adfixis cirrhosis. Apothecia sparsa, ad marginem
versus liraelliformia mox composita, nigro alba, disco-gyrosis-
simo, emarginata.

Junio, Julio.

Umbilicaria depressa Schaer. in der mus. 1 pag. 95
tab. 10, 11. Duby Bot. Gall. var. d *pellita*, 9 pag. 596.

Umbilicaria vellea Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. t. 26 f. 3.

Gyromium polyrrhizos Walheber. Fl. Suec. 1675 pag. 858.

Gyrophora pellita DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 409. Ach.

Synops. pag. 67. Walhenb. Ups. n. 932. Asperg. bleck.
pag. 86. Florke in Berol. mag. 1810 pag. 66.

Lichen pellitus Ach. I. c. tab. 3 f. 2. Engl. Bot. tab. 931.

Lichen polyrrhizos Lightf. Reich. Retz. Roth. With. var.

B. Linn. Sp. pl. 1 § coriacei. Fl. Suecica II n. 4108.

Lichenoides pullum superne et glabrum. inferne nigrum
et cirrosum Dill. Hist. Musc. 226 tab. 3 fig. 130.

Icones. Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab. 26 f. 3.

Sowerby Engl. Bot. tab. 931.

Schaerer in Scr. Mus. 1 pag. 95 tab. 10, 11.

Dill. Hist. Musc. tab. 30 fig. 130.

Habit. Europa in maritimis, subalpinis, sylvaticis et
montanis.

10

Stat. In montibus calcareis Madonie: "Piede del Cozzo di Mofera 4411 p. p. et Pizzo di Palermo 5936 p. p. ex Gussone."

Observ. Species vegeta semper nitida, viridi-aenea; sicca fusca; et emortua livido-cinerea.

II. ENDOCARPON

Endlicher Or. X Gasterothalami Trib. III Endocarpeae gen. 157. Fries lich. Europ. Or. II Angiocarpi Tr. II Endocarpeae gen. 23. Lud. Eman. Schäerer lich. europ. gen. ex ultraque meth. Art. et Nat. digerit. Art. cl. III lich. Verrucariodei Or. 2 Endocar. gen. 33. Nat. cl. III lich. verruc. Or. 15. Endocar. gen. 32.

Thallus cartilagineus aut subcoriaceus, subpellatus, per pedicellum saxo lateraliter adfixus. Apothecia thallo inclusa, globosa, excipulo simplici membranaceo, ostiolo indurato tandem elongato in pagina hypothallina protuberante. Discus gelatinosus corneo-tuber, tandem aler.

Endocarpon Hedw. Stirp. crypt. II pag. 56 tab. 20. Ach. Meth. lich. gen. 11. Prodri. Tr. 14: DC. et LK. Fl. Fr. 2 gen. 94 iid. Syn. Fl. Gall. gen. 94 pag. 89.

Dermatocarpon Eschweiller Syst. 259.

Capnia Species Vent. tab. du regne veget. gen. 7.

Lichen Species \S umbilicariae Linn. Syst. Nat. cur. Gm. pag. 4374, et auctorum.

1. E. MINIATUM.

Fries lich. Europ. 353 pag. 408. Ach. Meth. pag. 127. Synops. pag. 101. Wahlenb. Fl. Suec. 1739 pag. 875. LK. et DC. Fl. Fr. 2 pag. 414 var. a umbilicatum. Schaeer. exsicc. 112. Duby Bot. Gall. 2 pag. 594. Garov. lich. Ital. Dec. 12 n. 10.

Thallus cartilagineo-coriaceus, centro subimbricatus, subrigidus ab uncia ad pollicem latus, orbicularis, sublobatus, lobis rotundatis sinuatisque; luteus, aut viridi-cinereus, per pruinam cinereum et flavam; hypothallus nudus, aut punctis nigris sparsus, seu apotheciis obversa facie thalli protuberantibus, fulvus, aut carneus, excentrica per pediculum adfixus. Apothecia punctiformia, fulvo-fusca, dein nigrescentia, orificiis prominulis, nigris.

Majo.

Sphaeria foliacea Bolt. fung. tab. 131.

Umbilicaria umbilicata Baumg. Lips. ex Steudel Nom.

Bot. pl. crypt. pag. 161.

Lichen miniatus Linn. Spec. I n. 50 II n. 54. Fl. Dan. tab. 532 f. 1. Wahlenberg Fl. Lapp. 881. Jacq. Miscell. 2 tab. 10 fig. 3 Engl. Bot. 9 tab. 593.

Lichen pulmonarius alpinus cinereo punctatus Hall. Helv. 75 tab. 2 f. 2.

Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum punctatum
subtus fulvum Dill. Hist. Musc. 223 tab. 30 fig. 127.

Icon Bolt. Fung. tab. 131.

Fl. Dan. tab. 532 fig. 1.

Jacq. Miscell. tab. 10 f. 3.

Sowerby Engl. Bot. tab. 593.

Dill. Hist. Musc. tab. 30 fig. 127.

Var. b *Aetneum*.

Nobis.

Thallus mono ut polyphyllus, conicus, lobato-sinuatus, viridi-cinereus, lobis adscendentibus, imbricatis, ab una ad sex uncias latus; hypothallus fulvo-carneus punctis fuscis prominentibus, seu apothecii obversa facie thalli protuberantibus. Apothecia sparsa punctiformia, nigrescentia, orificiis prominulis.

Februario, Martio.

Icon. Nostra Tab. I A exhibet plantam habitu suo, thallode monophyllo, lobato-sinuato, viridi-cinereo; apothecia sparsa punctiformia, nigrescentia, orificiis prominulis nigris; a particulam plantae lente auctam; b apothecia fusco-nigra, prominula, orifica nigra, lente aucta; c plantam habitu suo, thallode polyphyllo, lobato, obversa facie, seu hypothallum, notatum; d hypothallum fulvo-carneum punctis fusciscentibus, seu apotheciis obversa facie thalli prominentibus sparsum; pedicellum hypothallii fulvo-carnei subtripartitum.

Var. c *Complicatum*.

Fries lich. europ. 355 E. miniatum var. b pag. 408.

Thallus conicus, caespitosus polyphyllus, lobis adscendentibus imbricatis complicatisque crenatis.

Martio.

42

Lichen polyphyllus Wulff. in Jacq. Misc. III tab. 2 f. 4.

Lichen miniatus var. *b* Sowerby Engl. Bot. tab. 593.

Lichen complicatus Swartz.

Icon. Fl. Dan. tab. 532 fig. 4.

Engl. Bot. tab. 593 fig. inf.

Habit. Ad saxa granitica, calcarea, et vulcanica in regionibus campestribus, maritimis, subalpinis Europae.

Stat. Ad saxa calcarea Siciliae : Monte Busambra 1439 p. p. ex Gussone. *Var. b Aetneum* ad saxa vulcanica Catanae mari proxima Ognina, Armisi : *a* et *Var. c* montosis Aetnae : Linera, Bongiardo 1094 p. p. ex Garzia.

2. E. MARAVIGNAE.

Nobis.

Thallus subcoriaceus vel cartilagineo-coriaceus, peltatus, lenticularis aut reniformis, raro solitarius semper confertus ; tres aut quinque lineas latus, monophyllus, quandoque varius, primo concavus aut planus, dein convexus margine convoluto, anguloso-reundo, olivaceus, levis, glaber ; humidus quandoque et luteo-olivaceo obscure viridis ; siccus olivaceus aut fuligineo-olivaceus ; hypothallus levis, glaber, luteo-fuscus, et apothecis obversa facie thalli protuberantibus, pedicellum unum aut tripartitum. Apothecia minima, protuberantia, thallode inclusa, fusca, ordinate disposita, orificia minima fusca aut nigra.

April.

Endocarpon Guepinii, Garovaglio mihi per literas.

Icon. Nostra Tab. I B exhibit plantas confertas saxe adnatam ; *a* plantam unam lente auctam, thallode obscuro-viridi colorata ; *b* apothecia protuberantia fusca, orificio nigro ; *c d e* plantam unam valde auctam, et obverse notatam ; *c* thallum revolutum olivaceum, punctis nigris sparsum, seu apothecia enascentia ; *d* pedicellum unum subtripartitum ; *e* hypothallum luteo-fuscum leve, et punctis nigris sparsum, seu apothecis obversa facie thalli prominentibus.

Observatio. Exemplaria *E. Guepinii* a cl. Garov. mihi missa, et ei ab ipso Guepinio donata, minime nostris speciminiis convenienti. Species nostra est habitu, magnitudine, et apotheciorum dispositione diversa ; nec unquam vidi hypothallum *E. Guepinii*, seu obversam faciem thalli cum

¶3

apotheciis sparsis protuberantibus, olivaceo-fuscis, thallode concoloribus.

Habitatio. In subalpinis regionibus aridis.

Statio. In rupibus schistosis, calcareis et vulcanicis sicis. Paternò 620 p. p.

III. COLLEMA

*Endlich. or. XI Hymenothalami Trib. I. collemaceae
gen. 162.*

Thallus foliaceus subcontinuus gelatinosus, forma varius, crispus, intus albus. Apothecia solitaria, scutellata, thallode emergentia, excipulo nigro, subpapilloso, nucleo albido.

Collema. Hoffm. Germ. II 105. Fries pl. hom. 255. Ach. lich. univers. 129 tab. c f. 8-11. LK. et DG. Synt. Fl. Gall. gen. 97. Duby Bot. gall. gen. vii pag. 607.

Squamaria. Hoffm. adumbr. et descript. lich. vol. 3. pag. 3.

Parmelia species Ach. lich. univ.

Geisoidea spec. Vent.

Verrucaria species Fries lich. europ. xxix. pag. 430.

Pyrenula species Ach. syn.

Lichen species Lin. et var. auct.

I. C. *nigrescens*.

Ach. lich. univ. 646. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 384.

Duby Bot. gall. 2 pag. 607. Sanctus Garovaglio Lichenotheca italicica cit. Dec. 11 n. 8.

Thallus foliaceus tartareo-gelatinosus, aut olivaceo-fuscus, subdiasfanus, in orbem extensus, crispus, bullosus, verrucosus convexus; verrucis subimbricatis pustulatis; centro ater et opacus, limbo crenatus quandoque ciliatus, ciliis longis albidis et diafanis. Apothecia integra, primo globosa, dehin scutellata, centro sita, marginata, prominula sub-verrucosa, nucleo albido, disco ocreo, excipulo thallode conforme, con colore.

Januario, Februario et Martio.

¶

Collema vespertilio ex Stendel Nom. Bot. pl. crypt. pag.
428. Fl. Dan. t. 4125 f. 2. non ex Hoffm. Adum. et descrip. lich.

Collema microcarpum DC. Syn. Pl. Gall. 32.

Verrucaria nigrescens Pers. iii Ust. Ann. Bot. 44 p. 36.
Fries lich. europ. 388 pag. 438. Sommierf. lapp. pag. 138.
Verrucaria antiquitatis Flork in Berl. mag. 1817, 1 p. 17.
Verrucaria umbrina B. nigrescens Ach. lich. univers.
pag. 291.

Pyrenula nigrescens Ach. meth. lich.

Lichen microcarpus Schl. cest. 4 n. 66.

Lichen carbonarius Walff. in Jacq. Coll. iii pag. 418
tab. 6 f. 2, b.

Lichen nigrescens Linn. Suppl. pag. 451. Vahlenberg
Fl. Suecica n. 1620 pag. 838. Huds. angl. ed. 2 pag. 537.

Lichenoides gelatinosum, membranaceum, tenuis nigricans.
Dill. Hist. Muscor. pag. 138 tab. 19 f. 20.

Icon. Fl. Dan. tab. 4125 f. 2.

Jacquin Coll. iii tab. 6 f. 2. b.

Dill. Hist. Musc. tab. 19 f. 20.

Habit. Europa ubique ad saxa, ligna aliaque.

Statio. In humidis ubique tam elatae quam planae
regionis, ad saxa tam vulcanica quam calcarea, arbores et
muscos. Catania, Palermo, Messida, Paternò, Nicolosi, Mondello,
Militello, Madonie, Milo 300 p. p.

Observ. Thallus incipit ater et opacus arcte adglutinatus,
statura et forma varius, sed ambitu' vulgo determinatus, color
e fusco nigrescens, substantia subgelatinosa, primo macularis
est, adultior crassiuscula rimosa. Perithecia primum globosa
deinde prominula disco croceo.

2. C. VESPERTILIO.

Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. v. 2 pag. 48 f. 37, 2, 3.

Thallus siccus membranaceus, orbiculatus, sublobatus
tenuis, plicatus, superne rugosus inferne plicato-lacunosus.
plicae et rugae longitudinales in centro congestae, peripheriam
versus elongatae radiatae et virides, aut atro virides, aliquando
fuscus; substantia mollis, gelatinosus, diafanus; postice fi-
brillis granulosis sparsus. Apothecia prominula, centro et

radio sita, thallode emergentia, congesta, subpodicellata, globulosa; deinde scutellata, marginata margine thallode conformi; disco croceo protuberante, in siccis planiusculo et fuscidente.

Januario, Februario.

Lichen Vespertilio, Lightf. Scot. 840.

Lichen nigrescens Huds. angl. 537.

Lichen nigrescens Leers herb. 945.

Lichen lactuca Web. spic. 253.

Lichen papyraceus Wulf. Jacq. collect. 3, 134 t. 10, f. 3 (bona sine scutellis).

Lichen nigrescens Linn. Syst. veget. 961. Suppl. 454. Ehrh. Beitr. 2, 146.

Lichen saxatilis nigricans, *lactucae folio*. Buxb. Ant. 1, 41 tab. 61 f. 3 (imperfecta).

Lichenoides gelatinosum, *membranaceum*, *tenue nigricans*. Dill. Musc. 138 tab. 9 f. 20-21 (mediocris).

Lichen gelatinosus membranaceus exasperatus convolutus atroviridis, *scutellis rubris*. (saltem quoad synonymiam). Hall. hist. 2037.

Icon. Hoffm. Ad. et Descr. cit. bona.

Jacq. coll. 3, 134 tab. 10, f. 3.

Buxb. Ant. tab. 61 f. 3.

Dill. Hist. Musc. tab. 9 f. 20-21.

Habit. Europa ad nuda saxa, arborum truncos.

Stat. Ad calcarea saxa, et truncos, udo caelo viget, siccus et sereno contrahitur et arescit. In insula Pantellaria 2480 p. p. (Gussone).

IV. LECIDEA

Endlicher or. XI hymenothalami. Tribus II lecidinaeas gen. 165.

Thallus crustaceus, horizontalis, macularis, saepe obliteratus. Apothecia hemisphaerica excipulo proprio carbonaceo aterrimo primitus marginata; deinde scutelliformia aut hemisphaerica solida. Discus apertus, primo punctiforme impressus, saepius corneus et strato carbonaceo impositus.

16

- Ach. Syn. lich. 32. Fries Vet. Ac. handl. 1822 pag.
 253. Syst. Orb. Veg. pag. 252. Lich. europ. gen. xv pag.
 281. Eschw. Syst. f. 18.
Catillaria species Ach. syn. 44.
Echinophora Fée meth. 35 tab. 4 f. 25.
Myriotrema Fée Meth. 34. Crypt. cort. tab. 25 f. 1, 2.
Rhizocarpon et *Patellaria* spec. LK. et DC. Fl. fr. II
 pag. 366, 345.

I. L. GEOGRAPHICA.

- Fries lich. europ. pag. 326 n. 384. Schaer spicil. pag.
 124 var. *b* *contigua*. Sanctus Garovaglio Lichenes Provinciae
 Comensis et Vallis-Tellinae Decas 2 n. 10.

Hypothallus ater, arcte adhaerens, aliquando nudus ;
thallus crustaceus tenuissimus primo luteo-viridis, deinde nitide luteus, areolatus ; areolis confluentibus, angulosis, distinctis per lineolas. Apothecia ex hypothallo atro oriunda, intus nigra, crustam vix superantia, discreta inter areolas, aut in areolis plerumque confluentibus, immersa solitaria, aut coalita, excipuli cupularis confluentis margo tenuis aut prominulus ; discum nudum.

Februario, Martio, Aprili.

- Rhizocarpon geographicus* DC. Fl. fr. 2 pag. 365.
Patellaria geographica Duby Bot. gall. 78 pag. 656.
Verrucaria geographica Humb. Friberg. 43.
Lecidea atrovirens Ach. melb. lich. pag. 45. Synops. lich. p. 21.
Leproncus geographicus Jaum. S. Hilaire Ex. famill. natural. T. 1 pag. 19.

Lichen Haller. helv. n. 2063.

- Lichen crustaceus saxatilis* luteus receptaculis florum nigris Mich. N. Pl. gen. 97 n. 19.

Icones auctorum praebent varietates.

Var. *b* *contigua*.

Fries lich. europ. pag. 327 spec. 284.

Areolis applanatis in crustam subcontiguam rimosam confluentibus ; apothecis detrusis.

Verrucaria geographica Hoffm. Descr. et Ad. lich. vol. 3 tab. 54 f. 2 pag. 43. Pl. lich. tab. 53 f. 6 gen. 16 n. 2.

Lichen geographicus Linn. Sp. 1 gen. 16 n. 2. Fl. Suec. 1
n. 940. n 1058. Roth. Germ. 492. Hoffm. Enum. lich. tab. 3 f. 4.
Encycl. meth. T. 3 p. 2 pag. 454 n. 2. Weis Cryptog. pag.
38. Pollich palat. n. 1083. Web. spicil. pag. 179. Halfen
lich. pag. 515 Lightf. pag. 801.

*Lichenoides nigro-flavum thabulae geographicae instar
pictum.* Dill. Hist. Musc. 126 tab. 18 f. 5.

Icon. Flork. n. 62.
Schaer. n. 172.
Moug. n. 640, 6.
Hoffm. Deser. et Adumbr. tab. 54 f. 2 bona. Pl. lich.
tab. 53 f. 6.

Dill. op. cit. tab. 18 f. 5.
Habit. Ad saxa granitica, micacea Europae.

Statio. Ad schistosa saxa planae regionis Mandanici,
Sirizzo (Prestandrea).

Observ. Exemplaria *L. geographicae* ad saxa micacea et
arenaria Italiae a S. Garovaglio mihi donata exactè sicutis
speciminiibus convenient.

2. *L. TINEI*

Nobis.

Crusta viridi-lutea areolata, areolis squamulosis applanatis,
et pluribus, saepe coalitis, subrugosis, hypothallum nigrum
interrupte obtectentibus. Apothecia atra, innata, raro crustam
horizontalem aequantia, nunquam emersa; excipulo carbonaceo
margine prominulo aut laevi, disco nudo plano.

Februario.

Lecidea geographicæ var. c. alpicola Fries Lieb. Eur.
pag. 327 spec. 284. Schaer. Speiel. pag. 124.

Icon. Nostra Tab. II B exhibet plantam habitu suo;
hypothallo nigro, distincto, et thallo viridi-luteo; areolis di-
sceratis et coalitis; apotheciis solitariis et adpressis crustae
innatis: a apothecium lente auctum, excipulo carbonaceo,
marginе prominulo.

Habit. Europa in regionibus alpinis.

Statio. Aetnae ad saxa vulcanica Rinazzi, Cassini usque ad
limitem vegetations Astragali Siculi 7429 p. p. 3

20

Hoffm. Pl. Lich. tab. 32 f. 3.

Hall. helv. tab. 47 f. 3.

Schaer. n. 168.

Moug. Nestl. n. 172.

Funk. n. 319.

Dill. Hist. Musc. 544 f. 2.

Icon Nostra Tab. u D exhibet plantam habitu suo, crusta madida bullato-plicata, congesta, pruinosa, plicis intricatis, basi radiculosis cum apotheciis aunc solitariis, nunc confluentibus; a exhibet plantam crusta sicca, plicata, rugosa, pruinosa, inferne radiculosa, cum apotheciis adpressis et solitariis, disco pruinoso; b c d exhibet plantam lente auctam; b squamae bullosae et plicatae, lineolatae, lineolis nigris, aut fusces; d d pruina nigra, aut cinereo-caesia; e apothecium aternum, subpellatum, obtuse marginalum, disco convexiusculo.

Habit. In montosis magis quam in planis Europae regionibus.

Statio. Ad elata loca Etnae super muscos, et per humida; Nicolosi a s. Nicola 2298 p. p. Linera, Bongiardo verso la strada di Zaffarana 1094 p. p. circa il limite superiore della regione nemorosa da Nicolosi al cano dell'Etna 5470 p. p.

5. L. ALBOATRA.

Fries Lich. Europ. 294 pag. 336 var. *a corticola*. Schaeer. Spic. pag. 140.

Thallus crusta, fastigio-farinosa, alba, amylacea, candida, contigua, superficie parum inaequalis, in siccis aqualis candida; hypothallus albus. Apothecia nigra, conferta, minuta, scutellata, per aetatem supra crustam plus minus elevata, e crusta in amylaceis coronata, intus carbonaceo-alba; disco atro sublurido, marginato, margine disco concolori, tenui, evanido. Apothecia destructa aetate, foveolam intra thallum et saxum ipsum saepe exhibent.

Dicembri, Januario, Februario, Martio.

Lecidea corticola Ach. Syn. pag. 32. Fl. Dan. tab. 1350 f. 2.

Verrucaria amylacea Hoffm. Deut. Fl.

- Verrucaria alboatra* Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab.
45 fig. 2. Idem var. *amylacea* Fl. Germ.
Patellaria corticola Ach. Prodr. 119 pag. 58 DC. et
 LK. Fl. Fr. 2 crusta deliquescente.
Sphaeria byssacea Weigel. obs.
Lichen corticola Ach. Prodr. 119 pag. 57. Idem Vet.
 Ac. Hand. 1799 tab. 5 fig. 6. Sowerby Engl. Bot. tab. 1892.
Lichen corticola var. *b* *farinosa* Ach. Act. Soc. Suec. 1794.
Lichen alboater Hoffm. Enum. lich. Schrad. Spicil. Gmel.
 Syst. Linn.
Lichen amylaceus Ehrh. Cr. exs. Persoon Ust. Ann. St. 11.
Icon. Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab. 15 f. 2 non bona.
 Ach. Nova Acta Ac. Suec. T. xxi tab. 3 fig. 6 a b c.
 Sowerby Engl. Bot. tab. 1892.
 Fl. Dan. tab. 1350 fig. 2.
 Lich. Suec. n. 153.
 Ehrh. n. 176.
 Schrad. n. 161 et 303.
 Florke Deutsch. n. 41.
 Mong. et Nestl. 844, 9.
 Var. *b* *Saxicola*.
 Thallus candidus evanidus. Apothecia alra infra saxum
 immersa, marginata, margine subvanescente, disco planiusculo;
 quandoque disco ochraceo fusco, et margine atro; aut denique
 apothecia plurima coalita, alra, carbonacea.
 Fries lich. europ. pag. 337.
Lecidea margaritacea Flotow. Sommerf. Lapp. pag. 148:
 non *a* Ach. Syn. crusta deliquescente. sed Ach. syn. *b* p. 31, 82.
Patellaria niveo-ater DC. et LK. Fl. Fr. 2.
Lichen niveo-ater Dicks Crypt. iv pag. 31 tab. 12 fig. 1.
Lichen epipolius Ach. Sowerby Engl. Bot. tab. 1137.
Icon. Engl. Bot. tab. 1137.
 Dicks Crypt. iv pag. 21 tab. 12 fig. 1.
 Lich. Suec. n. 413, 414.
 Sommerf. 50.
 Habit. In Europa vulgarissimae sunt species et varietates
 ad cortices, saxa arenaria et calcaria, nec non ad muros.

Statio. Ad cortices varios in subalpina regione, et calcarea
saxa mari parum dissita in Sicilia. Messina a Sirrizzo ex
Prestandrea.

V. GUSSONEA

Nobis.

Thallus horizontaliter expansus irregulariter extensus,
hypothallo suffultus, crustaceus, granulosus, verrucosus. Apo-
thecia thallode immersa, aut subinnata seu parum emersa,
disco convexiusculo marginato, margine thallode aequali, dein
subevanescente.

Parmelia Species Fries lich. europ. gen. 7 pag. 56.
Sommersf. Lapp. pag. 89 Endlich. or. xi Trib. 3 gen. 172.

Squamaria Spec. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 374.

Lecanora Spec. Sommersf. Lapp. pag. 94. Ach. lich.
Univ. pag. 145.

Urceolaria Spec. Schaeerer Spic. pag. 70. Florke in
Berol. Mag. 1809 pag. 315, 1810 pag. 115. Ach. Meth.
pag. 145. Lich. Syu. pag. 145.

Placodium Spec. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 185.

Lichen Spec. Wahl. Lapp. pag. 407, 412. Linn. et
auctorum.

Observatio. Multa auctorum genera, haud naturalia, sunt
confusa a Fries Lich. Europea in solo *Parmeliae* genere : ex
quo species inter se differunt absque ulla affinitate ; ideo
Parmeliae nomen lichenibus thallo foliaceo, et apotheciis scu-
tellatis pedicellatis, tantum servavi ; thallo crustaceo et ver-
rucoso, apotheciis immersis aut parum emersis thallode mar-
ginatis *Gussoneae* dedi, ob clarissimum botanistam Joannem
Gussone ; denique lichenibus thallo crustaceo-squamuloso, car-
tilagineo aut membranaceo squamuloso, apotheciis innatis, ac
subpedicellatis, thallode marginalis *Gasparriniae* donavi, ob
insignem botanistam Gulielmum Gasparrini.

1. G. CLOROPHANA.

Nobis,

Thallus crustaceus effusus, irregularis adnatus, areolato-
verrucosus nudus, nitide-sulphureus, ambitu radiosus ; primo

glaber, rimoso-tessulatus, sub lente tuberculosus, tessulis trapezoidalibus; hypothallus albus. Apothecia intra thallodem primo immersa, ovalia, margine talloideo tumido subvanescere, dein parum elevata, disco nudo pallido, convexusculo, margine subvanescere.

Aprilis, Majo.

Parmelia chlorophana Fries lich. Europ. 115 pag. 117.

Wahl. in Suppl. pag. 44, Garovaglio op. cit. D. 1. n. 4.

Lecanora chlorophana Ach. lich. univ. pag. 436.

Lichen clarophanus Wahl. Lapp. pag. 416 tab. 28 fig. 2.

Squamaria electrina DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 374.

Icon. Nostra Tab. II A exhibet plantam habitu suo et colore, thallo crustaceo, rimoso, areolato, tessulato cum apotheciis imperfectis minutis thallode immersis: a plantam lente valde auctam, cum apotheciis imperfectis, marginatis, margine tumidulo thalloseo; et thallo areolato, rimoso crustaceo: b plantam habitu suo et colore proprio, thallo crustaceo, rimoso, areolato subverrucoso, cum apotheciis perfectis, subinnatis, margine subvanescere, disco convexo, levi, pallido.

Wahl. Fl. Lapp. tab. 28 fig. 2 non bona.

Habit. In montosis et planis Europae ad dura saxa.

Stat. Ad saxa vulcanica magis compacta Siciliae: Paternò 620 p. p. Catanae mari proxima.

Observ. Planta sicca pannum et chartam sulphureo colore tingit.

2. G. CINEREA.

Nobis.

Thallus, crusta subtartarea areolato-rimosa, plana, glauco-cinerea, vel fusco-cinerea, irregulariter extensa; hypothallo nigro. Apothecia numerosa, thallode immersa, disco nudo nigriscente, aut atro, intus pallido, margine thallode subelevato obtuso. nigro.

Dicembri, Januario, Februario, Martio.

Parmelia cinerea Fries lich. europ. 137 pag. 142. Sched.

Crit. 13 p. 2. Garovaglio op. cit. D. 5 n. 2.

Urceolaria cinerea Ach. Schaefer Spieil. pag. 70.

Urceolaria ocellata Florke in Ber. Mag. 1809 pag. 315, 1810 pag. 115.

Urceolaria microcelis Ach. Syn. pag. 145.

Urceolaria tessulata DC. et LK. Fl. Fr. 3.

Verrucaria ocellata Hoffm. Des. et Ad. lich. t. 20 fig. 2.

Lecanora multipunctata Ach. lich. Univ.

Lichen cinereus Linn. et Auctorum. Sowerby Engl. Bot.

tab. 1751. Wahl. Lapp. pag. 412. Westring. Farglaf. tab. 18.

Icon. Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab. 20 fig. 2

optima. Schaefer Helv. n. 125, 126, 128 crusta ochracea.

Engl. Bot. tab. 1851.

Lichen Suec. n. 366.

Westring. Farglaf. tab. 18.

Florke Deutsch. n. 13.

Var. b Aqualica.

Thallus, crusta spongioso-tartarea, glebulosa, grisea areolata. Apothecia immersa, margine thallode haud prominente.

Fries lich. eurusp. pag. 144.

Var. c Alpina.

Thallus crusta areolis planis, levigatis, rimosis, cinereo-pallidis. Apothecia disco immerso, nudo, rufo, sicco nigro.

Fries op. cit. pag. 144.

Lecanora alpina Sommersf. Lapp. pag. 91.

Habit. Ad saxa planae et elatae regionis Europae.

Stat. Ubique in Sicilia occurrit ad saxa cuiuscumque naturae. Ad calcarea Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, Taormina, Troina, ad vulcanica totius vallis Noeti, Militello, Scordia, Palagonia; et Aetnae: Paternò 620 p. p. Trecastagni 1680 p. p. Rinazzi di Nicolosi 3338 p. p. Randazzo 2545 p. p. *Var. b* occurrit ad loca humida et aquosa, *Var. c* ad saxa alpinæ et subalpinæ regionis Siciliae. Castelbuono 2600 p. p. ex Minà Palumbo.

3. G. VERRUCOSA.

Nobis.

Thallus, crusta tartarea, verrucosa, verrucis densissimis, nuda, glauco-albicante, vel cinerescente, saepe pulveracea, aliquando plumbea, super muscos dealbata, hypothallo albo. Apothecia verrucis immersa, primo concava, deinde plana. Discum nigrum, subpruinatum, margine proprio disco concolori donatum, cum thallode connatum, verrucoso-granulatum crenatum.

Neverbri, Dicembri, Januario, Februario.

Parmelia verrucosa Fries lich. europ. 169 pag. 186.

S. Garovaglio op. cit. D. 9 n. 7.

Urceolaria mutabilis Ach. lich. univ. pag. 335.

Urceolaria verrucosa Ach. spicil. pag. 77. et pag. 340.

Eadem crusta magis dealbata, ac apotheciis corruptis pag. 339.

Urceolaria pauryga Ach. Meth. pag. 146 tab. 4 f. 2.

Lichen verrucosus Wahl. lapp. pag. 408.

Icon. Ach. Meth. tab. 4 f. 2.

Schaer. Helv. n. 134, et 133.

Var. b *Perlusaria*.

Verrucis clausis, disco ostioli instar nigri prominente.

Parmelia verrucosa Fries op. cit. l. c. Meyer. Flecht. pag. 214.

Thelotrema mammosum Pers. in Act. Welt.

Porina glomerata Ach. Lich. Univ. pag. 310.

Perlusaria glomerata Schaer spic. pag. 66.

Endocarpon globulare Sommerf. Lapp. pag. 436.

Lichen glomeratus Schleisch.

Icon. Schaer Helv. n. 120.

Habit. Species obvia in tota Europa et geographicamente respectu aberrans.

Statio. In alpinis, subalpinis et planis regionibus, ad ligna, saxa humida et ad muscos frequens. Linera al bosco di Vigo, alla Dagala e Tenutella, S. Filippo, Catania, Nicolosi a S. Nicola 2298 p. p.

Obs. Crusta nunquam vidi cartilaginea uti a Friesio notatur, l. c. sed granulosa aut verrucosa et tartarea, hypothallo albo calcareo. Apothecia margine proprio ita sunt thallode connata, ut isto tantum marginata appareant, praincipue in primaevis et siccis speciminiibus.

4. C. VENTOSA.

Nobis.

Crusta tartarea crassa areolato-verrucosa, plicata, et primo areolato-granulosa et pulveracea, areolis inaequalibus, cinereo-virescens, aut immersa flavo-pallescens, vel cinerascens,

hypothallo albo. Apothecia intus. alba, crustæ immersa, adpresso, disformia, disco nudo, brunneo rubro, in siccis fusco, margine thallodc integrissimo pallente, aut crustæ concolori, crenulato seu granulato-forme.

Januario, Februario, Martio.

Parmelia ventosa Ach. meth. lich. pag. 66. Fries lich. Europ. 146 pag. 153.

Patellaria ventosa LK. et DC. Syn. Fl. gall. 960 p. 75.

Verrucaria ventosa Hoffm. Pl. lich. tab. 12 f. 1. Descr. et Adumbr. lich. tab. 27 f. 1 vol. 2 pag. 11.

Lichen venulosus Linn. Syst. veg. 957. Syst. pl. 526. Lightf. Scot. 806.—Fl. Dan. tab. 472. Westring. Farglaſv. tab. 6.

Lichen lepadolemma Ehrh. phytophil. 30. Engl. Bot. tab. 906.

Lichen flavescens Linn. Syst. veg. 959. Jacq. Misc. 2 pag. 79 tab. 9 f. 1. Wulf. in Jacq. l. c.

Lichen scopulorum Fl. Dan. tab. 712 f. 2.

Lichen cruentus Weber Spic. 184 tab. 1 Ley s. hal. 2 1137. Chlor. lugd. 34. Rhot germ. 407.

Lichenoides Dillen. Hist. Musch. tab. 18 f. 14.

Icon. Hoffm. Descr. et Adumbr. tab. 27 f. 1 medioris. Hoffm. Pl. lich. tab. 2 f. 1.

Westring. Farglaſv. tab. 6.

Engl. Bot. tab. 906.

Fl. Dan. 712 f. 2.

Jacq. Collect. II tab. 9 f. 1.

Lich. Suec. n. 161.

Ehrh. Phyt. 30.

Moug. n. 256.

Weber Spic. tab. 1.

Dill. Hist. Musc. tab. 18 f. 14.

Habit. In apricis montium, et campestrium, saepe vente expositis Europæ.

Statio. Ad saxa perantiqua, ad cortices Querci, Fagi, Castaneæ. Aethnae Bongiardo, Linera, Nicolosi, Molia. Castagne di cento-cavalli 2146 p. p. usque ad arborum limitem 4588 p. p.

VI. GASPARRINIA.

Nobis.

Thallus crustaceus verrucosus vel squamulosus, aut aquosus, squamis effiguratis, cartilagineis, membranaceis, ambitu lobatus; hypothallus albus fuscus, aut niger. Apothecia regularia, sessilia, aut parum elevata scutellata, nunc margine proprio evanescente instructa, et margine accessorio thallode conformi; nunc solo margine accessorio donata persistente; lamina disci planiuscula quandoque caesio-pruinosa.

Parmeliaceae Endlich. or. xi. Hymenothalami, Trib. iii gen. 172.

Parmelia species Fries lich. Europ. gen. 7 pag. 56.
Sommerf. Lapp. pag. 89.

Squamaria spec. DC. Fl. Fr. 2, 374. Chev. par. tab. 121.

Lecanora spec. Bot. gall. gen. 19 pag. 665. Ach.
Synops. lich. 154.

Patellaria spec. Ach. Prodr. fam. 1 gen. 6 pag. 4.
Hoffm. Pl. lich. Adumbr. et Descrip. lich. DC. et LK. Fl.
Fr. 2, 358. Duby Bot. gall. 4, 655. Leman Dict. Sc. natur.

Lecidea spec. Ach. meth. lich. 68.

Psoroma spec. Ach. Prodr. fam. 10. Hoffm.
Pl. Lich.

Placodium spec. Ach. op. cit. gen. 11. DC. et LK. Fl.
Fr. 2 pag. 380.

Verrucaria spec. Hoffm. Pl. lich. Ad. et Deser. lich.
Germ. pag. 165.

Lobaria spec. Hoffm. Pl. lich. Germ.

Lichen spec. Linn. et auct. With. Web. Ehrh. Wahleb.
Ach.

SECTIO I.

Squamosae

Thallus squamosus, squamis imbricatis, membranaceis vel cartilagineis; virescenti-glaucus, albescens; ambitu lobatus, lobis crenatis; hypothallus albus. Apothecia elevata, discus nudus; margo thallodis passim disco colore induit.

1. G. LENTIGERA.

Nobis.

Thallus crassus, crustaceo-foliaceus, squamosus, irregulariter-imbricatus, squamis oblongis, imbricato-compositis, nunc ascendentibus, nunc undulatis corrugato-planis, lobis inciso-crenatis, in sicco albo-marginatis; radiosus, contiguus viridi-albus in sicco glaucus; hypothallus albus, inaequalis. Apothecia adnata sessilia, magnitudine varia; disco nudo testaceo vel pallide-luteolo, plano, demum convexiusculo, margine thallode tenui integro persistente, in sicco albo strato medullari colori.

Planta in orbem saepe expansa, 4—8 unciae latitudinem offert.

Dicembri, Januario, Februario, Martio.

Parmelia lentigera Fries lich. Europ. 97 pag. 103.

Lecanora lentigera Ach. Met. lich. pag. 192.

Squamaria lentigera Fl. Fr. 2 pag. 576. Duby Bot. gall. 14, 660. Leman Dict. Sc. nat. T. 50 pag. 357 n. 3. Cher. par. tab. 14 f. 2.

Psora lentigera Hoffm. Descr. et Ad. lich. vol. 3 pag. 75 tab. 48 f. 1. Exemplaria in sicco descripta, nec acetate perfecta. Idem Deut. Fl.

Placodium lentigerum Svet. Liotslaf.

Lichen lentigerus Ach. Prodr. 185 pag. 103. Weber Spicil. Fl. Germ. T. 3. Gott. 192. Will. Dauph. 3, 978. Rehl. cantabr. 430. With. Bot. 3, 177. Hoffm. En. lich. 2 tab. 9 f. 4. Encycl. Meth. T. 3 p. 2 pag. 463 n. 50. Desfontaine Fl. Atlaot. T. 2 pag. 418. Swartz. Act. Upsal. T. iv Reitz. Pr. 2. Fl. Dan. tab. 1185. Liljebl, Willars, Bellardi, Schrad. Roth. Gmel. Syst. Linn.

Icon Weber Spic. Fl. Germ. T. 3.

Hoffm. Adumbr. et Descr. lich. vol. 3 tab. 48 f. 1 non bona, an varietas? Enum. lich. T. 9 f. 4.

Chev. tab. 14 f. 2.

Reihan. Cantabr. pag. 430 tab. unica.

Fl. Dan. tab. 1185.

Lich. Suec. n. 288 bona.

Ehrh. Crypt. n. 38.

Moug. et Nestl. n. 68.

Mich. n. pl. gen. tab. 5 f. 3.

Habit. In Europa et Afria ubique, ad saxa et cortices.

Statio. Ad saxa calcarea montium Siciliae frequens, ad vulcanica tam in montosis quam in planis regionibus, nec non ad arborum cortices tam in arido quam in secco obvia. Palagonia, Vizzini, Mineo 1829 p. p. Aetnae Bongiardo, Linera, Aci, Paternò, Biancavilla, Randazzo 2545 p. p. Nicolosi 2184 p. p. Grotta delle capre 5107 p. p. Catania in saxis mari proximis, Misterbianco 641 p. p. Motta s. Anastasia 813 p. p.

2. G. SAXICOLA.

Nobis.

Tballus cartilagineus erustaceo-adpressus areolato-squamosus, squamis oblongis, crenato-rotundatis, nunc erectis, revolutis, nunc imbricato-flexuosis; virescenti-ochroleucus, vel viridi-olivaceus; in secco viridi-albus margine albo; ambitu e laciniis concretis, planis radiosso-lobatus, in orbem saepe expansus; hypothallus maculato-niger, vel fuscus, in secco albus. Apothecia conferta adpressa scutellata primo convexa, deinde plana, disco subtestaceo luteolo, et rufo-fusco; margine thalode concolor primo prominulo, deinde tenui, demum crenato, in seccis albo.

Januario, Februario, Martio, Aprili et Majo.

Parmelia saxicola Fries lich. Europ. 109 pag. 110.

Psora muralis Hoffm. Descr. et Ad. lich. vol. 1 tab.

16 f. 4.

Placodium saxicola. Ach. Prodr. 186 pag. 104. DC.

Fl. Fr. 2.

Lobaria muralis Hoffm. Germ.

Lichen ochroleucus Wulf. in Jacq. Collect. II pag. 192 tab. 13 f. 4 a. Schrank in Fl. Bav.

Lichen luteolus Gmel. in Linn. Syst. nat.

Lichen muralis Schreb. Spicil. var. a *saxicola* pag. 120. Enum. lich. 64 tab. 11 f. 4. Liljebl. Retz. Pr. 2. Dicks. Scholl. Roth. Tentamen. Wild. Prodr. Wither. Hoffm. Enum. Lich. Gml. Syst. Linn. *

30

Lichen saxicola Pollich. Fl. Palat. Retz. Pr. 2. Roth.
Tent. Gmel. Syst. Linn. Engl: Bot. tab. 1995. Acharius
Prodr. Fl. Suec. 186 pag. 104.

Icon. Hoffm. Adumbr. et Descr. lich. vol. tab. 16 f. 1
~~non bona.~~

Engl. Bot. tab. 1995.

Lich. Suec. n. 163.

Moug. Nestl. n. 67.

Var. b *Versicolor.*

Thallus crustaceus saxo arcte adpressus, viridi-albus ;
apothecis rufofuscis.

Parmelia saxicola var. c *versicolor* Fries l. c. pag. 111.

Lichen versicolor Sched. Crit. 43 p. 1. Pers.

Lobaria versicolor Hoffm. ex Fries l. c.

Habit. Ad saxa cujuscumque naturae totius Europae, nec
non ad muros frequens in frigidis illius regionibus.

Statio. In calcareis Messanae Mandanici (Prestandrea)
Serrizze, Monte Scuderi 2954 p. p. (Gussone).

3. G. coarctata.

Nobis.

Thallus crustaceus squamulosus, squamis areolatis, vel
differatis aut adpressis, verrucosis, crenatis; primo virens dein
glaucio-albicans, vel cinereus; in sicco glaucus, aut albidus;
aliquando ochraceus, ambitu squamoso-imbricatus, squamis cor-
rugatis et crenatis, crenis tri-multifidis, in sicco ochraceis;
hypothallus albus, in sicco subalbidus. Apothecia elevata, ex
verrucis orta, minuta, carnosa, mollia, vegeta rufa, sicca fusco-
nigra, nunc margine vero, nunc accessorio, thallode conformi,
instructa; discus urceolatus, nunc excipulo evanescente proprio,
denique prorsus immarginatus, hemisphaericus: quandoque
triplo majora, carneo-rosea apothecia occurunt.

Dicembri, Januario, Februario, Martio.

Parmelia coarctata Fries lich. Europ. 100 pag. 104. Ach.
Meth. pag. 362.

Icon. Lichen. Suec. n. 362 bona.

Var. b *Ornata.*

Nobis.

Thallus effusus, dreolate-rimosus, ambitu squamulosus lobatus.

Parmelia coarctata var. *a ornata* Fries lich. Europ. 100,
pag. 105.

Parmelia ornata Sommerf. Lapp. pag. 92.

Var. c Microphyllina.

Nobis.

Thallus minutus orbiculari-contiguus, subtus liber, albus,
in ambitu crenulato-incisus.

Fries l. c.

Icon. Lich. Suec. B.

Var. d Trapelia.

Nobis.

Thallus squamulosus, squamulis adscendentibus imbricatis crenatis.

Fries l. c.

Lecanora trapelia Ach. Meth.

Var. e Granulosa.

Nobis.

Thallus crustaceus, verrucosus, verrucis granulosis.

Parmelia coarctata var. *d* Fries l. c.

Lecidea argilliseda Duf.

Lecanora retorrida Chaubert.

Var. f Tenuissima.

Nobis.

Thallus crustaceus effusus, tenuissimus, contiguus virens.

Parmelia coarctata var. *e* Fries l. c.

Parmelia clacista Ach. Meth. tab. 4 f. 4.

Icon Ach. Meth. tab. 4 f. 4.

Var. g Soluta.

Thallus leprosus, lepra soluta, granulosa vel squamulosa,
saepe prorsus oblitterata.

Parmelia coarctata var. Fries l. c.

Lecidea cotaria Ach. Meth. Suppl. pag. 11.

Volvaria conchylioides DC. Fl. Fr. 2.

Volvaria coarctata Duf.

Lecanora coarctata Ach. lich. univ.

Lichen coarctatus Engl. Bot. tab. 534.

Icon Engl. Bot. tab. 534.

Habit. Europa ubique ad humida, subirrigua et arida.

Statio. In Sicilia undequaque sparsa ad saxa vulcanica, calcarea, arenaria; *muros, tecta, lateritia*; in montosis Militello, Palagonia, Scordia, Paternò 620 p. p. Nicolosi 2298 p. p. et alibi, nec non in plainis Palermo, Catania, Messina.

Obs. Varietates ubique occurunt, ac in eodem saxo saepe duo tresve facile est videre.

4. G. MURORUM.

Nobis.

Thallus crustaceus adnatus contiguus, orbicularis, aliquando subobliteratus, vel subglebulosus, effiguratus, aut verrucoso-conglobatus, et pulverulentus, ambitu radioso-plicatus, et lobatus; flavo-viridis, flavus, ochraceus, vel fusco-luteus; hypothallus albus. Apothecia primum convexa, dein plana sessilia; disco rufoluteo, vel lateo, margine proprio nullo, sed accessorio pallidiori, thallode conformi, tenui, integrissimo, subpersistente, denique disco concavo et margine evanescente.

Januario, Februario, Martio.

Parmelia murorum Fries lich. europ. 114 pag. 115.

Ach. Meth. pag. 195. S. Garovaglio lich. Ital. D. 14 n. 5.

Placodium murorum LK. et DC. Syn. Fl. gall. 1025 pag. 81. Leman Dict. Sc. Nat. T. 49 pag. 95 n. 3. Chev. par. ex Fries l. c. Ach. Prodr. 180 pag. 101.

Placodium saxicola Ach. Prodr. pag. 104.

Psora saxicola Hoffm. Pl. lich. tab. 47 f. 3 mediocris.

Lobaria saxicola Hoffm. Deut. Fl.

Lecanora cirrochroa Ach. Syn. pag. 181.

Lecanora murorum Ach. ex Fries l. c. Meyer. Flecht. pag. 223.

Lichen murorum Ach. Prodr. 180 pag. 101. Hoffm. En. lich. tab. 9 f. 2. Engl. Bot. tab. 2157. Fl. Dan. tab. 1946.

Lichen flavescens Huds. Retz. Pr. 2 Liljebl. Wither. Roth. Tent. Hoffm. Enum. Oed. Enum.

Lichen candelaris Wulf. in Jacq. Coll. 3 tab. 6 f. 1 var. b. Lightf. Fl. Scot.

Lichen candelaris Ucria Cat. Horti R. Panormitani pag.
438 ex loco, non Linn.

Lichen parietinus Leers. Herborn.

Lichen Hall. helv. n. 2023.

Lichenoides crustosum, orbiculis et scutellis flavis Dill.

Hist. Musc. pag. 136 tab. 18 f. 18.

Icon. Hoffm. Enum. lich. tab. 9 f. 2.

Hoffm. Adumb. et Descr. lich. tab. 17 f. 3.

Engl. Bot. tab. 2157.

Fl. Dan. tab. 1946.

Jacq. Coll. 3 tab. 6 f. 1.

Dill. Hist. tab. 18 f. 18.

Var. b Callopiema.

Thallus explanatus distincte lobatus intense-luteus, nudus.

Apothecia lutea, vel aurantiaca.

Parmelia murorum var. g callopisma Fries lich. Eur. p. 116.

Lichen callopisma Ach. ex Fries l. c.

Lichen murorum var. Flot. in Link. Jarhrb.

Var. e Chlorina.

*Thallus pallidus flavo-viridis, nudus, opacus, quandoque
aspersus, verrucosus, non radiosus. Apothecia majora convexa,
saepius immarginata pruinosa, pallida.*

Parmelia murorum var. d Chlorina Fries lich. Europ. p. 117.

Habit. In tota Europa, et Aphrica locis mari proximis.

*Stat. Ad saxa, rupes, cortices, ligna, parietes, cuiuscumque regionis in tota Sicilia et insulis adjacentibus. At a
et b ad saxa et rupes sicciores soli infestas, c ad umbrosos
muros, et humidos.*

5. G. VARIA.

Nobis.

*Thallus, crusta cartilaginea areolata, squamosa, vel
squamoso-verrucosa, flavo-virescente, deliquescente ochroleuca;
hypothallus niger; squamae hypothallino colore marginatae,
inaequales, saxo arcte adherentes, vel margine revolutae.
Apothecia sessilia, in eadem crusta; disco polito, luteo, car-
neo, fusco, aut lutescenti-carneo, primo margine creciusculo*

34

thallode concolori integrō, dein convexiūsculo, immarginato,
vel margine flavicante irregulariter flexuoso.

Martio, Aprili.

Parmelia varia Fries lich. europ. 150 pag. 156. Sched.
Crit. 9 pag. 28.

Parmelia sulphureo-nigricans Flork. in Berl. Mag. p. 197.

Parmelia cerina var. d ruvida Ach. Meth.

Patellaria varia Hoffm. Pl. lich. tab. 23 f. 4 (sine
crusta). Ach. Prodr. 55 pag. 40.

Patellaria olivacea Pers.

Patellaria lutescens DC. Fl. Fr. 2 pag. 354.

Verrucaria varia Hoffm. Deut. Fl.

Verrucaria lutescens Hoffm. Germ. pag. 195.

Lecanora expallens a, b. Ach. Syn. pag. 171.

Lecanora strobiliana a, b. Ach. I. c.

Lecanora symmicta b. Ach. I. c. pag. 340.

Lecanora apochrea seu *symmicta* g. Ach. syn. pag.
162, 340.

Lichen varitis Ach. Lich. Prodr. n. 83 pag. 40. Ehrb.

Crypt. exs. Retz. Prodr. 2.

Lichen sarcopis Waltherberg.

Lichen pallescens Schrank. Fl. Bavar.

Icon. Engl. Bot. tab. 1666, 1549.

Hoffm. Pl. lich. tab. 23 f. 4.

Lich. Suec. n. 46 104.

Ehrb. Crypt. n. 68.

Moug. et Nestl. n. 840.

Fl. Dan. tab. 1347 f. 1.

Var. b *Saepincola*.

Crusta squamosa, soluta, pallide-sulphurea, vel subalbida,
squamis nigro-marginalis, aut squamis omnino fuscis. Apothe-
cia semiimmersa convexa subimmarginata; disco carneo, oli-
vaceo, et fusco.

Martio, Aprili.

Parmelia varia var. c *saepincola* Fries lich. Europ. 150
pag. 156.

Lecidea aitema Ach. Syn. pag. 35, 24.

Habit. In montosis regionibus.

Stat. Aetnae ad vulcanica saxe. Rinazzi di Nicolosi 3338
p. p. a, et b confuse occurunt.

6. G. ERYTHROCARPIA.

Nobis.

Thallus, crustaceus ambitu subsquamulosus, adnatus,
radiosus, pallidus; primo granulosus pulverulentus, canescens
vel decoloratus, dein centro verrucosus, calcareus vel subcal-
careus, aut cinereo-caesius, fuscus, et nigricans ambitu lobatus,
lobis rotundatis albido calcareis, nudis. Apothecia innata, aut
parum elevata conferta, rotundata; disco nudo, plano croceo-
rubro, vel fusco, margine thallode conformi flexuoso, aut disco
convexo et margine concolori.

Januario, Februario.

Parmelia erythrocarpia Fries lib. Europ. n. 418 pag.

420. Wallr. II pag. 420.

Patellaria erythrocarpia Pers. ex Fries l. c.

Patellaria caesiorufa Ach. Prodr. 93 pag. 45.

Placodium versicolor DC. Fl. Fr. 2 pag. 350.

Lecanora theicolyta Ach. Lich. univers. pag. 425.

Lecanora craspedia var. b Ach. Lich. univer.

Lichen caesiorufus Ach. Prodr. univ. n. 93 pag. 45.

Schrad. Spicil. Fl. Germ. Engl. Bot. tab. 1040.

Icon. Engl. Bot. tab. 1040.

Habit. In planis, et locis mari proximis tolius Europae.

Statio. Ad saxa calcarea, cotacea inque muris Siciliac.

Catania, Siracusa, e tutto il val di Noto.

SECTIO II.

LEPROSÆ

Thallus tartareus, granulosus, leprosus inaequaliter ex-
tensus. Apothecia innato-elevata, et margine nunc thallode
conformi instructa; nunc etiam margine proprio donata, et
accessorio cingente discum.

7. G. PALLESCENS.

Nobis.

Thallus tartareus, crustaceus, rugoso-granulatus, subalbidus, pallide-testaceus vel glaucescens, irregulariter extensus, hypothallo pallido. Apothecia tumida, multa et conferta; disco piano pallido, primo thallode conformi; deinde innato albo-pruinose; margine thallode erecto integerrimo persistente turgido.

Januario, Februario, Martio.

Parmelia pallescens Fries lich. europ. n. 129 pag. 132.

Psora alabastrina Hoffm. Germ. pag. 164.

Psora upsalensis Hoffm. Deut. Fl.

Patellaria upsalensis Ach. Prodr. 76 pag. 36. Hoffm.

Pl. lich. tab. 21 f. 2.

Patellaria pallescens Ach. Prodr. pag. 36.

Lichen pallescens Linn. Spec. et Fl. Suec. et Auct. Ach. Prodr. 76 pag. 36.

Lichen upsalensis Linn. Retz. Prod. 2. Liljebl. Hoffb. Gunn. Dicks. Hoffm. En. lich. Witer. Gm. Syst. Linn. Ach. Prod. 77 pag. 37.

Lichen albo-flavescens Wulf. in Jacq. Coll. III pag. 111 tab. 5 f. 1.

Lichen Tunnesi Engl. bot. tab. 857.

Icon. Jacq. Coll. III tab. 5 f. 1.

Engl. Bot. tab. 857, 4634.

Hoffm. Pl. lich. tab. 21 f. 2.

Hoffm. En. et Descr. lich. tab. 7 f. 4.

Dicks. Crypt. Britt. T. 7 f. 7 mala.

Lich. Suec. n. 103 et 286.

Ehrh. Phytoph. n. 20.

Habit. Ad plana loca et elevata Europae.

Statio. Ad muscos, cortices, et saxa. Messina, Catania, Etna, Palermo ubique.

Var. b Parella.

Thallus, crusta amylaceo-tartarea, lactea, verrucosa. Apothecia grandiuscula; disco luteolo, rimoso vel verrucoso; margine turgido albido crustae conformi.

Januario, Februario, Martio.

Parmelia pallescens var. b *parella* Fries lich. europ.

429 pag. 133.

Patellaria parella Ach. Prodr. n. 75 pag. 36. Hoffm.

Pl. lich. tab. 6 f. 2. En. et Descr. tab. 12 f. 5.

Verrucaria parella Hoffm. Deut. Fl. Wigg.

Lichen parellus Lin. Mant. Engl. Bot. tab. 727. Fl. Dan.

tab. 1946 f. 1. Retz. Pr. 2. Liljebl. Hoffm. En. lich. Huds.

Web. Lightf. Neck. Leers. Doerr. Roth. Mohr. Bellardi. Wi-

ther. Reh. Gmel. Syst. Linu. Ach. Prodr. 75 pag. 36.

Lichenoides leprosum tinctorium, scutellis lapidum can-
eri figura Dill. Hist. Musc. 130 tab. 18 f. 10.

Icon. Engl. Bot. tab. 727.

Fl. Dan. tab. 1946 f. 1.

Hoffm. Pl. Lich. tab. 42 f. 5.

Hoffm. Adnumbr. et Descr. tab. 42 f. 5.

Lich. Suec. n. 137.

Ehrh. Phyt. n. 100..

Dill. Musc. tab. 18 f. 10.

Habit. In planis et montosis Europae regionibus.

Statio. In rupibus maritis, in muris, ad calcarea saxa
praesertim vento exposita. Filicuri 2497 p. p. ex Guasone.
Ætnae ad cortices Castanæ, et Quercus a 3338 p. p. usque
ad 5892 p. p.

Observ. Ex hoc lichene consicitur colorem rubro-violaceum
quad galli appellant orseille; quamvis ex *Rocella tinctoria*,
et *Crotone tinctorio* etiam obtineri possit. Vide Hoffm. Ad.
et Desc. cit. vol. 1, pag. 61 et seq. Amoreux Rech. et ex-
perien. sur les divers. lich. 1786 Lyon.

8. G. sorbodes.

Nobis.

Thallus, crusta tartarea verrucoso-granulata vel verruculis
composita, e lacte-viridi fuscescente vel cinereo-virescente,
orbiculari, dein irregularis et fusco limitata; hypothallus niger.
Apothecia in singulis verrucis adnata, in medio crustæ con-
fertissima, versus ambitum propullulantia; disco opaco im-
pedito, fusco-atro, margine thallode concolor.

Januario, Februario, Martio.

Parmelia sophodes Fries lich. europ. 141 pag. 149.

Ach. Meth. pag. 155. S. Garovaglio lich. It. D. 24 n. 4.

Lecanora sophodes, colobina Ach. Lich. univers. pag. 357, 358.

Lecanora sophodes et mortosa Ach. Syn. pag. 153, 154.

Patellaria sophodes Ach. Prodr. 143 pag. 67.

Lichen sophodes Ach. Prodr. I. c. Engl. Bot. tab. 1791.

Icon. Lich. Suec. n. 252.

Engl. Bot. tab. 1791.

Habit. Europa in elatis regionibus.

Statio. In elatis regionibus Etnae, ad saxa vulcanica, et super muscos Bongiardo, Zaffarana 1759 p. p.

Var. b Melanochlora.

Crusta verrucosa fusco-cinerascens. Apothecia majora constanter atra, margine thallode concolore.

Aprilis.

Parmelia melanochlora Sommerf. lapp. pag. 98. Fries lich. europ. pag. 150.

Habit. Europa in elatis regionibus.

Statio. Etnae limite inferiore del Pinus laricio nella strada che conduce al cono del monte 4734 p. p.

9. G. FERRUGINEA.

Nobis.

Thallus, crusta subcartilaginea, primitus contigua, deinde areolata, verrucosa, albida, aut albo-cinerea, diffusa; hypothallus niger, et saepius e lineis nigris crustam vel areolas limitantibus dignoscitur. Apothecia numerosa primo plana, dein convexa, parum elevata, disco opaco luteo-ferrugineo, quandoque aurantiaco, fulvo, croceo, sanguineo, atro-sanguineo; margine proprio elevato, colorato, subnitido, flexuoso, sensim evanescente, margine accessorio thallode conformi nunc persistente, nunc evanescente.

Januario.

Parmelia ferruginea Fries Act. Ac. Handl. 1822 pag. 274. Lich. europ. 160 pag. 170. S. Garovaglio Lich. Ital. D. 16 n. 2.

- Patellaria cinereo-fusca* Ach. Prodr. 92 pag. 44. Hoffm.
 Pl. lich. tab. 12 f. 1.
- Patellaria ferruginea* Hoff. Pl. lich. tab. 35 f. 4. Descr.
 et Adumbr. lich. vol. 2 tab. 35 f. 4. DC. et LK. Fl. Fr. 2
 pag. 358. Duby Bot. Gall. 69 pag. 655. Leman Dict. Sc.
 Nat. tab. 38 pag. 80 n. 9.
- Verrucaria ferruginea* Hoffm. Deut. Fl.
- Verrucaria cinereo-fusca* Wigg. prim.
- Lecidea ferruginea* Sommerf. lapp. pag. 168.
- Lecidea cinereofusca* Ach. Syn. pag. 43. Meth. lich. 68.
- Lichen cinereofuscus* Ach. Prodr. 92 pag. 44. Weber Spic.
 pag. 188. Allioni Schrad. Spicil. Roth. Tent. Gmel. Syst.
 linn.
- Lichen ferrugineus* Huds. Fl. Engl. Engl. Bot. tab. 1650.
- Lichen ferruginosus* Gm. Syst. linn.
- Lichen vernalis* Lightf. Fl. Scot. 805.
- Lichen crenularius* With. arr. 4 tab. 31 f. 5.
- Lichen fulvus* Villars n. 131.
- Lichenoides leprosum*, *tuberculis fuscis et ferrugineis*
 Dill. Hist. Musc. 126 tab. 18 f. 4.
- Lichen crustaceus arboribus adnascens, crista cinerea*
tenui, ex albo subcinerea, receptaculis florum atro-rufis, ad
ferrugineum tendentibus Mich. gen. 97 n. 25.
- Icon.* Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab. 35 f. 4 optima.
 Engl. Bot. tab. 1650.
- Hoffm. Pl. lich. tab. 35 f. 4 tab. 12 f. 4.
- With. arr. tab. 31 f. 5.
- Dill. Hist. Musc. tab. 18 f. 4.
- Mich. Nova gen. 97 n. 25.
- Lich. Suec. n. 227.
- Var. b Festiva.*
- Crusta cinerascente, areolata; apotheciis rufis margine*
accessorio destitutis, margine proprio disci colore subaequali,
demum evanescente.
- Januario.
- Parmelia ferruginea* var. *festiva* Fries lich. europ. pag.
 14. Sched. Crit. 13 pag. 8.

Lecidea caesiorufa Ach. ex Fries l. c. var. *festiva*: idem
Syn. lich. pag. 44.

Patellaria caesiorufa Ach. Prodri. pag. 45.

Patellaria lamprocheila DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 357.

Lichen caesiorufus Ach. Prodri. n. 93 pag. 45. Schrad.
Spicil. Fl. Germ.

Icon. Lich. Suec. n. 373,

Fl. Dan. tab. S25 f. 2.

Habit. Ad elata loca et frigida Europae.

Statio. Etnae Linera, Bongiardo ad saxa vulcanica, raro
ad cortices, tam a quam var. b.

10. G. VITELLINA.

Nobis.

Thallus, crusta tartarea subsquamosa, granuloso-coacer-
vata quandoque sparsa, aestate crassiuscula, flavo-vitellina, in
sicco fusco-cinerea; hypothallus macularis albus. Apothecia
sessilia, aggregata aut parum exerta; disco luteo fuscescente,
primum piano margine proprio tenui pallidiori erecto integer-
rimo, deinde disco convexo margine concolori flexuoso.

Januario, Februario, Martio,

Parmelia vitellina Fries lich. europ. n. 155 pag. 162.

Ach. Meth. pag. 176. S. Garovaglio Lich. It. D. 24 n. 5.

Patellaria vitellina Hoffm. Desc. et Adumdr. vol. 2 pag.
5 tab. 26 f. 1. Ach. Prod. 85 pag. 41. Hoffm. Pl. lich.
tab. 26 f. 1. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 359.

Verrucaria vitellina Hoffm. Deut. Fl.

Lecanora vitellina Ach. Syn. pag. 174. A. B. Duby
bot. gall. 4 pag. 662.

Lecidea epixantha Ach. Syn. pag. 48.

Lichen vitellinus Ach. Prodri. 85 pag. 41. Ehrh. Cr.
exs. Retz. Pr. 2. Gm. Syst. Linn.

Lichen candelarius Linn. ex Fries l. c.

Lichen crustaceus, *saxatilis*, *farinaceus*, *verrucosus*, et
granulatus, *luteus* Mich. N. Pl. gen. pag. 99 tab. 53 f. 3.

Icon. Hoffm. Desc. et Adumbr. lich. tab. 26 f. 1. opti-
ma, non tab. 27 f. 2.

Hoffm. Pl. lich. tab. 26 f. 1, non tab. 27 f. 2.

Engl. Bot. tab. 1792.
 Fl. Dan. tab. 1347 f. 2.
 Lich. Suec. n. 160.
 Ehrh. Crypt. n. 155.
 Sommerf. n. 66.
 Moug. et Nestl. n. 744.
 Mich. Nova pl. Gen. tab. 53 f. 3.
Habit. Europa ad saxa et cortices in montosis magis
 quam planis regionibus.
Stat. Etnac Bongiardo 1094 p. p. Linera, Zaffarana al
 limite della vegetazione del Citrus aurantium 1859 p. p.

VII. PARMELIA

Endlich. or. XI Hymenothalami Trib. III Parmeliaceae
 gen. 172.

Thallus foliaceus, imbricatus, e centro horizontaliter ex-
 pansus, forma et colore varius, foliolis sinuatis, crenatis, hy-
 pothallo suffultus fibrillosus. Apothecia scutellata, elevata,
 plus minus podicellata, disco vario, strato thallode conformi
 imposito.

Parmelia spec. Fries lich. Europ. gen. 7 pag. 56 idem
 Syst. Orb. Veg.

Patellaria spec. Ach. Prod. Synop. Hoffm. Descr. et
 Adumbr. lich.

Imbricaria DC. et LK. Fl. Fr. Syn. Fl. gall. Duby
 Bot. gall.

Placodium spec. DC. Fl. Fr. 2.

Lobaria Hoffm. Germ. et alior.

Lecanora Ach. lich. Univers.

Lichen Lin. et auctorum multorum.

Lichenoides Dill. Hist. Reliqua synon. infra.

SECTIO I.

IMBRICARIAE

Thallus imbricato-foliaceus ex apothecii abortu saepe, nigro-punctatus. Apothecia, elevata, subpodicellata, regularia; disco nudo, thallode imposito.

1. P. TILIACEA.

Ach. lich. Univ. pag. 460. Fries lich. Europ. 51 pag. 59.

Duby Bot. gall. 4 pag. 601. S. Garovaglio lich. Ital. D. 3 n. 4.

Thallus foliaceus, imbricatus, submembranaceus, lobatus, lobis inaequalibus, sinuatis, rotundatis, 3—5—multi partitis vel fidis, dentato-crenatis; laevigatus aut bullosus, glauco-albicans, saepius pruinosis, vel pustulosus, pustulis acutis albidis, aut verrucosus, et verrucis viridi-olivaceis, vel fuscis: verrucae sub lente haemisphericae basi glaucae, apice punctato crasso colorato; hypothallus fusco-niger fibrillosus fibrillis multifidis fusco-atris longiusculis. Apothecia sentellata, orbiculata sub-podiciata, podocio brevi; disco badio vel brunneo laevigato, primitus conniventi-glauco dein plano, et marginato, margine thallode conformi et concolori integro, rarissime sinuato, et evanescente.

Novembri, Dicembri, Januario, Februario, Martio, Aprili.

Imbricaria quercina Ach. Prodr. pag. 125. DC. et LK.

Fl. Fr. 2 pag. 390. Leman Dict. Sc. Nat. T. 23 pag. 41 n. 6.

Imbricaria scorteae Ach. Prodr. n. 211 pag. 119.

Lobaria tiliacea Hoffm. Germ.

Lichen quercinus Wild. Fl. Ber. n. 1018 tab. 9 f. 2.

Roth. tentamen. Gm. Syst. linn. pag. 1367.

Lichen quercifolius Wulf. ap. Jacq. Coll. 3 tab. 9 f. 2 pag. 127. Encycl. meth. tab. 3 pag. 366 n. 72.

Lichen tiliaceus Dicks. Smith. Act. Soc. Linn. Hoffm. En. lich. pag. 96 tab. 16 f. 2. Engl. Bot. tab. 700. Gm. Syst. linn.

Lichen physodes Ueria Cat. Hor. R. Panor. pag. 439 non Linn.

Lichen Hall. helv. n. 2008. Leers herb. n. 955.

Lichen pulmonarius folio inferne nigricans, superne cinereus, receptaculis florum sordide virescentibus Mich. N. Pl. gen. pag. 86 or. 15 tab. 45.

Nom. Siculum Varvazzi d' arvulu Ucr. l. c. ab aetnicolis Lippu di cerza.

Icon. Wild. Fl. Ber. tab. 9 f. 2.

Hoffm. En. lich. tab. 46 f. 2.

Lich. Suec. n. 169.

Ehrh. Cr. n. 59.

Moug. et Nestl. n. 445.

Wulf. in Jacq. Coll. 3 tab. 9 f. 2.

Engl. Bot. tab. 700.

Habit. In tota Europa, ad loca elata subalpina et alpina humida.

Stat. Ad cortices, ligna, rupes, muscos regionis subalpinae totius Siciliae, et nemorum. Monte Scuderi 2994 p. p. (Prestandrea). Arcimusco 3851 p. p. Monte Albano 996 p. p. Pizzo di Palermo 5636 p. p. Piede del cozzo di Mosera 4411 p. p. Monte Bomiso 3364 p. p. Monte Cuccio 3257 p. p. S. Martino 1557 p. p. Etnae ubique Massanunziata 1696 p. p. Nicolosi S. Nicola 2298 p. p. Trecastagni 1680 p. p. Bronte 2549 p. p. Maletto 3285 p. p. usque ad limitem nemorum 5892 p. p.

2. P. PARIETINA.

Ach. Meth. lich. 213. Fries lich. europ. 67 pag. 72. Dufour in litt. 1818 ex Fries l. c. Targ. Tozz. Ist. Bot. T. 3 n. 1686. Duby Bot. gall. 36 pag. 606. Garov. Lich. It. D. 3 n. 3.

Thallus foliaceus vel squamulosus imbricatus, membranaceus ambitu sublobatus, multisinuatus, crispus, lobis rotundatis, crenatis, vel subdentatis; in orbem expansus; viridi-flavus, aut flavo-auratus, vel luteus vel fulvus; aetate viridis et ultimo fusco-cinereus; hypothallus albidus et limbo auratus, glaber foveolatus, et fibrillis albis apice subfuscis aparsus. Apothecia elevata marginalata, margine thallode concolore, primo clausa dein scutellata integerrima, disco luteo.

Thallus foliaceus evanescit aetate, verrucosus ac pulverulentus evadit, ac apothecia sunt copiosissima.

Januario, Februario, Martio, Aprili.

Imbricaria parietina Ach. Prod. pag. 121. LK. et DC.

Fl. Fr. 2 pag. 391. Leman Dict. sc. nat. T. 13 pag. 42 n. 10.

Geisoidea parietina Jaum. S. Hilaire expos. des famill. nat. T. 4 pag. 20.

Lobaria parietina Hoffm. Germ. 150.

Lichen parietinus Linn. sp. pl. 610. Syst. nat. pag. 1368.

Ach. Prodr. 215 pag. 121. Hoffm. En. lich. tab. 18 f. 1 idem de lich. usu pag. 33. Encycl. meth. T. 3 p. 2 pag. 462 n. 45. Thumb. Fap. Retz. Pr. 2. Hoffb. Liljebl. Weis. Huds. Pollich. pal. n. 1103. Lightf. Scot. pag. 822. Hagen Lich. pag. 74 n. 38. Ucria Cat. Hor. R. Panor. pag. 439. Desf. Fl. Atlant. T. 2 pag. 419. Leers. Gunn. Wild. Prodr. Maltusc. Allion. Leyss. Scop. Reich. Fl. Humb. Schell. Gmel. Tubing. Doerr. Neck. Deliciae mulie. Mobr. Wigg. Lumnitz. Schrank. Wither. Gmel. Syst. linn.

Lichen juniperinus Nеч. meth.

Lichen Dioscoridis et Plinii secundus, colore flavescente.

Col. Ecphr. 1 pag. 331. Tournefort Inst. R. Herb. 548.

Lichen. Haller helv. n. 2021.

Lichenoides crusta foliosa scutellata flavescentia Raj. Synops.

3 pag. 72 n. 59.

Lichenoides vulgare sinuosum, foliis et scutellis luteis Dill. Hist. Musc. pag. 180 tab. 24 f. 76.

Musco-fungus lichenoides minor vulgatissimus flavus Moris.

Hist. 3 pag. 634 n. 8.

Nom. Sicul. Lippu di petri e di canali giarnu.

Icon. Lich. Suec. n. 258.

Ehrh. Cr. 146.

Moug. et Nestl. n. 66.

Desmaz. n. 143.

Sowerby Engl. Bot. tab. 194.

Hoffm. En. lich. tab. 18 f. 1.

Humb. Fl. Frib. T. 2 f. 2.

Suec. Bot. tab. 648.

Fl. Dan. tab. 1005.

Dillen. Hist. Musc. tab. 24 f. 76.

*Var. b Foliosa.**Nobis.*

Thallus foliaceus, flavus, aut subviridis, lobis explanatis, aut concretis et zonalim aureo-vitellinis; aliquando laciniis angustis adpressis, vel squamulosis lacero-dissectis adscendentibus; nunc lobis diminutis conglomeratis complicatis; denique obliteratis aut brevissimis adpressis: apothecia semper marginata conferta, margine thallode concolori.

Januario, Februario, Martio, Aprili.

Parmelia parietina var. *aureola*, *ectanea*, *rutilans*, *laci-*
niosa, *polycarpa*, *lobulata* Fries op. cit. pag. 73.

Parmelia aureola Ach. Lich. Univ.*Parmelia ectanea* Ach. l. c.*Parmelia rutilans* Ach. l. c.*Parmelia laciniosa* Dufour ex Fries l. c.*Parmelia parietina* Dufour in litt. ex Fries l. c.*Lecanora candellaria* b Ach. l. c.*Lecanora polycarpa* Florke.*Lecanora lobulata* Florke.*Lecanora candellaria* v. *lobulata* Ach. ex Fries l. c.*Lichen polycarpus* Ehrh. Engl. Bot. tab. 1795.*Icon.* Ehrh. Engl. Bot. tab. 1795.

Lich. Suec. n. 106 et 325.

Fl. Deutsch. n. 90 et 14.

Ehrh. Crit. 136.

*Var. c Subcrustacea.**Nobis.*

Thallus subcrustaceus, marginibus pulverulentus, raro in pulverem fatiscens; nunc substellatus laciniatus pulverulentus, aut squamulosus, squamis ascendentibus confertis; nunc thalli laciniis teretiusculis ramulosis; aut crustaceis lobulato-granulosis; denique in pulverem viridi-flavescentem solutus; apothecia semper marginata, thallode concolori; at in thallo squamuoso nudo apothecia sunt marginata, margine thallo evanido discolori.

Januario, Februario, Martio, Aprili.

46

Parmelia parietina var. *substellata*, *concolor*, *pygmaea*,
lychnaea, *citrinella*, *biallorina* Fries lich. Europ. pag. 73-4.

Parmelia citrina Ach. lich. univ.

Parmelia substellata Ach. l. c.

Lecanora candellaria a Ach. l. c.

Borrera pygmaea Bory.

Physcia culminalis Lapyl.

Verrucaria Flava Hoffm.

Lepraria botryoides Auctorum.

Lichen candelarius Engl. Bot. 1794. Westr. Farglaſv.

tab. 5 f. c. Wadel. var. *Finnmarkica* Ach.

Lichen concolor Dicks. 3 tab. 9 f. 8.

Icon. Lich. Suec. n. 237 et 324.

Engl. Bot. 1764.

Westr. Farglaſv. tab. 5.

Dicks. tab. 9 f. 8.

Ehrh. Crypt. n. 126.

Moug. et Nestl. n. 743.

Fl. Deutsch. n. 171 et 108.

Habit. Per omnem Europam, Africam, nec non Americam vulgatissima.

Statio. Ubique in Sicilia et insulis adiacentibus etiam frequentissima, ad saxa cujuscumque naturae, ad cortices, ligna, parietes, tecta; in siccis et humentibus locis; in planis mari proximis, et elatis, ac alpinis regionibus. Species a occurrit ad loca aprica et subhumentia; var. b in virgultis, ramis tenuioribus, in corticibus laevigatis; var. c in saxis apicis vento expositis, aut ad saxa humida; at saepe confusae inter se videntur Catanae, Panormi, Messanae, Siracusis et omnibus locis mari proximis. nec non ad regionem subalpicam et alpinam. Pollina vicino Cesalù 2383 p. p. Geraci 3616 p. p. S. Mauro castello 3399 p. p. Cozzo di Mofera 5516 p. p. Pizzo di Palermo 5936 p. p. Monte Pellegrino 1410 p. p. Monte S. Giuliano 2049 p. p. Etnae limite del *Citrus aurantium* 1859 p. p. limite del *Populus tremula* 5292 p. p. limite della *Pteris aquilina* 5619 p. p. della *Betula alba* 4761 p. p. della *Berberis vulgaris* 7110 p. p. del *Ilex*

aquifolium 4764 p. p. In insula Ustica 964 p. p. Gussone.

3. P. CAPERATA.

Ach. Lich. Univers. pag. 457. Fries Lich. Europ. n. 62
pag. 69. Duby Bot. Gall. 4 pag. 601. Targ. Tozz. Inst.
Bot. T. 3 n. 1687. S. Garovaglio Lich. Ital. D. 17 n. 2.

Thallus foliaceo-imbricatus submembranaceus in orbem expansus ab unciali ad pedalem usque dimensionem, per ambitum lobatus, lobis sinuato-laciniatis apice subintegris vel sinuato crenatis; ochroleucus denique glaucus, in sicco flavescenti glaucus: superne rugis oblongis et obliquis, pulverulento-granulosis, centrum versus crassioribus exasperatus verrucaeformibus; verrucae sub lente subrotundae pulverulentae, confluentes, adspersae punctis nigris; hypothallus fuscus vel nigricans, fibrillis nigris sparsus simplicibus vel ramosis. Apothecia primum sessilia, dein subpodeciata, scutellata, marginata, margine thallose conformi revoluta et crenulata; disco atro-purpureo, badio-rubro, carneo, vel viridi-rufo.

Januario, Februario, Martio.

Imbricaria caperata Ach. Prodr. pag. 449. DC. et LK.

Fl. Fr. 2 pag. 392.

Parmelia rupestris b' Ach. Syn. pag. 197.

Lobaria caperata Hoffm. Gem. 148.

Platismma caperatum Hoffm. Desc. et Adumbr. lich. vol. 2 pag. 50 tab. 38 f. 1 tab. 39 42 f. 1 optimae.

Lichen caperatus Linn. Syst. veget. 960. Sp. pl. 1914.
Syst. pl. 542. Roy lugd. b sic. Guett. Hamp. 51. Moll.
Fridr. 212. Gunn. norv. 690. Neck. gallob. 511. Meth. 95.
Scop. carn. 2, 1394. Hoffm. En. lich. pag. 94 tab. 19 f. 2
tab. 20 f. 2. Baumg. Lips. 569. Wolf. Jacq. Collect. 4,
280 tab. 20 f. 1 bona. LK. Encycl. Bot. 483. Weis crypt.
74. Leers herb. 967. Pollich. palat. 1114. Lightf. scot. 837.
Huds. angl. 543. Retzius Scandin. 1363. Gorter Fl. 7 prov.
309. Leys. hal. 1153. Allioni Fl. ped. 2565. Chlor. lugd.
36. Relb. cantabr. 433. Wilden. berol. 352. Timm. megap. 248.
Reth. germ. 504. Schrank bav. 1516. Ach. Prodr. 212 pag. 119.

Lichen fronde rotunde lobata, rugosa, inferne alra et aspera Haller hist. 2005.

Lichen pulmonarius, saxis et arboribus adnascens, major inferne nigricans, superne e sulphureo cinereus, receptaculis florum amplioribus, intus sordide et obsolete viridibus Mich. N. pl. gen. 89 tab. 48 f. 1 non bona.

Lichenoides caperatum rosaceae expansum e sulphureo virens Dill. Hist. Musc. 193 tab. 25 f. 97 a, b, c medioris.

Musco-fungus lichenoides, crustae modo adnascens major cinereus Moris hist. 3, 633 tab. 7 f. 1 imperfecta.

Icon. Hoffm. Adumbr. et Descr. lich. tab. 38 f. 1 tab. 39 f. 1 tab. 42 f. 1.

Hoffm. En. lich. tab. 19 f. 2 tab. 20 f. 2.

Lich. Suec. n. 293.

Ehrh. Cr. n. 417.

Moug. et Nestl. n. 255. bona.

Wulf. in Jacq. Coll. 4 tab. 20 f. 1.

Sowerby Engl. Bot. tab. 654.

Dill. tab. 25 f. 96 a, b, c.

Vaill. Bot. tab. 21 f. 42.

Moris. tab. 7 f. 1.

Michel. Gen. tab. 48 f. 1.

Habit. Europa et Africa frequens tam in elatis, quam planis regionibus.

Stat. Ad saxa cujuscumque naturae, et truncos in tota Sicilia Messanae Mandanici fosse di carnevale (Prestandrea), Catanae et Panormi ac locis proximis, Aetnae Carpineto, Cerrita vicino al Castagno di cento-cavalli 2146 p. p. ad nemora 4734 p. p. et 5892 p. p.

4. P. OLIVACEA.

Ach. Meth. lich. 213. Syn. pag. 200. Fries lich. Europ. 38 pag. 66. Duby Bot. gall. n. 8 pag. 602. S. Garovaglio Lich. Ital. D. 3 n. 2.

Thallus foliaceus membranaceus extensus orbicularis aut irregulariter expansus, plicato-radiosus, subimbricatus, crispus, bulloso-rugosus, rugis arcuato-concavis; umbrino-olivaceus, nitidus, lividus, in sicco fusco-aeneus et lucidus; lobis rotundatis, planis, aut multifidis et crenatis; thallus variat glaber, aut elevato-punctatus, aut pulveraceo-granulosus; pul-

vere viridi-olivaceo; hypothallus fuscus subbrillosus, fibrillis brevibus nigro-fuscis. Apothecia scutellata, inaequalia, parum elevata; normaliter occurunt viridi-olivacea, sed spadicea in axis et aeneo-fusca in corticibus; et semper in sicculis specimenibus videntur. disco plano, badio-fusco, raro thallode colori; demum margine crenato, aliquando integro.

Januario, Februario, Martio.

Imbricaria olivacea DC. et L.K. Fl. Fr. 2 pag. 392.
Leman Dict. sc. nat. T. 23 pag. 43 n. 44. Ach. Prodri
pag. 122.

Lobaria olivacea Hoffm. Detit. Fl.

Parmelia collematiformis Schleich. Cat.

Collema exasperatum Ach. ex Fries. I. c.

Lichen olivaceus Lin. Syst. nat. 152 pag. 1367. Hoffm.
En. lich. 3 tab. 13 f. 5. Encycl. Meth. T. 3 p. 2 pag. 463
n. 59. Pollich. palat. 819. Vitman vol. 6 pag. 245. Ach.
prodri. 216 pag. 124. Retz. pr. 2. Liljebl. Hoffb. Huds.
Wulf. Ligthf. Weis. Reich. fl. Scholl. Relhan. Neck. delic.
Schreb. spicil. Leers. Doerr. Mattioli. Hag. Leyss. All. Wigg.
Wild. prodri. Hult. Mull. Lummitz. Mohr. Wilher. Gmel. syst.
Linn.

Lichen pullus Schreb. spicil. n. 1121. Swartz. Act.
Upsal. 4. Retz. Prodri. 2. Web. Hag. Allioni. Neck. delic. et
meth. Wigg. Wild. prodri. Roth. tent. Scholl. Gm. syst. Linn.

Lichen crustae modo arboribus adnascens olivaceus Vaill.
Paris. tab. 20 f. 8.

Lichen pulmonarius saxatilis subtilis nigricans. desuper
olivae conditae colore, receptaculis florum concoloribus Mich.
N. Pl. gen. 89 tab. 51 or. 19.

Lichen crustae modo arboribus adnascens Tourdefort inst.
f. her. 548.

Lichenoides olivaceum scutellis amplioribus crenatis Dill.
Hist. Musc. 184 tab. 24 f. 78.

Lichenoides olivaceum scutellis laevibus Dill. Hist. Musc.
pag. 182 tab. 24 f. 77.

Icon. Hoffm. Pl. lich. vol. 2 pag. 45 tab. 36 f. 2.
Hoffm. Enum. lich. tab. 13 f. 3, 4, 5. 7

50

Lich. Suec. n. 260.

Moug. et Nestl. n. 161.

Vaill. Fl. Paris. tab. 20 f. 8.

Dill. Hist. Musc. tab. 24 f. 77, 78.

Mich. Nova pl. gen. tab. 51 or. 19.

Habit. In Europa ad plana et elata loca.

Stat. Ad saxa vulcanica mari proxima et subalpinæ ac alpinae regionis, nec non ad cortices Quercus. Ulmi, Castaneæ. Catanae, Etnæ ubique : Paternò 620 p. p. Maletto 3285 p. p. Bronte 2549 p. p. Bosco di Nicolosi 4586 p. p. et 5892 p. p. Militello, Vizzini, Mineo, Palagonia e tutto il val di Noto.

5. P. ACETABULUM.

Fries lich. Europ. 57 pag. 65. Duby Bot. gall. 2 pag. 106.

Thallus foliaceus imbricatus, membranaceus, rugulosus, lobis latis, rotundatis, repandis, aut crenatis, crenis inaequilibus ; viridi-olivaceus, in sicco plumbeus, et hinc inde glaucescit ; hypothallus pallidior, nigro-sibrillosus, sibrillis brevibus nigro-fuscis. Apothecia scutellata, magna deinde subpodicellata, primo hemispherica ; disco concavo aeneo-rufescente, aut badio, margine crenulato : thallode et disco dixitincto.

Martio, Aprili, Majo.

Parmelia corrugata Ach. Meth. pag. 215.

Imbricaria acetabulum DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 392.

Syn. Fl. Gall. 1062 pag. 84.

Imbricaria corrugata Ach. Prodr. pag. 122.

Lobaria acetabulum Hoffm. Deut. Fl.

Lichen corrugatus Ach. Prodr. 217 pag. 122. Smith.

Schrad. in Spicil.

Lichen acetabulum Neck. Delic. et Meth. Hoffm. Enum.

lichen. tab. 18 f. 2. Wulff in Jacq. Coll. 3 tab. 9 f. 4.

Rustr. Gmel. Syst. linn.

Lichen patellatus Gmel. Syst. linn.

Lichen serratus Gmel. Syst. linn.

Lichen Leers herb. n. 956.

Lichen pulmonarius inferne obscurus desuper e glauco subvirescens, receptaculis florum amplioribus, a densioribus atrofuscis Mich. N. Pl. Gen. tab. 48 f. 2 optima.

- Lichen pulmonarius arboreus e cinereo viridis* Vail. Fl.
 Paris. tab. 24 f. 13.
Icon. Hoffm. En. lich. tab. 48 f. 2.
 Jacq. Coll. 3 tab. 9 f. 1.
 Lich. Suec. 292.
 Ehrh. Crypt. 127.
 Moug. et Nestl. 256.
 Dill. Hist. Musc. tab. 24 f. 79.
 Mich. N. Pl. Gen. tab. 48 f. 2.
 Vail. Fl. Paris. tab. 24 f. 13.
Habit. Ad clata loca Europae.

Statio Ad nemora subalpinæ et alpineæ regionis in Sicilia,
 super cortices arborum frondosarum. Etna boschi di Nicolosi
 3470 p. p. Maletto boschi 3285 p. p. Trecastagni 1680 p. p.
 sopra il *Pinus laricio* 5892 p. p. Piede del Cozzo di Mofera
 nella catena delle Madonie, tra Collesano e Polizzi 5516 p. p.

6. P. PERLATA.

Ach. lich. univ. pag. 459. Fries lich. Europ. 49 pag. 58.

Thallus foliaceus imbricatus membranaceus in palmarem
 latitudinem saepe extensus, lobis rotundatis profunde laciniatis,
 laciniis multifidis, sidis rotundatis nudis; virescenti-glaucus,
 et albo-glaucus in sicco; laevigatus, aliquando maculis fuscis
 vel nigris adspersus aut aliquantum rugosus; hypothallus fusco-
 niger, reticulatus, lacunis et rugis nigris exaratus, obsolete
 fibrillosus, fibrillis nigris. Apothecia subpodicellata, primo
 hemispherica, dein concava scutellata, disco rubro, in sicco
 bradio, margine tenui, in sicco crenulato, contracto, rugoso.

Martio, Aprili, Majo.

Parmelia plicata Pers. ex Fries l. c.

Lobaria perlata Ach. Prodr. pag. 153. Hoffm. Dent. Fl.

Lichen perlatus Linn. Liljebl. Huds. Pollich. Wulf. in
 Jacq. Coll. 4 pag. 273 tab. 10. Neck. meth. Leers. Roth.
 test. Wether. Relham. Gmel. Syst. linn. Ach. prodr. 259
 pag. 153.

*Lichen pulmonarius, saxatilis, cinereus, minor, umbilicis
 nigricantibus* Vail. Tab. 24 f. 12 non bona.

Lichen pulmonarius, crispus, inferne nigerrimus, et glaber,

superne cinereus, receptaculis Normm suboscuris Mich. N. Pl.
Gen. pag. 94 Tab. 50 f. 4 optima.

Lichenoides glaucum perlatum, sublus nigrum et cirro-
sum Dill. Hist. Musc. pag. 147 tab. 20 f. 39 a, b, c, d
optimae.

Lichen glaucus Auct. Europae austr. ex Fries I. c.
Icon. Moug. et Nestl. n. 283.

Jacq. Coll. 4 tab. 10.

Dill. Hist. Musc. Tab. 20 f. 39.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 50 f. 1.

Vaill. Fl. Paris. tab. 24 f. 12.

Habit. In Europae regionibus meridionalibus frequens,
et Africæ locis non longe a mari dissitis.

Stat. Ad calcarea saxa, et corticis arborum alpinae et
subalpinae regionis Siciliae. Madoniis obvia (Gussone). Pol-
lina 2383 p. p. Santo Mauro 3399 p. p. Collesano 1397 p. p.
Pizzo di Palermo 5936 p. p.

SECTIO II.

PHYSIÆ

Thallus foliacens, adscendens aut prostratus stellaris;
hypothallus fibrillosus aut nudus. Apothecia primo clausa,
dein dehiscentia; disco crassiusculo strato medullari imposito.

7. P. CILIARIS.

Ach. Meth. lich. pag. 255. Fries lich. Europ. 70 pag. 77.

Thallus cartilagineus nunc laxè decumbens etstellato-
expansus in horizontali; nunc in verticali adscendens, semper
Jaciñatus, laciniis subascendentibus linearibus, inaequalibus,
revolutis, intricatis, confertis, extremitate lacero-dentalis sim-
briatis; subtus canaliculatis, margine fibrillis longis simplicibus
ciliato; ciliis albidis vel thallode concoloribus, spice semper
fusca; thallus vero superne e viridi cervino-glaucus, glaber
vel cervino-fuscus, in sicco cinereo-glaucus et pubescens ad-
paret; verrucosus saepe; verrucis sparsis vel conglomeratis,
thallode concoloribus, vel nigricantibus, quandoque in scutellas

abeuntibus; hypothallus albidus, vel albo-glaucus, reticulatus, lacunosus, punctis nigris sparsus. Apothecia pedicellata, scutellata, marginata, margine thallode aequali et concolori, primo integro, erecto, demum lacero dentato, subcrenato, subverrucoso, disco plano nigro-fusco, in secco livido et fusco, subpruinoso, pruina albido-cinerea.

Januario, Februario, Martio, Aprili, Mayo, Junio.

Physcia ciliaris Ach. Prodr. pag. 173. DC. et LK. Fl.

Fr. 2 pag. 396. Duby Bot. Gall. 9 pag. 612.

Lobaria ciliaris Hoffm. Deut. Fl.

Borrera ciliaris Ach. Syn. lich.

Borrera crinalis Schleich. ex Fries J. c. var. *b* tenella, surrectior.

Lichen ciliaris Linn. Syst. veg. 959. Sp. pl. 1611. Syst. pl. 535. Fl. Suec. 1083. Loesel pruss. 171 fig. 50. Gunn. Norv. 875. Fl. Dan. 711. Hedw. Theor. crypt. tab. 32. Wulff. in Jacq. Coll. 4. pag. 244 tab. 13 fig. 1. Engl. Bot. tab. 1352. Weiss. gott. 62. Pollich. palat. 1106. Scher. spicil. 868. Necker Meth. 101. Gallob. 515. Matt. Sil. 887. Enum. 1082. Scop. carn. 1388. Web. Spicil. 234. Huds. Angl. 558. Lightf. Scot. 828. Hagen lich. 42. Leys. Hall. 1144. Allioni Fl. Ped. 2556. Chlor. lugd. 35. Walden. berol. 1025. Ucria Hor. R. Pan. 439. Ach. Prodr. 184 pag. 173. Retz. Pr. 2. Westr. Act. Sc. Suec. 1791. Hoffb. Liljebl. Reyg. Wigg. Roth tent. Relham. Wither. Reich. Ed. Loes. Schioll. Mull. var. *a* viridis.

Lichen cinereus arboreus marginibus simbriatis Vaill. paris. tab. 10 f. 4 optima. Mich. N. Pl. Gen. 93 or. 28, 2.

Lichen corniculatus planus, ramulis capillatibus, scutellis petiolatis Hall. hist. 1980.

Lichenoides ciliare Hoffm. Adumbr. et Descrip. lich. vol. 1 pag. 16 tab. 3 fig. 4 bona.

Lichenoides hispidum majus et rigidius, scutellis nigris Dill. Hist. Musc. 150 tab. 20 fig. 45.

Musco-fungus arboreus cinereus scutellatus marginibus pilosis Moris. Hist. 3 pag. 654 tab. 7 fig. 6.

Muscus alter platydasyphyllus Colum. Ecphr. 4 pag. 335.

Nom. Sic. Varvazzi d' arvuli cu fogghi pilusi Ucria l. c.

Icon. Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab. 3 fig. 4.

Lich. Suec. n. 139.

Florke Deutesch. n. 152.

Fl. Dan. tab. 711.

Moug. et Nestl. n. 64.

Desmaz. Exs. n. 40.

Jacq. Coll. 4 tab. 13 fig. 4.

Eugl. Bot. tab. 1352.

Hedw. Th. crypt. tab. 32.

Tournef. Inst. R. Her. tab. 326 fig. 5.

Vaill. Paris. tab. 20 fig. 4.

Moris. Hist. tab. 7 fig. 6.

Colum. Aecph. tab. 344.

Habit. Europa ubique ad saxa et cortices.

Stat. Sicilia ubique in subalpinis et alpinis regionibus, ad cortices arborum, ad muscos, et saxa ; nec non insulis adiacentibus. Aetnae : Massanunziale 1696 p. p. Pinilella 4734 p. p. Messanae Mandanici ex Prestandrea. Madouie ex Gussone : Monte Collesano 6000 p. p. Pizzo di Palermo 5936 p. p. Convento presso Collesano 1397 p. p. Piede del Cozzo di Mofera 4411 p. p. Monte Samperi 3355 p. p. Insula Ustica 584 p. p. ex Gussone.

8. *P. stellaris.*

Wallroth. Flechtenk. 4 pag. 432. Fries lich. Europ. 75 pag. 82. Duby Bot. Gall. 9 pag. 605. Garov. lich. Ital. D. 3 n. 6. Ach. Meth. lich. 209. idem Synop. lich.

Thallus subcartilagineus suborbicularis imbricatus expansus, laciniis linearibus profundo-incisis, multifidis, apice crenatis, margine prominulo, saepe rugosis convexis, nudus vel squamulosus, squamis lenticularibus ciuereis, in sicco lucidus ; punctis nigris vel fuscis aut granulis scariosis olivaceis adspersus ; cinereus vel ad cortices velutinos adhaerens, colore varius, viridi-cinereus, cinereo-viridis, et cinereo-fuscus ; hypothallus albus vel albidus fibrillosus, fibrillis albis, aut apice fuscis. Apothecia sessilia, margine tumidulo subintegro, vel subcrenato cinereo, thallode conformi, disco caesio-nigro, vel fusco-albo, subpruinoso.

- Dicembri, Januario, Februario, Martio.
Gessoidea stellaris Jaum. de S. Hilaire Exp. des famill.
 Nat. T. 1 pag. 20.
Imbricaria stellaris DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 386.
 Leman Dict. sc. Nat. T. 23 pag. 39 n. 1. Ach. Prodr. pag. 111.
Lobaria stellaris Hoffm. Deut. Fl.
Lichen stellaris Linn. Syst. Nat. 148 pag. 1367. Reitz
 Prodr. 2. Liljebl. Hoffb. Scop. Huds. Ligif. pag. 824. Al-
 lioni. Gmel. Tubing. et Syst. linn. Reich. Fl. Weis crypt.
 pag. 60. Mull. Neck. Schreb. spicil. Leers. Pollich. pal. n.
 1105. Mattusc. Scholl. Wigg. Hagen Hist. lich. pag. 77.
 Leyss. Reyg. Hoffm. En. lich. pag. 71 tab. 13 fig. 1, 2.
 Wild. Prodr. Roth. tent. Mohr. var. a. With. Lumnitz. LK.
Encyclop. meth. T. 3 pars 2 pag. 463 n. 48. *Ucria Cat.*
 H. R. Pan. pag. 439. Fl. Dan. 957.
Lichen ambiguus Ehrb. ex Fries l. c.
Lichen Haller Helv. n. 2017.
Lichen pulmonarius vulgatissimus, superne albo-cinereus,
 inferne nigricans segmentis angustatis et eleganter divisis, re-
 ceptaculis florum nigricantibus Mich. N. Pl. Gen. pag. 91
 tab. 43 fig. 2 bona.
Lichenoides arboreum, crusta foliosa, albo-cinerea, tenuiter
 et eleganter dissecta, scutellis nigris Raj Synops. 3 pag. 74
 n. 72.
Lichenoides cinereum segmentis argutis stellatis. scutellis
 nigris Dill. Hist. Musc. 176 tab. 24 fig. 70.
Nom. Sicut. Varvarzi d' arvulu eu fogghi strilli Ucria l. c.
Icon. Lichen Suec. n. 206.
Ehrb. crypt. n. 197, 207.
Florke Deutsch. n. 135.
Moug. et Nestl. n. 163.
Desmaz. n. 145.
Hoffm. En. lich. vol. 2 tab. 13 f. 1, 2.
Mich. N. Pl. Gen. tab. 43 f. 2.
Dill. Hist. Musc. tab. 24 fig. 70.
Observ. *Parmelia stellaris* Fries ; a *Parmelia aipolio* Ach.
 et a *Parmelia anthelina* Ach. differt ; quia in Lich. & Par-

melia aipolio thallus est lobatus, lobis planis, rotundatis; hypothallus niger, et nigro-fibrillosus; apothecia sunt caesia: in Lich. s. *Parmelia anhelina* thallus est albus, lobatus, lobis planis multifidis; hypothallus niger tomentosus; apothecia sunt fusca, dein caesia et nigra, Fries lich. Europ. pag. 82 has tres species ad unam *Parm. stellarum* reducit.

Vari. & Hispida.

Fries lich. europ. I. c. Ach. Metb. lich. Garovaglio lich. Ital. D. 46 n. 8..

Thallus subcartilagineus, stellaris, imbricatus, multifidus facinus obtusis inflatis gibbosis; albo-cinereus, in humido virescens; nigro-punctatus, punctis sparsis; hypothallus albus, canaliculatus, fibrillosus, fibrillis sparsis margine elongatis albicantibus, apice nigris. Apothecia sessilia, margine tumido subintegro, disco fusco-albo, aut caesio-nigro, subpruinoso.

Lobaria hispida Hoffm. Deut. Fl.

Borrera tenella Ach. Syn. var. a.

Physcia tenella Prodr. lich. pag. 272, DC. et LK. Fl.

Fr. 2.

Lichen tenellus Swartz Act. Ups. 5, 6. Westr. Ach. Soc. Suec. 1794. Rhelham. Scholl. Roth. tent. Ach. Act. Ac. Sc. Suec. 1797. Gmel. syst. linn. Sowerby Engl. Bot. tab. 1351. Scop. Carn. 1406. Web. Spic. 269. Hagen Lich. 80. Allioni Fl. Ped. 2554. Prodr. 283 pag. 172.

Lichen hispidus Schreb. Spicil. 1120. Scopoli carn. 1, 100. Chlor. lugd. 35. Leers. herb. 958. Wild. berol. 1024. Willd. in Jacq. Coll. 4 tab. 6 fig. d. Fl. Dan. tab. 1186 fig. 1. Reich. Fl. Ketz Pr. 2.

Lichen ciliaris var. Huds; With. var. a. Neck. Delic. var. a. Pollich. var. b. Weis. var. b. Ligthof. var. b. tenellus. Liljeb.

Licher cinereus minor, marginibus pilosis Vaill. paris. tab. 20 fig. 5.

Lichen pulmonarius exiguis, saxis et arboribus innascens, ad margines radicatus, inferne albus, desuper subcinereus, receptaculis flororum nigricantibus. Mich. N. Pl. Gen. 93 or. 82 tab. 50 f. 26 bona.

Lichen fronde profunde laciniala, semitubulosa, ciliata
Hall. Hist. 2019.

Lichenoides hispidum Hoffm. Descr. et Adumbr. lich.
vol. 1 tab. 3 fig. 2, 3 optima.

Lichenoides hispidum minus et tenerius, scutellis nigris
Dill. Hist. Musc. 152 tab. 20 fig. 46.

Icon. Descr. et Adumbr. lich. tab. 3 fig. 2, 3.

Jacq. Coll. 4 tab. 6 fig. d.

Fl. Dan. tab. 4186 fig. 4.

Sowerby Engl. Bot. tab. 1354.

Lich. Suec. n. 206.

Moug. et Nestl. n. 450.

Flore Deutesch. n. 73.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 50 fig. 26.

Vaill. Paris tab. 20 fig. 5.

Dill. Hist. Musc. tab. 20 fig. 46.

Habit. In tota Europa ad subalpina et alpina loca, arida et
humida, tam saxa quam ad cortices arborum, et super muscos.

Stat. In Sicilia ubique tam a quam var. b; ista ad
humida loca super muscos, et cortices frequens; a vero ad
saxa vulcanica vel alterius naturae, et ad velutos cortices
Aetnae - Bongiardo al vallone 1094 p. p. Boschi di Maletto
3285 p. p. Boschi di Nicolosi 5470 p. p. Zaffarana 1859 p. p.
Milo 3000? p. p. Paternò 620 p. p. Aci-Reale 570 p. p.
Randazzo 2545 p. p. Bronte 3549 p. p. Catania, Castelbuono
1300 p. p. ex Minà-Palumbo. In Montibus Hereis obvia.

VIII. STICTA.

Endlicher Or. XI Hymenothalami Tr. III Parmeliaceae
gen. 173. Fries lich. Europ. Or. I Gymnoc. Tr. I Parme-
lacea gen. 7. Lud. Eman. Schaefer Lich. Europ. gen. Meth.
art. Cl. 1 Lich. Discoid. Or. 2 Scutell. gen. 10. Helt. Nat.
Cl. 1 Lich. Discoid. Or. VI Parmel. gen. 11.

Thallus foliaceus membranaceus expansus e centro dilata-
tus, subtilis villosus vel fibrillosus, cyphellis vel maculis disco-
loribus variegatus. Apothecia scutelliformia, margine aut centro

thalli adnata, subtus libera. Discus sub strato gonimo oriens, elevatus, nudus, strato medullari impositus.

Sticta Schreb. Gen. n. 1668. Delise Monogr. du gen. Sticta Paris 1825 cum tab. Fée crypt. cort. tab. 31 f. 2, tab. 23 fig. 1. Hook miscell. tab. 13, 14. Duby Bot. Gall. Ach. Prodr. gen. 17. Sticta et Parm. species Ach. Lich. Univ. et Synops. Fries. S. O. V. Sticta et Lobaria species DC. et LK. Fl. Fr.

Pulmonaria Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. vol. 1 pag. 1, 4. Malt. in Dioscor. 660. Fuchs. 633.

Lobaria Ach. Prodr. Trib. 16 pag. 152.

Dermatodea spec. Vent. Tab. du reg. veg. gen. 6.

Reticularia Baumg. Fl. Lips 341.

Cracodia Linck Hadb. III, 177.

Lichen species Linn. et auct.

Lichenoides Dill. ser. II subd. 4 ex max. parte. Ray synop^s.

1. S. PULMONACEA.

Ach. lich. Univ. pag. 449. Fries lich. Europ. 46 pag. 53. Duby Bot. Gall. 5 pag. 599. Delise Monogr. Stict. tab. 17 fig. 60.

Thallus coriaceus extensus, imbricatus aut simplex, lobatus, lobis latis, sinuatis, unciali circiter latitudine, palmari et ultra longitudine, apice saepe truncatis, aut subbisidis, viridi-fuscus, aut saturate viridis, in sicco subfuscus aut fulvus, lacunoso-reticulatus, reticulis intricatis prominentibus; glaber, vel lenticulis albo-farinosis sparsus; hypothallus flavo-ferrugineus, in sicco ochroleucus, reticulato-foveolatus, reticulis, seu interstiliis foveolarum tomentosis et fuscis, aliquando fibrillosis, et fibrillae fuscae etiam sparsae; ac maculis nudis albis adspersus. Apothecia submarginalia orbicularia, sparsa, etiam duo et tres sociata, sessilia parum elevata in humido, margine integro thalode concolori, et sub lente verrucoso; discus fusco-rufus, purpureus ex atro-rubro, deinde evanescens, planus, rugosus albidus.

Januario, Februario, Martio.

Sticta linita Ach. Synops. lich. pag. 234.

Parmelia pulmonacea Ach. Meth. lich. 220. Targ. Tozz. Inst. Bot. T. 3 pag. 1688.

Parmelia reticulata Hoffm. Desc. et Adumbr. lich. vol. 1 pag. 4 tab. 1 fig. 2 optima.

Lobaria pulmonaria DC. et LK. Syn. Fl. gall. 190 pag. 86. Micheaux Fl. Bor. Americae T. 2 pag. 325. Ach. Prodr. lich. pag. 153. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 402. Hoffm. Fl. Germ. 146. Leman Dict. sc. nat. T. 27 pag. 85.

Dermatodea pulmonaria Jaum. de S. Hilaire Exposit. des famill. nat. T. 1 pag. 20.

Lichen pulmonarius Linn. Syst. veget. 14, 960. Sp. pl. 1612. Syst. pl. ed R. 4, 537. Fl. Suec. 2, 1087. Lapp. 444. J. W. goth. 215. Leers herb. 959. Pollich. Palat. 1108. Weis gott. 64. Gunn. norv. 538. Scop. Carn. 2. 1392. Matt. Sil. 889, enum. 1084. Huds. Engl. 2, 542. Lighthf. scol. 831. Hagen lich. 44. Allioni Fl. Ped. 2559. Leys halens. 2, 1146. Wilden. Fl. Berol. 1032. Retz. Pr. 2. Liljeb. Huffb. Reich. Fl. Reyg. Mattiac. Murray. Prodr. Mull. Mohr. Doerr. Wigg. Scholl. Wither. Rehl. Gmel. Tubing. et Syst. linn. Ach. Pr. 258 pag. 152. Engl. Bot. tab. 572. Westr. Farglaf. tab. 20. Ucria Cat. Hor. R. Pan. pag. 440 Encycl. meth. T. 3 par. 2 pag. 173.

Lichen viviparus Roth bot. mag. 4 pag. 6 tab. 7 f. 3.

Lichen lacunatus, inferne gibbosus, reticulato-farinosis, scutellis lateralibus Hall. Hist. 1936.

Lichen arboreus, seu *Pulmunaria arborea* J. Bauh. hist. 3, 759. Mich. N. Pl. Gen. 86 minor et angustifolia lab. 45 or. 14.

Pulmonaria Matt. in Diosc. 660. Fuchs 676.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis Dill. Hist. Musc. 212 tab. 29 f. 113.

Lichenoides peltatum arboreum maximum Ray Synops. 3, pag. 76 a. 86.

Muscus pulmonarius C. B. P. 361, 7. Blakwel tab. 353.

Musco-fungus arboreus platyphyllus ramosus viridi-fuscus Moris. Hist. 3 pag. 634 sec. 15 tab. 7 fig. 4.

Muscus arboreus pulmonaceus, supra canus, sublus virescens polyschides Cup. Hor. Cat. Suppl. 1 pag. 249; et

Suppl. 2 pag. 64. Pamph. Sic. tab. 499 ed. Bibl. Benedict. Cass. Catanae : vol. 2 tab. 162 ed. Bibl. R. Univers. Catanae. Notandum quod figura Cupani uti optima laudatur a Dillenio Hist. Musc. pag. 215. Dillenius dicit, legendum esse in descriptione citata : supra vitescens subtus canus.

Nom. Sicul. Purpurearia arboria Uer. I. c.

Icon. Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab. 1 f. 2.

Delise Monogr. du gen. Stic. tab. 44 fig. 60—5 : plaf.

formae

Sowerby Engl. Bot tab. 572.

Westr. Farglas. tab. 20.

Lich. Sicc. n. 77.

Meng. et Nestl n. 62.

Florke Deutesch. n. 179.

Roth Bot. Mag. 4 pag. 6 tab. 1 f. 3.

Letman Dict. sc. nat. tab. 55 fig. 5.

Cupani Pamph. Sic. tab. 499, et vol. 2 tab. 162 ed.

citatae

Dill. Hist. Musc. tab. 29 fig. 113.

Mich. N. Pl. Geh. tab. 45 et. 14.

Blakwel tab. 333.

Moris. Hist. sec. 13 tab. 7 fig. 1.

Habit. Europa, Africa, et America in frigidis magis, quam calidis platis frequens.

Stat. In tota Sicilia, et insulis adiacentibus ; super mucos. et arcticos arborum frondosarum, ad nemora et sylvas. *Panzeri* Ficuzza ex Gussone. Boschi di Caronia, di Mandorla, di Graneri vicino Gran-Michele. Aetnae, Bosco del Castagno di cento-cattalli il punto più alto 2500 p. p. Valle del Trifoglio 4764 p. p. Boschi di Bronte, Nicolosi, Randazzo. Ins. Pantelleria 2480 p. p. ex Gussone.

Observ. A medicis antiquis ad pelleenda varia morba pulmonem praecipue afficietia laudatur ; ac in vario tinctorio opere perfervens a quibusdam chemicis commendatur. Vide Hoffm. Ad. et Descr. lich. vol. 4 pag. 5 ; Lamouroux sur l'util. des lich. dans la medee. e les arts. Lyon 1787 ; Mémoires par l'academ. des scienc. belles lett. et arts. de Lyon.

IX. PELTIGERA

Endlicher or. XI *Hymenothalami*. Trib. III *Parmelia-*
ceae gen. 174. *Schaerer* Meth. Art. Cl. 1 or. 1 gen. 4 Meth.
Nat. Cl. 1 or. 1 gen. 7.

Thallus centrifugo-expansus coriaceus, frondosus, lobis
 terminalibus elevatis productis apotheciatis; hypothallus venosus
 aut fibrillosus. Apothecia peltaeformia, thalli lobis marginalibus
 saepe antice innata; at postice sita tunc thalli lobis adnata.
 Discus primitus clausus inferus, seu velo thalloideo fugaci oblectus.

Peltigera Wild. Fl. Ber. 347. Fries lich. Europ. 97
 pag. 41 idem S. O. V. Muser. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag.
 405. *Schaerer* Spic. 12. Hoffm. Descr. et Adumbr. lich,
 vol. 1, 2.

Erioderma Fée crypt. 145 tab. 34 f. 2.

Solorina Ach. Lich. Univ. 98 tab. 1 fig. 6.

Peltidea Ach. Meth. lich. gen. 18. Lich. Univ. 93 40
 f. 7, 8. Prodr. lich. gen. 18.

Coriaria Hoffm. de usu lich. pag. 47.

Nephroma Ach. lich. Univ. 101 tab. 111 f. 4.

Dermathodea Spec. Vent. gen. 6.

Lichen Spec. Linn. et auctor.

Lichenoides Dill. ver. III div. ex maxima parte.

1. P. POLYDACTILA.

Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. vol. 1 pag. 19 tab. iv
 f. 1 non bona. Idem Germ. 105. DC. et LK. Fl. Fr. 2
 pag. 405. Duby Bot. Gall. 14 pag. 598. Fl. Deutesch. lich.
 9 pag. 10. Fries lichen. Europ. 37 pag. 46—7 spec. a et
 var. b.

Thallus coriaceus extensus sinuato-lobatus, lobis latis
 tribus vel quatuor sidis divisis, sensim attenuatis, erectis,
 concavis, margine subintegro aut grosse crenato; subimbri-
 catus, laevis, glaberrimus nitidus glauco vel plumbeo-virescens,
 aut olivaceo-fuscus, caesius, vel fulmosus, intus albus; hypo-
 thallus albidus et venis fuscis aut atris reticulatus, nudiuscu-
 lus aut fibrillis raris sparsus; fibrillae fuscae vel aliae. Apo-*

thecia peltata, apice thalli adscendentē antice sita, ovata, duas tresve lineas longa, unam vel duas lineas lata, sulcata; dein revoluta et in duas, tres, vel quatuor peltas divisa; disco nigro-fusco.

Januario, Februario, Martio, Aprili.

Peltidea polydactyla Ach. Prodr. lich. pag. 168. Meth. lich. 286.

Peltidea canina v. *rufescens* Wahl. Suec.

Peltidea hymenina Ach. Meth. lich.

Peltidea horizontalis Ach. Meth. lich.

Peltidea rufescens Schaer. Spicil. pag. 45 in adnot. et minor.

Peltidea scutata et *collina* Ach. Prodr. pag. 163, 166.

Peltidea canina v. *glabra* Ach. Synops.

Peltidea glacialis Schleik.

Peltidea horizontalis var. *collina* Wahl.

Lichen polydactylus Neckar meth. pag. 85 n. 52. Linn.

Gen. Syst. nat. 234 pag. 1373. Roth. Fl. germ. 1 pag. 508

Retz. Prodr. 2. Encycl. meth. T. 3 par. 2 n. 103 pag. 476.

Leers herb. n. 975. Ach. Prodr. n. 268 pag. 162.

Lichen caninus var. *polydactylon* Web. 270. Lightf. Liljeb. Wither.

Lichen rufescens Wulf. in Jacq. Coll. iv pag. 263 tab. 14 f. 2.

Lichen sentatus Engl. Bot. tab. 1834. Wulf. in Jacq. Coll. ix tab. 18 f. 1. Dicks. Ach. Prodr. pag. 166.

Lichen collinum Ach. Prodr. n. 269 pag. 162.

Lichen terrestris Raj Synops. 23 n. 2.

Lichen pulmonarius major inferne obscurus, desuper cinereo-virescens, receptaculis florum nigricantibus, primum circinnatis, deinde teretibus Mich. N. Pl. Gen. pag. 85 or. 12 n. 4 tab. 44 f. 2.

Lichenoides cinereum polydactylon Dill. Hist. Musc. 207 tab. 28 f. 107.

Lichenoides membranaceum pellucidum, peltis digitatis, geminalis Dill. op. cit. tab. 28 f. 108.

Icon. Lich. Suec. n. 109.

Fl. Deutesch. n. 175, 192.

Schaer. Helv. n. 30.

Motg. et Nestl. n. 639.

Jacq. Coll. iv tab. 14 f. 2 tab. 18 f. 4.

Hoffm. Deser. et Adumbr. lich. tab. 4 f. 4.

Dill. Hist. Musc. tab. 28 f. 107, 108.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 44 f. 6.

Habit. Vulgatissima in Europa ad umida loca.

Statio. In Sicilia ubique super muscos, ad basin trucorum : Etnae Zaffarana 1859 p. p. Bongiardo 1094 p. p. Rinazzi di Nicolosi 3311 p. p. Limite della Pteris aquilina 5619 p. p. Valle del Trifoglietto 4761 p. p. Portella nella valle di Calanna 2972 p. p. Valle di Troina 2358 p. p. Pennizzi 2627 p. p. Caltanisetta 3328 p. p. Monte Samperi 3355 p. p. Monte Busambra 4839 p. p.

2. *P. canina.*

Sched. Crypt. 4 pag. 23. *Fries lich. Europ.* n. 35 pag. 45. *Hoffm. Germ.* 106. *DC. et LK. Fl. Fr.* 2 pag. 406. *Duby Bot. gall.* 10 var. b. *carnea* pag. 398. *Leman Dict. Sc. Nat.* T. 32 pag. 331 n. 3. *Ach. Meth. a. B. y. Wahl. lich. univers.* var. *albescens*.

Thallus coriaceus extensus subimbricatus lobatus, lobis rotundatis, quandoque magnis inaequalibus, sinuatis integris, aut subdentatis, aut crenatis ; viridi-cinerascens, vel fusco-viridis, quandoque maculato-fuscus, tomentosus ; hypothallus albido-roseus, aut albido-fuscus, margine convolutus, venosus, venis reticulatis, confertis, centro fuscis, periferiam versus albidis ; fibrillosus, fibrillae plurimae, rubeolae, aut albidae, apice fuscae ; simplices aut ramosae. Apothecia antice posita in lobulis elongatis adscendentibus, subrotundata ; disco primum sanguineo-fusco dein rufo-fusco, turgido, rotundato, roseo sonato, 2-3 lineas lato, glabro et punctis fuscis sparso, deum apothecia semirevoluta et verticalia.

Januario, Februario, Martio.

Peltigera leucorrhiza Flork et Deutesch. n. 153.

Peltidea canina Ach. Meth. lich. 283. Prodr. pag. 161.

Targ. Tozz. Ist. Bot. T. 3 pag. 501. Biasoletto Escurs. Bot. sullo Scheneberg 1846 pag. 93 n. 8.

Dermatodea canina Jaum., de s. Hilaire expos. des Fam. natur. T. 1 pag. 20.

Coriaria canina Hoffm. de lich. usu pag. 47.

Lichen caninus Lin. Syst. Nat. 232 pag. 1373. Fl. Dan. tab. 767 f. 2. Engl. Bot. tab. 2299. Wulff. in Jacq. Coll. iv pag. 260 tab. 14 f. 1. Encycl. Meth. T. 3 p. 2 pag. 476 var. a. Ucria Cat. Flor. R. Panor. 440. Weis crypt. pag. 78. Pollich. pal. u. 1118. Web. spicil. pag. 269. Lighf. pag. 845. Hagen Lich. pag. 100 n. 5. Ach. prodr. lich. pag. 160. Thumberg Fl. japon. Retz. pr. 2. Hoffb. Liljeb. Huds. Reich. Fl. Mattusch. Allioni. Scholl. Doerr. Leers. Gmel. tubing. Leyss. Murray prodr. Wigg. Roth. tent. Scop. Neck. Crantz. Rayg. Gronov. Gunn. Mull. Mohr. Wither. Relham. Schrank. var. a cinereus. Gmel. Sist. lin.

Lichen cinereus Blak. tab. 336.

Lichen pulmonarius maximus, cinereus-rufescens, inferne subrufus; margine criso, et veluti simbriato. receptaculis florum rubris vel ferrugineis, plane orbiculatis Mich. N. Pl. Gen. pag. 83 or. 12 n. 1 Tab. 44 f. 1.

Lichen terrestris cinereus Vaill. Paris. tab. 21 f. 16 bona.

Lichen pulmonarius saxatilis digitatus major cinereus Tournesort Inst. R. herb. 549.

Lichenoides peltatum terreste cinereum majus, foliis divisis Raj. Syn. 3 pag. 76 n. 87.

Lichenoides subfuscum, peltis horizontalibus planis Dill. Hist. Musc. Tab. 28 f. 104 ABC.

Musco-fungus terrestris latifolius cinereus, hepaticae facie Moris hist. 3 pag. 632 sect. 15 tab. 7 f. 1.

Muscus pulmonarius fungoides Barr. Icon 1278 n. 1 obs. 1281.

Nom. Sicul. Pulmunaria di petri Ucria l. cit.

Icon Lich. Suec. n. 111.

Flork Deutesch. n. 153.

Moug. et Nestl. 154.

Schaer. Helv. **a. 28.**
 Jacq. Collect. iv pag. 260 tab. 14 f. 1.
 Engl. Bot. tab. 2199.
 Fl. Dan. tab. 667 f. 2.
 Vahl. Paris. tab. 21 f. 16.
 Dill. Hist. Musc. tab. 28 f. 104.
 Mich. N. Pl. Gen. Tab. 44 f. 1.
 Blak. tab. 336.
 Moris Hist. 3 sect. 15 tab. 7 f. 1.
 Berril. Icon. 1278 n. 1.
Habit. Vulgalissima ad terram et saxa humida, super
 muscos Europae.
Statio. In Sicilia ubique, ac Aenae variis regionibus:
 Valle del Trifoglietto 4761 p. p. Nicolosi 2298 p. p. Bosco
 del Castagno di cento cavalli 2146 p. p. Zaffarana 1859 p. p.
 Bongiardo 1094 p.p. Castelbuono 1160 p.p. ex Mina-Palumbo.
Ins. Pantelleria 2480 p. p. ex Gussone.

X. CETRARIA

Endlicher or. XI Hymenothalami Trib. IX Usneaceae
 gen. 473. Laud. Eman. Schaefer Lichenum Europaearum
 Genera ex ultraque meth. art. et nat. 1849. Meth. art. Clas-
 sis I Lichen. discoidei ordo I Peltiferi gen. 2. Meth. Nat.
Cl. I discoidei or. 3 cetrariacei gen. 5 Cetraria. Fries
 lich. Europaea or. 1 Gymnocarpi Trib. 1 Parmeliaceae
 gen. 5.

Thallus cartilagineus aut membranaceus, frondosus vel
 subsistulosus, ascendens: fertilis semper suberectus; lobis
 frondosis vel tretiunculis, levibus aut scabris. Hypothallus,
 albus reticulato-lacunosus. Apothecia scutellata peltata, thalli
 lobulis oblique aut apice adnata, excipulum proprium nullum.
Discus leuvis, apertus, strato medullari impositus.

Cetraria Ach. lich. univers 96 tab 10 f. h. 9. Synops.
 lich. 226 excl. speciebus. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 393.

Lobaria species Hoffm. Fl. Germ.

Coelocaulon Link Handb. III pag. 163.

Lichen species Lin. et auctor.

Lichenoides species Dill. Hist. Musc.

1. C. TRISTIS.

Fries lich. Europ. pag. 34 n. 21. Garovaglio Lich. Ital.

D. 2 n. 4.

Thallus caespitulosus erectus rigidus tereti-compressus dichotomus, ramulis fastigiatis elongatis adscendentibus; subitus fuscus supra nigrescens aut piceus, laeviusculus, aut pustulis rotundis aspersus; ab 1 ad 1 1/2 pollicem longus, intus hypothallo albo, et filamentoso. Apothecie terminalia peltata primum concava dein plana, magna, fusco-atra, aut picea, submarginata, integerrima aut denticulata aut subradiata. Discus glaber sub lente tuberculosus, super stratum crassum album.

Majo Junio.

Cornicularia tristis Ach. Prodr. pag. 212 n. 329. Hoffm.

Pl. lich. tab. 14 f. 1 Adumbr. et Descr. lich. vol. 2 pag. 36 tab. 34 f. 1. Duby Bot. Gall. 9 pag. 617. DC. et LK. Fl. Fl. 2 pag. 329. Targ. Tozz. Ist. Bot. pag. 604.

Lobaria rigida Hoffm. Fl. Germ.

Lichen radiatus Huds. angl. 2 pag. 559.

Lichen tristis Web. Spic. 260 tab. 5. Erhar. pl. exsicc.

dec. 1, 10. Engl. Bot. tab. 720. Fl. Dan. tab. 1126 f. 2. Linn. Swart. Retz Prodr. 2. Gmel. Syst. linn.

Lichen rigidus Linn. Syst. veg. 959. Hoffm. Enum. lich. 74. Jacq. miscell. 2, 86 tab. 9 f. 6. Collect. 2, 187 tab. 13 f. 5.

Lichen corniculatus Lightf. Scot. 885.

Lichen gagates LK. Fl. Fr. 1, 53.

Lichen normoericus Gunn. Fl. Norv.

Lichen fucoides Wulf. in Jacq. Collect. 3 tab. 12 f. 3 pag. 143.

Lichen fruticosus durus niger, repetito dichotomus Hall. hist. 1966 tab. 47 f. 1.

Coralloides corniculatum, fuci tenuioris facie Dill. Hist. Musc. 118 tab. 17 f. 37.

Icon. Hoffm. Descr. et Adam. lich. vol. 2 tab. 36 f. 1.

Hoffm. Pl. lich. tab. 14 f. 4.

Web. Spic. tab. 6 f. 1-3.

Engl. Bot. tab. 720.

Fl. Dan. tab. 1126 f. 2.

Jacq. col. tab. 13 f. 5, t. 42 f. 3.

Jacq. Miscell. tab. 9 f. 6.

Lich. Suec. n. 929.

Ehrh. Crypt n. 10.

Moug. et Nestl. n. 646.

Flora Norv. T. 2 f. 42, 43, 44.

Hall. Hist. Tab. 47 f. 4.

Hall. Enum. Tab. 2 f. 4.

Dill. Hist. Musc. Tab. 17 f. 37.

Habit. In siccioribus rupibus alpinae et subalpinae regionis Europae.

Statio. Madonie ubique ad calcaria saxa arida et sicca ex Gussone: Collesano 1397 p. p. Cozzo di Mofera 5516 p. p. Piede del Cozzo di Mofera 4441 p. p. Monte S. Calogero 2507 p. p.

2. C. ACULEATA.

Fries Sched. Crit. 9 pag. 32. Lich. Europ. pag. 35 n.

23. var. *multicella* Garovaglio per litteras.

Thallus caespitosus intricatus fruticulosus rigidus, glaber, fusco-castaneus, basi fuscus, axillis tereti-compressus, angulosus, ramosissimus, ramis, ramulisque divaricatis, irregulariter dispositis attenuatis; fibrillis dentato-spinulosis sparsus, spinulis obtusis, fuscis, uncialis aut sesquincialis longus. Hypothallus albus fibrillosus. Apothecia rara terminalia peltata, concava, denticulata, emarginata, disco spadiceo, aut badio, denique fuso, lacvi.

Majo Junio.

Cornicularia aculeata Ach. Prodr. pag. 214 n. 331. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 529. Duby Bot. gall. var. B spadicea 8 pag. 617.

Cornicularia aculeata, *spadicea*, *muricata* Ach. meth. tab. 6 f. 2.

Cornicularia muricata Ach. Prodr. pag. 214 n. 332.

Coralloides aculeatum Hoffm. Descr. et Adumbr. lich.
tab. 5 f. 2 vol. 1 pag. 26.

Coralloides fruticuli specie fuscum, spinosum Dill. Hist.
Musc. 112 tab. 17 f. 31.

Cladonia aculeata Fl. Berol. 1008.

Lobaria aculeata Hoffm. Fl. Germ.

Lichen aculeatus Weber Fl. Gott. 207. Schreb. Spicil.
1119. Leyss. hal. 1166. Chlor. lugd. 35. Bellardi. Gm. Syst.
Linn. Swartz Act. Ups. v. iv.

Lichen hispidus Lightf. Fl. Scot. 883. Gm. Syst. Linn.
Engl. Bot. tab. 452.

Lichen spadiceus Roth. in Bot. Mag. 2 tab. 1 f. 1. Gm.
Syst. Linn.

Lichen castaneus Leers. Herb.

Lichen muricatus Ach. Prodr. pag. 214 n. 332.

Lichen frusicosus durus castaneus, sarcalis spinosis Hall.
Hist. 1963. Leers. Herb. 992.

Lichen terrestris, angustior, ramosissimus, fuscus Vaill.
Bot. Paris. 215 n. 7.

*Lichen terrestris, fuscus, hirsutie asperatus, receptaculis
florum atro-rufis, coronatis* Mich. N. Pl. Gen. pag. 78 tab.
39 f. 7 optima.

*Lichenoides non tubulosum, ramosissimum, fruticuli specie
rufo-nigrescens* Dill. Cat. Giss. 202. Hist. Musc. tab. 17
f. 31, bona apotheciis destituta. Rai Synops. ed 3. 66 n. 10.

*Muscus terrestris, coralloides, erectus cornibus rufescen-
tibus*, C. B. Prodr. in Cup. Pamph. Sic. vol. 2 tab. 92 edit.
Bibl. R. Univers. Catanae.

Muscus montanus fusca ramosissimus, non tubulosus
Vaill. Fl. Paris. tab. 26 f. 8.

Icon. Hoffm. Descr. et Ad. lich. tab. 5 f. 2 bona.

Engl. Bot. tab. 452.

Lich. Spec. n. 161.

Fl. Germ. n. 116—118.

Moug. et Nestl. n. 168, 766.

Bot. Mag. vol. 2 tab. 1 f. 1.

Ach. Meth. tab. 6 f. 2.

Vaill. Fl. Par. tab. 26 f. 8.

Cup. Pamph. Sic. vol. 2 tab. 92 ed. cit.

Dill. Hist. Tab. 17 f. 31.

Mich. N. Pl. Gen. Tab. 39 f. 7.

Moris. Tab. 7 f. 11 mala.

Habit. Ad loca arida, sicca, calcarea, et granitica in montanis Europae; ad uliginosa in planiciebus.

Statio. Bronte 2549 p. p. ex Gussone. Monte Scuderi 2994 p. p. Dinnamare 2920 p. p. Monte Venerata 2745 p. p. Mola 1487 p. p. Caronje Mistretta 2828 p. p. Monte S. Diano 3639 p. p. Strada crocante M. Castelli tra Mistretta e Nicosia 3639 p. p. ex Gussone.

3. C. *SÆPINCOLA*.

Ach. Lich. Univers. pag. 597. Fries lich. Europ. pag. 59 n. 28.

Thallus membranaceus foliaceus ascendens caespitosus: laciniatus; lacinias concaviusculis, sterilibus subdepressis, fructiferis brevibus, suberectis, nudis aut pulverulentibus, linearibus, ex uno centro divaricato-stellatis; viridis aut olivaceofuscus, hypothallus pallidior. Apothecia lobis antice adnata, terminalia, adulta peltata. Discus strato albo impositus, colore saturatior, aut flavo cinereus, levis; saepe emarginatus, aut margine thallose concolor; planus aut concaviusculus, irregularis.

Majo.

Platismæ sæpincola, Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. vol. 1 pag. 71. Tab. 14 f. 1.

Lobaria sæpincola Hoffm. Fl. Germ.

Peltigera chlorophylla Wild.

Lichen sæpincola Ehrhr. Beitr. 2, 95. Hoffm. En. lich. 102 tab 14 f. 1. Hedwig. Stirp. crypt. vol. 2 tab. 2 f. 4—10.

Lichen scutatus Wulf. in Jacq. Collect. iv tab. 15 f. 1.

Icon. Hoffm. Descr. et Adum. tab. 14 f. 1. mediocre.

Hoffm. Enum. lich. tab. 14 f. 1.

Jacq. coll. iv tab. 18 f. 1.

Hedwig. Stirp. Crypt. tab. 2 f. 4—10.

Lich. Suec. n. 170.

Ehrh. Phytoph. n. 90.

Schrad. Crypt. n. 122.

Flock n. 48.

Habit. Ad saepes, truncos, et ramulos montosae regionis
Europae.

Statio. Insula Filicuri super antiqua vulcanica saxa ex
Gussone.

XI. ROCCELLA

Endlicher ord. XI Hymenothalami Trib. IV Usneaceae
gen. 176. *Fries lich. Europ. Ordo 1 Gymnocarpi Trib. 1.*
Parmeliaceae gen. IV Roccella. Lud. Emen. Schaeerer Lichen
Europaeo. Genera ex utraque meth. art. et nat. Meth.
Artific. Classis 1 Lich. Discoidei ordo 2 Scutelliferi gen. 8.
Roccella. Meth. Natur. Clas. 1 Lich. discoid. ordo 2 Cor-
nicularii gen. 3 Roccella.

Thallus cartilagineo-coriaceus tereti-compressus, aequabilis
erectus dein pendulus, ramosus, seu lineari-laciniatus, longus,
strato corticali seu crusta caesia conspersus; hypothallus fila-
mentosus. Apothecia primum orbiculata, dein scutelliformia
thallode innata et marginata, saepe lateralia. Discus alerrimus
strato thallodeo primum velatus, dein denudatus, pruinosa
calcarea aspersus.

Roccella DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 334. Duby Bot.
Gall. gen. x pag. 614. Ach. lich. Univers. 81 tab. 7 f. 8, 9.
Fries lich. Europ. gen. 4 pag. 33.

Setaria species Ach. Prodr. lich. pag. 206.

Parmelia species Ach. Meth. lich. gen. 16.

Thamnium spec. Vent. Tabl. du regn. veget. gen. 9.

Lichen species Linu. et Auctor.

1. R. TINTORIA.

Ach. lich. univ. pag. 139. Fries lich. Europ. pag. 33
n. 19.

Thallus coespitosus coesus, aut albo-cinereus, levis,
in sicco albidus, aut cinereo-glaucus, coriaceus teres, filiformis,

undique similaris intus filamentosus apice subulatus, a pollice ad palmum longus, pendulus, aut erectus parce ramosus, ramis aliquando dichotomis, punctis fuscis, aut foveolis quandoque sparsus. Apothecia sparsa subinnata, saepe numerosa; margine evanescente. Discus convexus, nigricans, pruina albo-calcarea in sicolis speciminiibus semper obductus.

Majo.

Parmelia tinctoria Ach. meth. lich. 374.

Selaria roccella Ach. Prodr. lich. 224.

Coralloides roccella Hoffm. lich. usu pag. 55.

Coralloides corniculatum fasciculare tinctorium fuci teretes facie Dill. Hist. Musc. 120 tab. 17 f. 39.

Lichen roccella Linn. sp. pl. 1622. Ach. Prodr. pag. 224. Sowerby Engl. Bot. tab. 224. Ucria Cat. Hor. Regii Panorm. pag. 444. Dicks. Allioni. Gm. linn. syst.

Lichen graecus polypodes, tinctorius saxatilis, coralloides Mich. N. Pl. Gen. pag. 77, 14.

Muscus ceranoides palmensis, comis digitatis Orchili dictus. Pet. Gazoph. tab. 7 f. 12.

Muscus ceranoides albus fungosus apicibus nigris Pluk. Alm. 255 tab. 205 f. 6.

Muscus saxatilis incanus? Bocc. Mus. Par. 2, 133 tab. 92?

Fucus marinus, Roccella tinctorum C. Baun. Pin. 365.

Fucus capillaceus tinctorius I. B. *Polypodes tinctorius, sive lichen graecus.* *Fucus* B. dagli italiani Oricella Cup. Pamphyl. Sic. tab. 598; edit. quae in Bibl. Benedictino-Casinensis Catanae adseratur; in illa vero Bibl. R. Universitatis ejusdem civitatis tab. 252 vol. 2.

Nom. Sicum. Erva tramuntana o ruccella Ucria l. c.

Icon. Engl. Bot. tab. 244.

Pet. Gazoph. tab. 6 f. 12.

Pluk. tab. 205 fig. 6.

Dill. Hist. tab. 17 f. 39.

Bocc. Mus. p. 2 tab. 29?

Cup. Pamph. Sic. Tab. 598 et 252 uti notat.

Habit. Europa et Africa ad loca mari proxima et arida, plana ac submontosa.

Statio. Insula Pantellaria ex Gussone, ad scapulos usque ad 2480 p. p.

2. *R. fuciformis.*

Ach. Lich. Univers. pag. 440. Fries Lich. Europ. 20 pag.
33. DC. et LK. El. Fr. 2 pag. 334.

Thallus cartilagineus coriaceus, tereti-compresso, linearis aut latiusculus, dichotomus, aut apice trichotomus, acuminatus laciniatus glaucus, erectiusculus, flavescentia, aut albidus caespitulosus, levis, pumilus, aut elongatus ab uno ad duos pollices longus; hypothallus filamentosus. Apothecia sparsa aliquando conferta, marginalia sessilia. Discus planiusculus caesius, pruinosa; pruina in siculis specimenibus costata-calcanea, marge subpersistens.

Majus Junio.

Parmelia fuciformis Ach. Meth. Nolt. ex Fries l. c.

Phycia fuciformis Ach. Prod. pag. 182.

Lichen fuciformis Linn. Dicks. Ach. Prod. pag. 482.

Ach. Soc. Suec. 1797. Cmr. Syst. Mon. Engl. Bot. tab. 728.

Lichenoides fuciforme tinctorium corniculis longioribus et acutioribus Dill. Hist. Muscov. pag. 168 tab. 22 fig. 61. A, B, var. elongata tab. 23 f. 61 C. D. var. pumila.

Fucus verrucosus Roccella tinctorum Imp. B. 27 C. 11 363 n. 3.

Fucus verrucosus, *Roccella tinctorum* Imp. B. 27 C. 11 ic. 6, 3 d.

Nom. Sic. Erva tramplana o Ruccella.

Habit. Europa et Africa ad loca arida, saepe calcarea, et mari proxima, praecedentib. frequentior.

Statio. Ad arida calcarea saxa Sicilie subalpinæ regionis, et mari non multum dissipata. Palermo Monte Pollegrino 1834 p. p. Sagana sopra Partinico ad saltareæ saxa ex Gussone; ad eadem saxa Siracusa ex Gussone, ac insulis Favignana 1172 p. p. Pantellaria chiesa della Sibba 965 p. p. Lampedusa.

Observatio. Haec Species a praecedentib. habitu polius quam notis potest distinguui. Ambo tamen opere tinctoriæ sunt valde utiles, et aquidam roccellicum abunde exhibent.

XII. RAMALINA

*Endlicher Or. XI Hymenothalami Trib. IV Usneaceae
gen. 177. Fries lich. Europ. Or. I Gymnocarpi Trib. 1.
Parmeliaceae gen. 3 Schaeerer Lud. Eman. Meth. Artif. Clas.
1 Discoidei Or. 2 Scutelliferi gen. 6. Meth. Nat. Cl. 1 Or. 2
Cornicularii gen. 4.*

Thallus cartilagineus foliaceus primitus erectus undique similaris et concolor, extensus aut linearis, lobatus aut laciniatus, lacunosus, aetate pendulus, et filamentosus. Apothecia orbiculata, scutellata, subpedicellata, thallode marginata; utrinque per thallodem sparsa; disco thallode subconcolori aut carneo-pallido.

Ramalina Ach. Syn. lich. pag. 243. Lich. Univ. 122 tab. 13 f. 5—11. Smith Bot. Angl. tab. 1781. Humb. Kunt et Bompf. Fl. aquinoctialis vol. 1 pag. 34. Duby Bot. gall. gen. ix pag. 613. Fries S. O. V.

Evernia Eschweil ex Fries lich. Europ.

Lobaria Species Hoffm. Fl. Germ.

Physcia Species LK. et DC. Syn. Fl. Gall. gen. 98 pag. 85. Ach. Prodr. pag. 175.

Platiphyllum Species Vent. tabl. du reg. veg. gen. 5.

Platism Hoffm. Desc. et Ad. lich. vol. 1 pag. 53.

Lichen Species Linn. et auctorum.

Lichenoides Species Dillen.

1. R. CALICARIS.

Westring. Farglafv. tab. 42. Fries lich. Europ. 15 pag. 30 var. *a Fraxinea*. Garovaglio Lich. It. Dec. 17 n. 10.

Thallus cartilagineus subfoliaceus errectus basi conserlus, spitameus, palmaris et ultra longus: uncias duas usque ad pollicem latus, utrinque cinereo-viridis, aut glaucus, raro simplex, et semper irregulariter partitus, laciniatus, lacunosus, margine inaequalis, dentatus, ciliatus, tuberculosus. Apothecia terminalia, aut ex ultraque parte emergentia; scutellata, primo concava, dein plana, thallode marginata, margine quandoque inaequali; subpedicellata. Discus pallidus, seu flavescentia, glaberrimus.

Januario, Februario, Martio.

Ramalina stictiformis Scheich. Cat.

Parmelia fraxinea Ach. Meth. lich. 261.

Physcia fraxinea Ach. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 398.

Synops. Fl. Gl. gall. 1075 pag. 85. Micheaux Fl. Americ.

Bor. pag. 2676. Leman Dict. sc. nat. T. 40 pag. 137 n. 4.

Ach. Prodr. pag. 175.

Platismia fraxinea Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. vol. 1
pag. 85 tab. 11 f. 1, 2 mediocris.

Lobaria fraxinea Hoffm. Fl. Germ.

Lichen fraxineus Linn. Syst. veget. 960. Sp. pl. 164.

Fl. Suec. 1091. Guun. Norv. 577. Schreb. Spicil. 862. Gm.

syst. linn. 193 pag. 1370. Engl. Bot. tab. 1181. Fl. Dan.

1187. Weis crypt. 22. Leers herb. 964. Encycl. Meth. T. 3

p. 2 pag. 471 n. 82. Neck. Meth. 105. Scop. Carn. 2, 1383.

Retz Prodrom. 1353. Huds. Anglic. 2, 541. Lightf. Scot.

835. Hagen lich. 96. Leys nat. 2, 4150. Wild. Prodr. 1022.

Ach. Act. Soc. Suec. 1797. Prodr. 287 pag. 175.

Lichen calicaris Ueria Cat. Hor. R. Panorm. pag. 440
non Linn.

Lichen pulmonarius cinereus mollior in amplas lacinias
divisus Tournefort Inst. R. Herb. 549 tab. 335 a, b, bona.

Lichen pulmonarius rufescens, durior, in amplas lacinias
divisus Mich. N. Pl. Gen. 74 tab. 36 f. 1 mediocris.

Lichen utrinque lacunatus, fronde latissima, scutellis cre-
berrimis Hall. hist. 1985.

Lichenoides arboreum ramosum scutellatum majus et ri-
gidius, colore virescente Raj Synops. 3 pag. 75 n. 79.

Lichenoides longifolium, rugosum rigidum Dill. Hist.
Musc. 165 tab. 22 fig. 9 bona.

Muscofungus querinus latifolius cinereus Moris Hist. 635
§ 15 tab. 7 f. 14, 3, 4 mediocris.

Muscus arboreus seu cartilagineus incanus platyceros pi-
neisculotrix Cup. Pamph. Sic. Tab. 515 in editione quae
asserv. Catinae in Bibl. Benedictina; tab. 178 vol. 2 in edi-
tione Bibl. R. Universitatis Catinae.

Icon. Dict. Sc. Nat. Tab. 55 f. 2 bona.

Engl. Bot. f. 1439.
 Fl. Dan. tab. 1487.
 Hoffm. Descr. et Adumbr lich. tab. 17 f. 1, 2.
 Lich. Suec. n. 71.
 Erhr. Crypt. n. 88.
 Moug. et Nestl. n. 188.
 Moris Hist. tab. 7 f. 14, 3, 4.
 Tournefort Inst. R. H. tab. 325 a, b.
 Mich. N. Gen. tab. 36 f. 1.
 Dill. Hist. Musc. tab. 22 f. 59.
 Cup. Pamph. Sic. Tab. 515, et tab. 178 vol. 2 uti
 notavimus.

Nom. Sic. Varvazzi ramusi Ucria: Muscu o lippu di cerza ab aetnicolis.

Var. b Fastigiata.
Fries lich. Europ. 15 pag. 30. Ramalina fastigiata Ach.
ex Fries l. c.

Thallus caespitosus subcartilagineus, laciniatus, laciniis brevibus, compressis, aut teretiusculis, aut inflato-cavis, sursum incrassatis, lacunosus, cinereo-pallidus. Apothecia uti in praecedenti aut parum minorata.

Januario, Februario, Martio.
Physcia fastigiata Ach. Prodr. pag. 176. DC. et LK.
Fl. Fr. 2.

Lobaria populina Hoffm. Deut. Fl.
Lichen fastigiatus Ach. Prodr. 288 pag. 115. Persoon
Ust. Ann. St. 7. Schrad. spicil. Ach. Acta Sc. Suec. 1797.
Vet. Acta Handl. 1799 tab. 9 f. 1 A—F.

Lichen rostratus mas Scop. Carn.
Lichen populinus Ehrh. Cr. exs.
Lichen calicaris var. B. Weiss.
Lichen cinereus, latifolius, ramosus Tour. Inst. R. H. 550
Vaill. Bot. Paris. tab. 20 f. 6 mediocris.
Lichenoides cornutum bronchiale inolle subtus incanum
Dill. Hist. Musc. pag. 160 tab. 24 f. 55 B. bona.
Muscus arboreus cartilagineus incanus platyceros pine-
isculotrix: *ibidem* Stenoceros Cup. Pamph. Sic. tab. 515 in

edit. Bibl. Benedict. vol. 2 tab. 178 in edit. Bibl. R. Univ. Catanae.

Nom. *Siculum Muscu o lippa di cerza ab aetnicolis.*

Icon. Lich. Suec. n. 263.

Ehrh. Crypt. n. 276.

Ach. Vet. Ac. Handl. 1799 tab. 9 f. 1 A—P.

Ach. Nov. Act. Ac. Scient. Suec. V. 18 tab. 9 f. 1 A—K.

Vaill. Paris. Tab. 29 f. 6.

Dill. Hist. Musc. Tab. 24 f. 55 B. Tab. 23 f. 62.

Cup. Pamph. Sic. tab. 545 et vol. 2 tab. 178 uti notavimus.

Var. c Canaliculata.

Fries lich. Europ. 15 pag. 30.

Thallus erectus brevis laciniatus, ramoso-pinnatifidus lacinis angustioribus; cinereo-viridis, denticulatus, aut erosus; lacinia fructifera canaliculata. Apothecia parva scutellata aut planiuscula, ex apicibus reflexis appendiculatis. Discus thallode subconcolor.

Januario, Februario, Martio.

Lobaria calycaris Hoffm. Fl. Germ.

Physcia calicaris Ach. Prodr. pag. 176.

Lichen calicaris Linn. et auct. Ach. Act. Sc. Suec. 1797 f. 4. G—K.

Lichen scopulorum Retz. Pr. 2. Westr. Ach. Act. Sc. Suec. 1794. Dicks. Gmel. Syst. Linn.

Lichenoides coralliforme rostratum et canaliculatum Dill. Hist. pag. 170 tab. 23 fig. 62 A, B.

Muscus alter quernus latifolius coraloides αφυλλος Col. Ecphr. P. 1 C. 139 pag. 354, 335 tab. 337.

Nom. *Siculum Lippu di cerza ab aetnicolis.*

Icon. Lichen. Suec. n. 72.

Ach. Sc. Suec. 1797 f. 4 G. K.

Dill. Hist. Musc. tab. 23 f. 62 A, B.

Column. Ecphr. tab. 337.

Moris Hist. 3 Sect. 45 tab. 7 f. 5.

Var. d Thrausta.

Fries lich. Europ. 15 pag. 30.

Thallus laciniatus, laciniis filiformibus angustissimis teretiusculis, viridibus, aut viridi-cinereis. Apothecia sparsa parva, subpedicellata; disco thalode subconcolore.

Januario Februario Martio.

Alecloria Thrausta Ach.

Nom. Sic. Lippu di cerza ab aetnocolis.

Icon. Lic. Succ. 267.

Habit. Per Americam et omnem Europam vulgatissima ad truncos arborum, et ligna alpinæ et subalpinae regionis.

Statio In Sicilia et insulis adjacentibus species et varietates ubique; atque in uno eodemque caespite omnes saepe collegi; frequentissime occurunt ad cortices *Quercus Fagi Ulmi Castaneae Pini Ilicis Betulae Populi* magis ad elata quam plana loca. Etnae: Nicolosi sopra i Benedettini 2298 p. p. Trecastagni 1680 p. p. Limite inferiore del *Pinus* verso Nicolosi 4734 p. p. Limite degli alberi alle Concaze 4586 p. p. La parte più alta della regione nemorosa 5892 p. p. Valle del Trifoglietto 4764 p. p. Giannicola 5292 p. p. Maletto ex Gussone 3285 p. p. Castelbuono 1260 p. p. ex Minà-Palumbo, Castagno di cento cavalli 2146 p. p. Petralia soprana 3619 p. p. Geraci 3634 p. p. Monte S. Diano 3639 p. p. Caronie ex Gussone: Polizzi 2627 p. p. Monte Samperi 3355 p. p. Pizzo di Palermo 5636 p. p. Collesano 1397 p. p. ubique in Montibus Hereis (Madonie) ex Gussone. var. b Ins. Ustica monte di Cavallieri 576 p. p. Torre di S. Maria 318 p. p. et Ins. Filicuri 2497 p. p. ex Gussone. var. c Ins. Filicuri ex Gussone et Ins. Lampedusa. Mandanici presso Messina ex Prestandrea. var. d Ins. Lampedusa ex Gussone, Ficuzza presso Palermo. Maletto sull' Etna. Monte Scuderi presso Messina 2994 p. p. ex Gussone, Sirrizzo ex Prestandrea.

Observ. Ad urinam ciendam et calcula vexicalia expellenda perutilis species et varietates ab aetnocolis habentur.

XIII. EVERNIA

Endlicher ord. XI. *Hymenothalami* Trib. IV *Usneaceae*
gen. 178. *Fries* lich. Europ. Or. 1 *Gymnocarpi* Trib. 1.
Parm. gen. 2.

Thallus teres, aut leviter compressus, fruticulosus, undique similaris, nudus, ramosus, sarmentaceo-pendulus, hypothallus albus stuppeus, centro vacuus. Apothecia scutelliformia, thallode marginata, margine demum evanescente, orbiculata. Discus primitus connivens, dein apertus, strato medullari impositus.

Evernia Ach. lich. Univ. 84 tab. 10 f. 1, 2. Delise
ined. ex Duby Bot. Gall. pag. 614.

Borrera spec. Ach. lich. Univ. tab. 9 f. 4, 7, 9.

Physcia spec. DC. et LK. Fl. Fr. 2, 395. Lud. Em.
Schaerer lich. Europ. meth. Art. gen. 9: et meth. Nat. gen.
10. Ach. Prodr.

Neuropogon Neès et Flott. Linnea ix pag. 496.

Bryopogon Link. Handb. iii pag. 164.

Alectoria spec. Ach. lich. Univ. ex Fries et Endlicher.

Lobaria spec. Hoffm. Ach. Prodr.

Usnea spec. Hoffm. Dill.

Cornicularia spec. Ach. DC. et LK.

Selaria spec. Ach. Prodr. Tr. 27.

Dufourea spec. Ach.

Lichen spec. Linn. et auct.

Lichenoides Dill. et Ach. Prodr.

1. E. JUBATA.

Fries Sched. Crit. 9 pag. 33. Fries lich. Europ. var. c
implexa et var. d selacea pag. 20 - 21 n. 2. Garovaglio L.
It. D. 18 n. 1.

Thallus teres mollis in sicco solidus primo erectus, dein pendulus; ab uno ad duos pedes longus et ultra, filamentosus, olivaco-fuscus, aut albo-cinereus glaberrimus, implexus, confertus, inaequaliter ramosus, contortus, apicibus setosis simplicibus et thallode concoloribus; thallus adultus subcompressus; hypothallus stuppeus albus, centro vacuus; ramorum

axillae compressae, sulcatae. Apothecia scutellata ianeta 200-
selia, lateralia nunc ad axillas, nunc ubique sparsa, integra;
orbiculata, thallode marginata. Discus primitus consimilis, strato
medullari floccoso impositus, dein convexus viridi-cinerous,
pruinosus; numquam viridi-fuscus.

Majo Junio.

Cornicularia jubata DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 332.
Duby Bot. gall. 3 pag. 616.

Setaria jubata Ach. Prodr. pag. 219.

Parmelia jubata Ach. Meth. lich. 272. Schrad. journ.
Bot. 1799, 1 tab. 3 f. 4.

Alectoria jabata Ach. ex Duby et Fries l. c. et v. setacea.
Lichen jubatus Lin. Fl. Suec. n. 1121. Westring. Fargl.
tab. 14. Encycl. Meth. T. 3 p. 2, 146 pag. 486. Web. Spicil.
pag. 229. Weis Crypt. pag. 101. Wallenb erg Fl. Suec.
1605 pag. 833. Engl. Bot. tab. 1880. Retz. Pr. 2. Hoffb.
Liljebl. Scop. Lightf. Grantz. Schreb. Spicil. Scholl. Hag.
Leers. Wild. Prodr. Leyss. Roth. tent. Gunn. Hunds. Allione.
Lumonitz. Gmel. Syst. linn.

Lichen setiformis Ehrb.

Lichen capillaceus longissimus seu muscus arboreus ni-
gricans, Usnea officinarum Mich. N. Pl. Gen. pag. 77 n. 7.
Lichen Hall. Helv. n. 1958.

Usnea jubata, implexa, ramulosa Hoffm. Deut. Fl.

Usnea jubata nigricans Dill. Hist. Musc. tab. 12 f. 7.

Usnea seu muscus capillaceus luridus crispus Cup.

Pamph. Sic. Tab. 614 in edit. Bened.

Icon. Schrad. Journ. Bot. 1799, vol. 4 t. 3 f. 4.

Werstr. Fargl. tab. 14.

Engl. Bot. tab. 1880.

Moug. et Nestl. n. 261.

Lich. Suec. 265.

Dill. Hist. tab. 12 f. 7 optima.

Cup. Pamph. tab. 607 in edit. c.

Habit. Per omnem Europam ad loca subalpina et alpina,
super cortices.

Statio. In Sicilia vulgaris ad montes super cortices Pini

Quercus Ulmi. Etna: Valle dal Bove 4087 p. p. Limite inferiore de' Pini 4734 p. p. Concaze 4586 p. p. Madonie: Caronie ubique.

Observ. Olim ad fluxum sanguinis cobibendum utebatur.

XIV. TENOREA

Nobis.

Thallus subfoliaceus lobatus, lobis inaequalibus, compres-
sis; hypothallus canaliculatus, vario-coloratus. Apothecia la-
teralia, scutelliformia, pedicellata. Discus connivens, strato
medullari super-impositus, coloratus.

Evernia species Endlicher or. xi hymenoth. trib. iv
Usneaceae gen. 178. Fries Lich. Europea or. i. Gymnocarpi
Trib. i Parm. gen. 2 sec. *** pag. 25. Garovaglio Lich. It.
Dec. 18 n. 3: Delise ex Duby Bot. Gall. 3 pag. 611.

Physcia species DC. et LK. Fl. Fr. 2. Duby Bot. Gall.
3. Ach. Prodr. pag. 173.

Borrera species Ach. Syn. Smith. Engl. Bot. Kunt et
Bompl: Fl. Aequinoct. T. i pag. 25.

Parmelia species Ach. Meth. lich.

Lobaria species Hoffm. Fl. Germ.

Lichen species Linn. et auctorum.

Lichenoides species Hoffm. Descr. et Ad. lich. vol. 1
pag. 45. Dillen. Hist. Musc.

Observ. Everniae nomen Lichene thallo tereti, similari,
ramoso, fruticuloso, sarmentaceo-pendulo; apotheciis sessilibus,
thallo marginatis servavi: Lichene vero thallo compresso,
foliaceo, hypothallo discolori; apotheciis pedicellatis, thallose
marginatis Tenoreae dedi, ob cl. neapolitanum botanistam Vin-
centium Tenore.

1. T. FURFURACEA.

Nobis.

Thallus subfoliaceus centro radiatus, lobatus, lobis elon-
gatis, ramosis laciniatis ac saepe dichotomis, confertus; nunc
adscendens, nunc prostratus crassiusculus, mollis, in sicco
rigidulus, intus stippeus, supra convexus; a spitama ad palmum

et ultra longus, duas tres lineas et amplius latus ; aliquando laciinis angustissimis, et nudis ; nunc glaucus, furfuraceus, seu farina cinereo-grisea aut cretacea sparsus, aut cinereo fusca ; nunc scabridus, punctis fuscis sphaericis elevatis sparsus, et forma fibrillosa crassiuscula ramaosa (soredia) ; marginibus revolutis ; hypothallus canaliculatus, reticulato-venosus, violaceo-fuscus, aut fuscus, extremitate thallodi concolora aut subalbida ; in medio ciliis brevibus crassiusculis hypothallo concoloribus sparsus, basi et apice semper nudus. Apothecia rara, magnitudine varia, duas tres lineas et ultra latas ; pedicella-ta, concava, thallode marginata, margine saepe crenato, cen-tro plicata. Discus rufescens, glaberrimus, aut rubeolus.

Januario, Februario, Martio.

Evernia furfuracea Fries lich. Europ. 10 pag. 26 var. *b* ericetorum. Mann. Lich. Bob. pag. 105. Garovaglio Lich. Ital. D. 18 n. 3. Delise ex Duby Bot. Gall. 3 pag. 611.

Physcia furfuracea Ach. Prodr. pag. 173. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 396. Duby Bot. Gall. 3 pag. 611.

Borrera furfuracea Ach. Syn. lich. pag. 222. Smith. Engl. Bot. tab. 984. Kunt et Bompl. Fl. Aequinoct. T. 4 pag. 25 n. 2 var. *a*.

Lobaria furfuracea Hoffm. Fl. Germ. 144.

Parmelia furfuracea Ach. Meth. lich. pag. 254. Targ. Tezz. Ist. Bot. T. 3 n. 1692.

Lichen absinthifolius LK. Fl. Fr. 2 pag. 4274.

Lichen furfuraceus Lin. syst. veget. 96. Sp. pl. 1642. Fl. Suec. 1088. Gort. Belg. 307. Gunn. Norv. 775. Weis gott. 65. Scop. 197, 28. Leers herb. 96. Pollich. pal. 1109. Malt. Syll. 860. enam. 1085. Retz. Scand. 1359. Huds angl. 2, 539. Lightf. Scot. 832. Weber Spic. 272. Hagen lich. 45, All. Fl. Ped. 2, 560. Chlor. lugd. 35. Leys. hal. 2, 147. Wild. Fl. Bor. 1031. Neck. meth. 107. Encycl. meth. T. 3 p. 2 pag. 469 n. 71.

Lichen cinereus cornudamae ferens Tournef. 549.

Lichen cornubus planiusculis acutis superne farinosis, in-ferne atris et reticulatus Hall. hist. 1976.

Lichen alpinus cornua cervi referens subtus atracinus, desuper cinereus, receptaculi florum amplioribus, intus fuscis
Mich. N. Pl. Gen. 76 or. 4 tab. 38 f. 1.

Lichenoides furfuraceus Hoffm. Descr. et Adumbr. lich.
vol. 1 pag. 45. De lich. usu pag. 42.

Lichenoides cornutum amarum superne cinereum, inferne
nigrum Dill. Hist. 157 tab. 21 f. 52.

Muscus terrestris intybaceus ceranoides crispus Cup.
Pamph. ed. R. Univ. vol. 1 tab. 181 non bona, et scutellis
destituta.

Muscus amarus absinthifolio J. B. 3 pag. 764.

Muscus arboreus Barr. icon. 1277 f. 3 bona ex senten-
tia Dill. et Hoffm. l. c.

Icon. Lic. Suec. n. 140.

Moug. et Nestl. n. 63.

Florke Deutesch. n. 173.

Buxb. Cent. 2 tab. 7 f. 1, 2.

Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. vol. 1 tab. 9 f. 2 me-
diocris.

Barr. icon. 1277 f. 3.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 38 f. 1 mediocris.

Cup. Pamph. Sic. vol. 1 tab. 181 ed. cit.

Dill. Hist. Tab. 21 f. 52.

Habit. America et Europa ad cortices, saxa, ligna, et
ericeta, alpine regionis et planae.

Statio. Messanae : Mandanici, Fosse di carnevale ex Pre-
standrea : Etnae Pineta 4734 p. p. 4087 p. p. Regione
nemorosa 1470 p. p. Trecastagni 1680 p. p. Lingua-Grossa
1619 p. p. Randazzo 2545 p. p. Maletto 3285 p. p. Castel-
buono 1260 p. p. Boschi delle Madonie, Caronie.

2. T. VILLOSA.

Nobis.

Thallus membranaceus caespitosus mollis, multifido-ramo-
sus, ramis inaequalibus, lacinialis linearibus di-tri-chotomis,
adscendentibus, erectis, dense villosus, villis brevissimis,
periferiam versus villis longioribus ; glaucus, margine revo-
luto : hypothallus canaliculatus, albus scabridus. Apothecia

pedicellata, erecta, scutelliformia, thallode marginata, margine revoluto, villoso-ciliato integro aut subcrenato. Discus primo coanivens, dein apertus, glaber, planus, in sicco crocus, in viridi fulvus, strato medullari albo impositus.

Julio.

Evernia villosa Fries lich. Europ. 12 pag. 27 var. *a, b.*

Borrera villosa Ach. Syn.

Borrera solenaria Ach. ib.

Borrera ephebea Ach. ib.

Parmelia villosa Ach. Syn.

Parmelia solenaria Ach. ib.

Parmelia ephebea Ach. Syn.

Lichenoides corniculatum album subspinosum, scutellis flavescentibus Dill. Hist. Musc. pag. 159 tab. 21 f. 53 mediocris.

Lichen maritimus albus subhirsutus, cornua-Damae referens, receptaculis florum interna parte flavescentibus Mich. N. Pl. Gen. pag. 76 or. iv n. 2 Tab. 38 f. 2 optima.

Icon. Mich. N. Pl. Gen. lab. 38 f. 2.

Dill. Hist. Musc. tab. 21 f. 53.

Habit. Europa meridionali ac presertim in regione mediterranea ad ramos arborum.

Statio. Madonie ex Gussone: Pollina 2383 p. p. S. Mauro 3399 p. p. Geraci 3616. Monte S. Diano 3639 p. p. Maletto 3285 p. p. ex Gussone; ac insulis adjacentibus ex ipso cl. botanico: Lampedusa, Pantelleria monte S. Elmo 674 p. p. Cima dell' isola 2480 p. p. Ustica monte de' cavalleri 576 p. p. Marelimo 2230 p. p. Filicuri punta dell' alice 1256 p. p.

XV. USNEA

Endlicher Or. XI Hymenothalami Tr. IV Usneaceae gen. 179. Lud. Eman. Schaefer Lich. Europ. Meth. Artif. Cl. 1. Lich. Discoidei or. 1 Pelt. gen. 1. Meth. Nat. Cl. 1 Lich. Disc. or. 1 Usneacei gen. 1 Usnea. Fries Lich. Europ. Cl. 1 Gymnocarpi Trib. 1 Parmeliaceae gen. 1.

Thallus cauliformis filamentosus, primitus erectus, deinde

pendulus; filis teretibus, strato corticali crustaceo, facile annulatum rumpente obductis, strato medullari filamentoso instructis. Apothecia orbiculata, peltata, terminalia, raro sparsa; excipulo tallodeo suffulta, fibrillis thallodeis radiata. Discus apertus, strato medullari impositus, thallodi subconcolor, vel coloratus.

Usnea species Ach. Prodr. pag. 223 Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. vol. 2 tab. 30 f. 2. Ach. Lich. usiv. 127 tab. 14 f. 5. Syn. lich. 303. Meth. lich. gen. 24. DC. et LK. Fl. Fr. 2 gen. 73. Hook misc. tab. 11, 12. Fries S. O. V. pag. 234. Eschweill. Wallr. spec. Dill. Hist. Musc.

Ramalina species Ach. Lich. Univ. et Synops. lich.

Reichenbachia species Spreng. ex Fee Cryptog. 136.

Lichen species Linn. et auctor.

1. U. FLORIDA.

Ach. Prodr. lich. pag. 224. Meth. pag. 307. Hoffm. Fl. Germ. Descript. et Adumbr. lich. vol. 2 pag. 19 tab. 3 f. 1, 2. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 332. Ach. lich. usu pag. 51.

Thallus suffruticulosus, teres, irregulariter ramosissimus, primo elatior, dein pendulus; glaucus, aut laete-viridis, aut viridi-cinereus, scabridus, annulatum ruptus: rami divaricati ac splices fibrillosi, fibrillis filiformibus et divisis. Apothecia magna, subimmarginata, fibrillis thallodeis radiata. Discus fuscus, dein fusco-pallidus, glaber, concavus.

Januario, Februario, Martio.

Usnea coraloides Wallr. Flechtenk. 2.

Usnea barbata var. *a florida* Fries lich. Europ. 1 pag. 18. Sched. Crit. 9 pag. 34.

Usnea vulgatissima tenuior et brevior, cum orbiculis Dill. Hist. Musc. pag. 69 tab. 13 f. 13.

Lichen Floridus Linn. Syst. veg. 965. Syst. pl. 561. Fl. Suec. 1130. Hort. Cliffort. 477. Gort. Belg. 314. Gunn. Nerv. 739. Leers Herb. 1000. Pollich. Palat. 1134. Weis crypt. 102. Scop. Carn. 1359. Neck. Meth. 69. Huds. Angl. 2. 560. Reitz Scand. 1415. Chlor. lugd. 37. All. Fl. Ped. 2597. Lighf. Scot. 897. Wild. Fl. Berol. 1035. Roth. Germ.

514. Schratck Fl. bal. 1559. Baumg. lips. 592. Encyclop: Meth. T. 3 p. 2 pag. 487 n. 154. Engl. Bot. tab. 872: Fl. Dan. tab. 1189.

Lichen plicatus Ucria non Linn. Cat. H.R. Pan. pag. 442:
Lichen comosus Ach. in Vet. Ac. Handl. 1795 tab. 8

f. 4 incompleta:

Lichen cinchonae Wild. Bot. Mag. Gmel. Syst. Linn:

Lichen cinereus vulgaris, capillaceo folio mindt Tönnestorf 550.

Lichen Hall. helv. n. 4972.

Mustus arboreus cum orbiculis C. B. P. 361:

Muscus quernus fruticosus trichaphyllos Colum. Ecphpt:

1. pag. 333 tab. 334.

Muscus rafnosus floridus Taber. Icon. 809.

Musco-fungus arboreus capillaceus, scutellis amplis per ambitum radiatis Moris. Hist. 3 pag. 635 Sec. 15 tab. 7 f. 14.

Nom. Sic. Muscu arboriu Ucria l. c.

Icon. Lich. Stuc. n. 120.

Moug. et Nestl. n. 260.

Flörke n. 178.

Ach. Ac. Handl. 1795 tab. 8 f. 4.

Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. tab. 30 f. 2 bona, fig. 1
eadem incompleta.

Wild. Bot. Mag. tab. 2 f. 3.

Dill. Hist. Musc. tab. 13 f. 13.

Moris. Hist. tab. 7 f. 14.

Mich. Nova Pl. Gen. tab. 39 f. 5 bona.

Taber. Icon. 808.

Colum. Ecphr. 4 tab. 331.

Habit. Vulgalissime occurrit per omnem Europam, ad ligna ad arbores, ac raro, et degenerans, ad saxa.

Stat. Ad pineta, arbores frondosas Sicilie et nemora saepissime occurrit. Etnae alla Pinita 4734 p. p. Valle del Bove 4087 p. p. Concazzze 4586 p. p. Regione nemorosa 5892 p. p. Palermo alla Ficuzza ex Gussone.

2. U. BARBATA.

Ach. Prodr. lich. pag. 223. Meth. Hch. pag. 313. Lich.

*

Univers. pag. 624. Synops. lich. 306. Wahlenberg Upsal. n. 908. Suec. 845. Lapp. 824. Fries lich. Europ. 1 pag. 18 var. *d dasypuga*. Garovaglio lich. Ital. D. 19 n. 1. Hoffm. Fl. Germ. Duby Bot. gallic. 2 pag. 613 var. *articulata*.

Thallus fruticulosus pendulus ramosissimus, intricatus, elongatus, raro dichotomus; subsimplicibus filamentis, fibris lateralibus patentibus; pallide virescens, in sicco cinereo-viridis, superne pruinosis et crassior, subarticulatus; apice capillaceus, et filamentosus, ac totus annullatim ruptus. Hypothallus crustaceus albus, filo centrali dixtincto. Apothecia rarissima, minuta, sparsa, integra. fibrillis raro radiata. Discus subcarneus, demum convexus et fusco-nigricans.

Januario, Februario, Martio.

Usnea articulata Hoffm. Fl. Germ. Ach. Prodr. pag. 226. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 334.

Usnea barbata loris tenuibus fibrosis Dill. Hist. Musc. pag. 63 tab. 12 f. 6 optima.

Usnea capillacea et nodosa Dill. Hist. Musc. 60 tab. 11 f. 4 apotheciis destituta.

Parmelia articulata Spreng. syst. Linn. pag. 277.

Lichen barbatus Linn. Fl. Suec. n. 985. 11 n. 1123. Ach. Prodr. 342 pag. 223. Ucria Cat. R. Hor. Pan. pag. 442. Westr. Ac. Soc. Suec. 1798. Retz. Pt. 2. Hoffb. Liljebl. Lightf. Scherb. spicil. Weis. Hag. Gunn. Mull. Leer. Roth. tent. Leyss. Reich. Fl. Allioni. Scholl. Gmel. Syst. Linn. Sowerby Engl. Bot. tab. 258 f. 2.

Lichen articulatus Ach. Prodr. pag. 226. Huds. Scop. Pollich. Neck. Doerr. Roth. Wither. Sibth. Gmel. syst. linn.

Lichen nodosus, cinereus, longissimus receptaculis flororum rufescens Mich. N. Pl. Gen. pag. 76 tab. 39 fig. 1 optima.

Muscus arboreus, et petraeus, geniculatus, fibrissimus Cup. Pamph. Sic. vol. 1 tab. 318 ed. R. Univer. Catanae, imperfecta.

Nom. Sic. Muscu arboriu comu filu Ucr. l. c.

Icon. Lichen Suec. n. 119.

Sowerby Engl. Bot. tab. 258 f. 1, 2.

Dill. Hist. tab. 11 f. 4 tab. 12 f. 6.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 39 f. 1.

Moris. Hist. tab. 7 f. 11.

Cup. Pamph. Sic. vol. 1 tab. 318 ed. R. Univ. Catanae.

Habit. America et Europa ad nemora, super cortices vetustos arborum diversarum; in alpina aut subalpina regione.

Stat. In Sicilia parum frequens: Madonie ad nemora ex Gussone. Collesano monte 6000 p. p. Collesano al convento 1397 p. p. Polizzi 2627 p. p. Monte Granza 3427 p. p.

3. U. PLICATA.

Ach. Prodr. lich. pag. 225. Fl. Dan. tab. 1357. Hoffm. Fl. Germ.

Thallus teres, aut subcompressus, elongatus, pendulus, subdichotomus, implexus, laevigatus, pallescens, aut rubeolopallidus, quandoque albidus, in sicco rubeolus; apice praesertim fibrillosus, fibrillis, dixtinctis. Apothecia rara, subterminalia, fibrillis radiata, magnitudine varia. Discus fuscus aut albo-virescens, planus.

Martio, Aprili., Majo.

Usnea gracilis, filaris Ach. Syn. lich.

Usnea barbata var. c plicata. Fries lich. europ. 1 pag. 18.

Usnea vulgaris, loris longis implexis Dill. Hist. Musc. pag. 56 tab. 11 f. 1 optima.

Lichen barbatus var. c plicatus Liljebl. Suec. Fl.

Lichen plicatus Linn. Retz. prodr. 2. Westr. Act. Sc. Sv. 1798. Farghist. tab. 8. Hoffb. Scop. Gronov. Huds. Lightf. Neck. Web. Hag. Crantz. Gunn. Mattusch. Allioni. Reyg. Leyss. Murray Prodr. Wild. prodr. Roth. tent. Gmel. syst. Linn. Sowerby Engl. Bot. tab. 257 mala.

Muscus arborum Taber. Icon. pag. 810. Hist. lib. 2 pag. 1195 f. 13.

Icon. Lichen Suec. n. 270.

Fl. Dan. tab. 1357.

Sowerby Engl. Bot. tab. 257.

Westr. Farghist. tab. 5.

Dill. Hist. Musc. tab. 11 f. 1.

Taber. Hist. Lib. 2 pag. 1195 f. 13.

Habit. Ad silvas densas, tam irriguas quam siccas Europae.

Stat. Super diversarum arborum cortices elatae regionis,
et ad silvas: Lampedusa 318 p. p. ex Guissohe.

Observ. Haec aliæque hujus generis species, inter me-
dicamenta adstringentia etant adsumerata.

XVI. CLADONIA

Endlic. *Or. XI Hymenothalami Trib. II Lecidinae gen.*
168. *Fries Lich. Europ. or. I Gymnocarpi tr. II Lecidinae*
gen. 12. Schaefer Lich. Europ. Gen. Meth. art. cl. II Lich.
capitati Or. 2 solidi gen. 23 Cladonia. Meth. nat. cl. 2
Lich. capitati or. XII cladoniacei gen. 24.

Thallus horizontalis, squamuoso-foliaceus, vel crustaceo-
granulosus; a quo surgit verticalis, (Podelium) caulescens,
fistulosus, cartilagineus, subulatus aut turbinato-scyphifernus,
aut podelium fruticosum ascyphiferum definite ramosum.
Apothecia discreta, podeliis innata, peculiariter excipulo pro-
minentia primitus scyphuliformia, marginata, dein inflata cephaloidea fungosa, immarginata. Discus primo aperitus, mox pro-
tuberans, reflexus, excipulum proprium abscondens.

Cladonia Hoffm. Fl. Germ. 103. Florke de Cladoniis
Com. I, II. Posthok 1327, 28. Ach. Prodr. Fr. 23 pag. 201.
Schrad. Krypt. Saml. Fries Syst. Or. Veg. Meyer. Spreng.
Syst. veg. Targ. Tozz. Ist. Bot. T. 34, 1706. Biasoletto op.
cit. pag. 93, 9, 5.

Cenomyce Ach. Synt. lich. pag. 649. Biasoletto op. cit.
gen. 6 pag. 93.

Scyphoforus, *Helapodium* et *Cladonia* species DC. et LK.
Fl. Fr. 2, 335, 337, 344.

Pyxidaria Boy. voy. 3.

Beomyces species Ach. Meth. gen. 23.

Capitularia Florke l. c. Martius.

Patellariae steliophorae Watt. Monogr.

Lichen species Linn. Ach. et auctorum.

Coralloides species Dill. Hist. Musc. gen. 5 pag. 75.

SECTIO I.

SCYPHIFERA

Thallus horizontalis microphyllinum; podetia normaliter simplicia, vel prolifero-ramosa, scypho terminata, diaphragmate clausa; cartilagineo corticalia, glabra vel furfuracea.

1. CL. PYXIDATA.

Hoffm. Fl. Germ. 121. Sched. crypt. 8 pag. 21. Fries lich. europ. 193 pag. 216. Spreng. Syst. veg. pag. 273. Targ. Tozz. Ist. Bot. T. 3 n. 1706.

Thallus horizontalis squamuloso-foliaceus, multilobatus; lobis plus minusque elongatis, sinuato-crenatis, confertis, erectis, vel convolutis, subtus canescentibus supra laete-viridibus; podetia cartilagineo-corticalia, primo glabra, mox verrucosa vel furfuracea, viridi-cinerescentia, scyphiformia simplicia, aut margine scyphi scyphifera, scyphis cyathiformibus, turbinatis marginibus dilatatis. Apothecia podaciata, podesco thallode conformi, primo plana dein fungosa, ocraceo-fusca. Discus planus marginatus, dein convexus marginem obtegens.

Dicembri, Januario, Februario.

Cladonia pyxidata, simplex, exilis, incana, prolifera, tuberculosa, marginalis Hoffm. Fl. Germ.

Cladonia neglecta, pyxidata var. *chlorophaea* etc. Flor. Clad. pag. 49, 70.

Patellaria fusca var. *pyxidata* Wallr. pr.

Scyphophorus pyxidatus Ach. Prodr. lich. pag. 186. DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 359. Leman Dict. Sc. Nat. 7, 48 pag. 242, n. 3.

Capitularia et Cenomyce neglecta Flork.

Cenomyce chlorophaea Fl. in Somm. Lapp. pag. 130. Ach. Syn. lich. pag. 252. Duby Bot. gall. 31 pag. 629.

Cenomyce pyxidata Biasoletto op. cit. pag. 93.

Baeomyces pyxidata Ach.

Pocillum pyxidatum Ach. Duf. Rev.

Lichen pyxidatus Linn. Thumb. Fl. lapp. Retz. pr. 2. Liljebl. Hoffb. Gunn. Gron. Doerr. Reich. Fl. Muller. Mohr.

- Scholl. Pollich. Lightf. Relb. Schrank. Mattusc. Weis. Crantz.
 Hag. Allioni. Gm. Syst. linn. Sowerby Engl. Bot. tab. 1393.
 Suec. Bot. tab. 498 f. 1, 2. Westring. Farglaf. tab. 17.
 Wahl. Suec. n. 4646. Ach. Prodr. 299 pag. 186.
Lichen radiatus Fl. Dan. tab. 1188 f. 3.
Lichen simplex Roth. Tent. Gm. Syst. linn.
Lichen squamosus II E, b. c. Web. Spicil.
Lichen pyxidatus major Tourn. Inst. R. Herb. pag. 549
 tab. 323 F. D. bona.
Lichen pyxidatus major Mich. N. Pl. Gen. or. 8 pag. 82
 tab. 41 f. 1 K. L. optimae.
Lichen pyxidatus, major, Alpinus, receptaculis florum
copiosioribus, et rufescensibus Mich. N. Pl. Gen. or. 8 pag.
 82 tab. 41 f. 2 optimae.
Lichen pyxidatus, major, rugosus Wall. Paris. tab. 21
 f. 7—11 optimae.
Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis Dill. Hist. Musc.
 pag. 79 tab. 14 f. A—C, I—M. optimae.
Coralloides scyphiforme, marginibus radiatis et foliatis
 Dill. Hist. Musc. pag. 85 tab. 14 f. 9 A optima.
Muscus pyxidatus saxatilis, simplex et proliferus, fimbriatus
denticulatus Cup. Pamph. Sic. ed. R. Univ. Catanae vol. 2
 tab. 180; ed. Benedict. Cass. tab. 316.
Nom. Sicul. Bicchirini.
Icon. Lich. Suec. n. 235.
Fl. Germ. n. 16, 200.
Schaerer Helv. n. 53—55.
Engl. Bot. tab. 1393.
Suec. Bot. tab. 498 f. 1, 2.
Westring. Farglaf. tab. 17.
Wahl Suec. n. 4646.
Fl. Dan. tab. 1188 f. 3.
Tourn. Inst. R. Herb. tab. 323 F. D.
Mich. N. Pl. Gen. tab. 41 f. 1 K. L. tab. 41 f. 2.
Vaill. Paris. tab. 21 f. 7—11.
Dill. Hist. Musc. tab. 14 f. 6. A—C, I—M. tab. 14
 f. 9 A.

Cup. Pamph. Sic. ed. Ben. Cass. tab. 316, ed. R. Univ.
Cat. vol. 2 tab. 180.

Habit. In Europa et Africa ad loca humida super muscos,
muros, et vetusta ligna; in silvis et campus vulgatissima.

Stat. Ubique in Sicilia ad umbrosa sylvatica, nemorosa
et mari proxima, Catanae, Messanae, Panormi, Siracusis, mon-
tibus dictis Madonie Caronie. Etna. Castelbuono ex Mico-
Palumbo 1300 p. p. Ius. Filicuri ex Gussone.

2. CL. MACILENTA.

Hoffm. Fl. Germ. 2 pag. 126. Fries lich. Europ. var.
filiformis a, 240 pag. 240.

Thallus horizontalis squamulosus, squamulis 3—5—lobatis,
lobis rotundatis, cinereo-viridibus, adpressis; podetia cylindrica,
gracillima, filiformia elongata, membraceo-corticata, glabra
cinereo-rubeola, vel cinerea, dein incano-pulverulenta, scyphis
terminata tubaeformibus, integris, angustissimis, aut saepius
apotheciis symphicarpeis oblitteratis, margine erecto. Apothe-
cia parva solitaria, aut cristato-radiata et prolifera, coccinea,
aut crocea. Discus primo planus et submarginalis, deinde con-
vexus, fungosus, laevis, emarginatus.

Januario, Februario, Martio.

Cladonia tubaeformis Hoffm. Fl. German. pag. 122.

Cladonia filiformis Schaeff. spic. pag. 19.

Cladonia polydactyla Flórke Clad. pag. 108.

Capitularia macilenta Fl. Berol. Mag. pag. 214.

Baeomyces macilenta Wahl. lapp. et Suec.

Baeomyces scolecinus Ach. Meth. pag. 324 tab. 7 f. 2.

Baeomyces et Genomyces monocarpus Ach.

Baeomyces et Genomyces bacillaris Ach.

Genomyces carcata Ach. lich. univers.

Scyphophorus filiformis Ach. Prodr. 309 pag. 193.

Lichen cocciferus var. *a* Linn. Suec. a. 1109.

Lichen macilentus Ehrh. Schrad.

Lichen filiformis Ach. prodr. 303 pag. 193. Reh. Engl.

Bet. tab. 2028. Huds. Gmel. syst. lina.

Lichen tubaeformis Lightf. Fl. Scot.

Lichen cornutus scyph. var. Hag. Inst.

92

Lichen exiguus Neck. Delic.

Lichen squamosus var. H. E. a Web.

Lichen pyxidatus var. a With. Hel. var. C. cornut. Weis.

LK. Encycl. meth. T. 3 p. 2 pag. 480.

Lichen pyxidatus, minimus, foliis tenuiter et eleganter incisis, receptaculis florum rufescentibus Mich. N. Pl. Gen. pag. 83 Tab. 41 f. 6 optima.

Coralloides scyphis gracilibus tubiformibus, Pedicularis folio Dill. Hist. Musc. pag. 85 tab. 44 f. 10 A. B.

Nom. Sic. Bicchirini fini.

Icon. Lich. Suec. n. 52.

Ehrh. Crypt. n. 277.

Schrad. n. 194.

Schaer. n. 34, 35.

Funk. n. 477.

Engl. Bot. tab. 2028.

Ach. Meth. tab. 7 f. 2.

Dill. Hist. Musc. tab. 44 f. 10 A, B.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 41 f. 6.

Habit. Ad humida loca super terram, truncos vetustos totius Europae vulgaris, ac Africæ non infrequens.

Statio. In Sicilia ubique cum praecedenti et sequenti specie super muscos, et velustos cortices. Ætnæ ad saxa umida : Aci-Reale 570 p. p. Catanae usque ad limitem nemorum 5892 p. p. et Pini 4586 p. p. Ad silvas Siciliae ac insularum adiacentium passim occurrit.

3. CL. GRACILIS.

Hoffm. Fl. Germ. Schaer. spic. pag. 31. Florke Clad. pag. 26. Fries lich. Europ. var. verticillata 194 pag. 219.

Thallus horizontalis squamulosus foliaceus, 3—5—7—lobatus, lobis plus minusque elongatis rotundatis, saepe inaequilibus, terminali majore, podetia cartilagineo-corticata, glabra, aut fuscure sparsa, dealbata, vel fusco-virescentia, basi tubulata, brevi ; omnia scyphiformia scyphis clausis, planiusculis, dilatatis ; centro saepissime proliferis, ac secundo et tertio ordine insidentibus. Apothecia fusca congesta, priuno ocreacea plana, excipulo donata, dein convexa fungiformia emarginata. Discus laevis, in sicco nigrescit.

- Januario, Februario, Martio.*
Cladonia dilatata Hoffm. Fl. Germ. ex Duby Bot. gall.
 pag. 631.
Cenomyce verticillata Duby Bot. gall. 35 pag. 631. Ach.
 Syn. 251. Lich. Univ.
Cenomyce allotropa var. *verticillata* Ach. Lich. Univ.
Cenomyce cervicornis Ach. Syn. Lich. pag. 251.
Baeomyces verticillata Florke in Web. et Mohr. Beytr. 2.
 pag. 283.
Patellaria fusca 4. B. Wallr. pr. pag. 128 n. a, a.
Scyphophorus gracilis Ach. Prodri. pag. 194.
Lichen prolifer Linn. Syst. Nat. 12, 4 pag. 552 var. d.
Encyclop. Meth. T. 3 p. 2 pag. 480.
 Lichen *cervicornis* Ach. in Vet. Ac. Handl. 1801 tab. 4 f. 3.
 Lichen *pyxidatus* var. B. Liun. suec. n. 1111. Wither.
 var. *gracilis* Weiss,
 Lichen *gracilis* Ach. Prodrom. 306 pag. 161. Linn.
 Retz. Pr. 2. Liljebl. Hoffm. Huds. Neck. Lightf. Crantz. Pollich.
 Mattusc. Hag. Allioni. Scholl. Leers. Schreb. spicil.
 Roth. tentam. Mohr. Gmel. syst. linn.
 Lichen *squamulosus* var. II L. Web. var. I Scop.
 Lichen *simplicissimus* Schrank. Fl. Bav.
 Lichen *polyceros* Schrank. Fl. Bav.
 Lichen *pyxidatus* prolifer Vaillant Paris tab. 21 f. 5 bona.
 Lichen *pyxidatus*, *endiviae crispa* folio, *prolifer*, *superne*
flavescens, *inferne albidus acetabulorum oris crispis* Mich. N.
 Pl. Gen. pag. 82 tab. 42 f. 2 P.
Coralloides Dill. Hist. Musc. pag. 80 variet. D—H.
 tab. 14 f. 6 D—H. bona; et f. 9 B. optima.
Muscus pyxidatus saxatilis simplex et proliferus fimbriatus
denticulatus Cup. Pamph. Sic. ed. R. Univ. vol. 2 tab. 180
 ed. Bened. Cass. tab. 316.
Nom. Sic. Bicchirini.
Icon. Lich. Suec. 34.
 Schaerer n. 62, 63.
 Moug. et Nestl. n. 749.
 Ach. Act. Ac. Handl. 1801 tab. 4 f. 3. *

Dill. Hist. Musc. tab. 14 f. 6 D—H. f. 9 B.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 42 f. 2 P.

Vaill. Paris tab. 21 f. 5.

Cup. Pamph. Sic. ed. Bened. Cass. tab. 316, ed. R.

Univer. vol. 2 tab. 180.

Var. b *Hybrida*.

Fries lich. Europ. 194 var. *b* pag. 219. Schaer. spic. pag. 32.

Podetia longa et praecedenti validiora plurima scyphifera, scyphis dilatatis, margine crenato plerumque prolifero; albo-cinerea, glabra aut furfuracea. Apothecia glomerata, subsusca.

Januario, Februario, Martio.

Baeomyces turbinatus Ach.

Genomyce allotropa var. Ach. lich. Univ.

Genomyce gracilis Ach. Syn.

Scyphophorus turbinatus Ach. Pr. pag. 192.

Capitularia gracilis Florke Clad.

Lichen turbinatus Ach. Pr. 307 pag. 192.

Lichen cervicornis Engl. Bot. tab. 2547.

Lichen pyxidatus, acetabulorum oris proliferis, receptaculis florum rufescentibus Mich. N. Pl. G. pag. 82 tab. 41 f. 7 optima.

Lichen pyxidatus ramesus et prolifer major, receptaculis florum rufescentibus Mich. op. cit. pag. 82 tab. 41 f. 8. optima.

Icon. Schaer. Helv. n. 65, 66.

Sommerf. Lapp. n. 75.

Funk n. 178.

Engl. Bot. tab. 2547.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 41 f. 7, 8.

Habit. Europa et Africa cum praecedentibus frequens.

Stat. Sicilia ubique una cum praecedentibus obvia: Aetnae, Caronie, Madonie, et locis mari proximis super mucos, et vetusta ligna; var. *b* Castelbuono 1260 p. p. ex Mina-Palumbo. Ins. Filicuri ex Gussone 1256 p. p.

4. CL. DEGENERANS.

Flork. Clad. pag. 41. Fries Lich. europ. 195 pag. 221.

Thallus horizontalis squamulosus subimbricatus, lobatus,

lobis 3—5—crenatis; inferne albus, superne viridis; podetia cartilagineo-corticata, gracilia non tubulosa, proliferoramosa, viridi-pallentia, basi fusca albo guttata, scyphis nullis, seu in ramis fastigiatis, digitatim divisus aut in scyphis irregularibus cristato-laceris. Apothecia erecta, solitaria, primo plana, deinde suagiformis. Discus laevis, convexus, emarginatus, atro-purpureus.

Januarie, Februario, Martio.

Cladonia cristata Hoffm. Pl. Ger.

Cladonia phyllophora Hoffm. ex Fries l. c.

Cladonia cariosa Flórke de Clad. var. a.

Cladonia ptyrea Flórke in Web. et Mohr. Beytr. 44 pag. 308.

Capitularia degenerans Flórke in Web. et Mohr. Beytr.

11 pag. 308.

Capitularia gonorega Flórke l. c.

Baeomyces degenerans Wahlenb.

Baeomyces trachynus et anomaeus Ach. Meth. Engl. Bot.

tab. 1867.

Baeomyces cariosus Ach.

Cenomyce degenerans Flórke Lich. Deutsch.

Cenomyce gonorega Ach. Syn. pag. 258.

Cenomyce ptyrea Ach. Syn. pag. 254 var. o.

Helopodium cariosum Ach. Pr. trib. 22 pag. 198.

Lichen phyllophorus Ehrb. exs. n. 287.

Lichen cariosus Ach. Prodr. 313 pag. 287. Ac. Handl.

1801 tab. 4 f. 4.

Coralloides parum ramosum, tuberculatus fuscus Dill. Hist.

Musc. tab. 97 tab. 15 f. 20 mediocres.

Icon. Lich. Succ. n. 54 at n. 236. haud optima.

Fl. Deutsch. n. 410, 411, 194 var. furfuracea; 193 bona et 149.

Ach. Vet. Ac. Handl. 1801 tab. 4 f. 4.

Engl. Bot. tab. 1867.

Dill. Hist. Muse. tab. 45 f. 20.

Habit. Europa ad terram, loca humida et copiosissime in pinetis et ericetis subalpinae regionis.

Stat. In Sicilia super muscos una cum praecedentibus speciebus non frequens. *Ætnae* Bongiardo 1094 p. p. ex Garzia. Linera.

5. CL. ENDIVIAE FOLIA.

Fries lich. Europ. 190 pag. 242.

Thallus horizontalis foliaceus subtus effrilllosus, crispus, inciso-lobatus, pinnatisidus, contortus, flavo-virescens ; podetia scyphiformia suprafoliacea sparsa, laevia turbinata glauca, aut flavo-virescentia, scyphis concavis subsimplicibus irregularibus, incisis, diafragmate instructis ; pruina cinereo-glaucia sparsis. Apothecia marginalia, minuta, sparsa, rufa. Discus primo planus glaber, dein fungiformis, emarginatus, croceo-fuscus.

Martio.

Cladonia cornucopioides Hoffm. Fl. Germ.

Cladonia alcicornis var. Florke. Cladon. pag. 25.

Patellaria foliacea var. *convoluta* Wallr. pr. pag. 165.

Baeomyces endiviaefolius Ach.

Baeomyces caespiticius Persoon Ust. Ann. St. 7.

Cenomyce endiviaefolius Ach.

Scyphophorus endiviaefolius DC. et LK. Fl. Fr. 2. Ach.

Prodr. pag. 196.

Lichen endivifolius Ach. Pr. pag. 195.

Lichen convolutus LK. Encycl. meth.

Lichen pyxidatus terrestris endiviae crispaefolio, superne ex flavo, et glauco subvirescens, inferne albido, pyxidulis plerumque simplicibus, receptaculis flororum rufescens Mich. N. Pl. Gen. pag. 83 tab. 42 f. 3 bona.

Lichen pulmonarius, arboreus e cinereo viridis Vaill. Bot. Pr. tab. 21 f. 13. mediocris.

Ieon. Vaill. Paris. tab. 21 f. 13.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 42 f. 3.

Habit. In Africa et Europa ad sabulosa sylvatica, aut sterilia in regione pedemontana vel subalpina.

Stat. Sicilia ad subulosa in sylvis, saxa calcarea et arenaria. Castelbuono 1260 p. p. ex Mina-Palumbo.

6. CL. CORNUA.

Hoffm. Fl. Germ. Descr. et Adum. lich. vol. 2 pag. 1
tab. 25 f. 1. Sched. Crit. 4 pag. 225. Fries lich. Europ.
197 pag. 225.

*Thallus horizontalis squamulosus, confertus, squamulis
3—5—lobatis, lobis minimis subtus canescendibus, superne ci-
nereo-viridibus; podelia cylindrica subventricosa, plus minusque
elongata epidermide inferne persistente cartilaginea, externe
pulveraceo-deliquescente; viridi-cinerea, aut cinerea; scyphis
nullis; seu podetii apice angustatis acuminatis, aut planiu-
sculis et truncatis, margine incurvo et subintegro. Apothecia
parva podetii subulatae aut apice truncatae saepe innata. Di-
scus primo levis planus, dein emarginatus, fungiformis, fuscus.*

Januario, Februario.

Cladonia fragilis Spreng. syst. veg. pag. 273.

Cladonia coniocraea Florke Monogr. pag. 84.

Cladonia sibirica var. *cornuta* Ach. Syn. pag. 257.

Cladonia polymorpha Schrad. Spicil.

Scyphophorus cornutus var. *a* DC. et LK. Fl. Fr. 2,
pag. 314. Ach. Prodr. 192.

Baeomyces Ach. meth. Wahl. Suec. n. 1648.

Genomyce Ach. lich. Univ. pag. 545. Duby Bot. Gall.
27 var. *vermicularis* pag. 628.

Genomyce clavarioides Duf. Rev. Cen. n. 8.

Genomyce coniocraea var. *excelsa* Florke de Clad. D. L.

Lichen cornutus Linn. Lapp. n. 434. Sommerf. lapp.
pag. 131. Lin. syst. veg. 963. Syst. pl. 553. Fl. Suec.
1115. Laers herb. 109. Rehl. cent. 437. Encycl. meth. var.
a T. 5 p. 2 n. 427 pag. 481. Ehrh. sec. spec. E. Meyer.
Ach. Prodr. 308 pag. 192. Retz. pr. 3. Hoffb. Litjebl. Gunn.
Huds. Lightf. Allioni. Scholl. Hag. Mattosc. Reich. Fl. Neck.
Wulf. Schrift. Nat. Fr. Muller. Mohr. Gmel. syst. linn.

Lichen clavaeformis Schrank. Fl. Bav.

Lichen squamosus var. *cornutus* Weis var. Wither.

Lichen polymorphus var. *cornutus* Roth. tent.

Coralloides non ramosa tubulosa Vaitt. Paris pag. 42.

Coralloides vix ramosum scyphis obscuris Dill. Hist.

Musc. 90 tab. 15 f. 14. 13

Lichenoides tubulosum cinereum non ramosum Raj. syn.
3 pag. 68 n. 27.

Muscus fistulosus corniculatus Barr. Icon. 1277 f. 4.
Bocc. Mus. 2, pag. 149 tab. 107.

*Musco-fungus petracus corniculatus cornibus indivisis et
incurvatis* Moris hist. 3 pag. 633 sec. 15 tab. 7 fig. 4.

Icon. Hoffm. Descr. et Adum. lich. vol. 2 tab. 25 f. 4.

Lich. Suec. n. 116.

Fl. Germanica n. 139.

Dill. Hist. Musc. tab. 15 f. 14.

Bocc. Mus. tab. 107.

Moris Hist. 3 tab. 7 f. 4.

Barr. Ic. 1277 f. 4.

Habit. In Europa copiose ad terram, praecipue sylvas
densas, raro ad trunco, et muscos.

Stat. In Sicilia frequens tam in regionibus mari proximis,
quam montosis, ad saxa vulcanica et calcarea. Catanae, Etnae
Bongiardo 1680 p. p. Castelbuono 1260 p. p. ex Mina-Pa-
lumbo.

7. Cl. ALCICORNIS.

Fries Lichen. Europ. 191 pag. 213. Sched. Critic. 7
n. 210. Florke de Clad. Monogr. pag. 23 a.

Thallus subfoliaceus horizontalis, erectus, lobatus, mar-
gine pilis nigris fibrillosus, pallide-viridis; podetia levia,
turbanato-cylindrica, glauca, scyphis concavo-planis, regularibus
crenulatis. Apothecia parva divisa. Discus levis, fungiformis
rufus.

Martio.

Cladonia foliacea Schrad. spicil. Hoffm. Fl. Germ.

Scyphophorus alcicornis Ach. Prodr. lich. pag. 184.

Baeomyces alcicornis Ach. Meth. lich. Wahl. Suec. n.
1649.

Cenomyce alcicornis Ach. syn.

Cenomyce damaecornis Lich. univ. pag. 530.

Cenomyce Vaillantii Duf. rev. Cen.

Capitularia alcicornis Florke l. c.

Patellaria foliacea var. e, g. Wallroth pr. pag. 165.

Lichen alcicornis Ach. Prodr. 295 pag. 184. Ligthf.
Belham.

Lichen foliaceus Huds. Schreb. spicil. Retz. Pr. 2. Roth
tentam. Gm. Linn. syst.

Lichen pyxidatus var. Wither. Arr.

Lichen squamosus var. B 14. Scop. Carn.

Lichen endiviaefolius Dicks. Engl. Bot. tab. 2361.

Lichen pyxidatus, *Endiviae crispae folio* prolifer (*superne*
flavescens, *inferne albidus*) *acetabulorum oris crispis* Mich.
N. Pl. Gen. pag. 82 or. 8 n. 9 tab. 42 f. 4.

Lichen pyxidatus, *Endiviae crispae folio*, *superne cinereus*,
inferne ex albo rufescens, *acetabulis altero alteri usque ad*
quartum et quintum gradum incascentibus Ejus. n. 10 tab. 42
fig. 2.

Lichen pyxidatus, *Endiviae crispae folio*, *prolifer*, *acetab-*
ulorum oris crispis Tourn. Inst. R. Herb. 549. Vaill. Fl.
Paris. Tab. 21 f. 3 optima.

Coralloides scyphiforme, *foliis alcicorniformibus*, *cartila-*
ginosis Dill. Hist. Musc. pag. 87 tab. 14 f. 12 A—D, bonae.

Muscus membranaceus, *saxatilis*, *incanus*, *polyceratos*
crispus Hort. Cath. Suppl. Cup. Pamph. Sic. ed. Benedict.
Cass. tab. 282.

Icon. *Lichen Suec.* n. 210. Fl. Germ. n. 58.

Engl. Bot. tab. 2361.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 42 f. 1, 2.

Vaill. Paris tab. 21 f. 3.

Dillen. Hist. Musc. tab. 14 f. 12 A—D.

Cup. Pamph. Sic. tab. 282 ed. cit.

Habit. Ad sterilia et sabulosa Europae ubique.

Stat. In Sicilia ex auctoritate Cupanii.

SECTIO II.

ASCYPHIFERÆ

Thallus horizontalis crustaceo-granulosus, *granulis in po-*
detia abeuntibus. *Podetia uniformia*, *fruticulosa*, *ascypha*, *de-*
finita ramosa, *quandoque thalode squaluloso sparsa*.

8. CL. RANGIFERINA.

Ach. Prodr. pag. 202. Hoffm. Fl. Germ. pag. 114.
 Wild. Prodr. Fries lich. europ. 211 pag. 213. DC. et LK.
 Fl. Fr. 2 pag. 336. Schaefer spic. pag. 37. Florke de Cladon. pag. 160—170.

Thallus horizontalis cartilagineus evanidus, crenatus; podetia fruticulosa, crustacea, tubulosa, ramosissima, saepissime trichotoma, erecta, viridi-cinerea, caespitosa, axillis perforata; aliquando pustulosa et pruina glauca aspersa; saepe thallo squamuloso-foliaceo ornata, et sparsa, caduco, albo-canescens, aut albo-viridi; apices ramulorum sterilium sunt nutantes, fertilium vero cymosi, erecti. Apothecia podicellata trichotoma erecta, aut dichotoma, levia, fungiformia, semiglobosa, peltata. Discus primo planus submarginatus, dein convexus, emarginatus, saepe triqualeatus, fuscus, aut fulvo-fuscus.

Martio, Aprili.

Cenomyce rangiferina Ach. lich. univers. pag. 564. Duby Bot. gall. 5 pag. 64.

Patellaria fusca I holophyllina var. *rangiferina* Wallr. pag. 145.

Lichen rangiferinus Linn. Sowerby Engl. bot. tab. 163. Fl. Dan. tab. 180. 539. Suec. Bot. tab. 47. Ucria Cat. R. Hor. Panor. pag. 444. Retz pr. 2. Hoffb. Liljebl. Gronov. Weis. Połlich. Lightf. Neck. Huds. Relh. Wither. Lumnitz. Schrank. Hag. Leers. Gm. tubing. Leyss. Murray. prodrom. Relh. tant. Mattusc. Reich. Fl. Scop. Gunn. Allioni. Mull. Scholl. Doerr. Guerl. syst. linn.

Lichen coralloides tubulosus major candidus ramosissimus, receptaculis florum rufescentibus perexiguis Mich. N. Pl. Gen. pag. 79 n. 1 or. xi tab. 40 f. 4.

Coralloides montanum fruticuli specie, ubique candicans Dill. Hist. Musc. pag. 107 tab. 16 f. 20 bona.

Muscus coralloides arboreus platicaulos. MSC. *Coralloides platicaulos* Cip. Pamph. Sic. tab. 566 ed. Benedict. Cass. vol. 2 tab. 318 edit. Bibl. R. Univ. Cat.

Nom. Sic. Muscu terrestri cu rami comu filu a culuri diciniri Ucria l. c.

Icon. Engl. Bot. tab. 173.

Fl. Dan. tab. 180, 539.

Suec. Bot. tab. 47.

Lichen. *Suec.* n. 238.

Schaer. n. 76, 77.

Moug. et Nestl. 72.

Dill. Hist. Musc. tab. 16 f. 29.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 40 f. 1.

Tabern. Hist. pag. 1198 f. G.

Moris. Hist. tab. 7 f. 9.

Var. b Sylvestris.

Fries lich. Europ. I. c.

Thallus squamosus canescens; podocia brevia parce ramosa, ramulis subfasciculatis, alba, squamigera, squamis trilobatis albis.

Cladonia sylvatica Hoffm. *Fl. Germ.*

Cenomyce rangiferina var. *tenuior* Delise ex Duby *Bot.*

Gall. 5 pag. 64.

Cenomyce sylvatica Florke *Germ.* n. 76.

Baeomyces rangiferinus var. *pungens* Wahl.

Patellaria fusca II *schizophyllina* var. *sylvatica* Wallr.

pag. 160

Lichen sylvaticus Allion. *Fl. Ped.*

Coralloides fruticuli specie *candidans*, *cornicalis* *rufescens* Dill. *Hist. Musc.* pag. 110 Tab. 16 f. 30 A, B.

Icon. Lichen. *Suec.* n. 239.

Florke German. n. 76.

Schaer. n. 78,

Dill. *Hist. Musc.* tab. 16 f. 30.

Var. c Alpestris.

Fries lich. europ. I. c.

Thallus squamosus canescens, aut obscure-cinereus infrequens; podocia saepe nuda, ramosa, ramis elongatis divaricatis, aut fastigiatis, intricatis, implexis.

Cladonia rangiformis Hoffm. *Fl. Germ.*

Icon. Lich. *Suec.* n. 240.

Dill. *Hist. Musc.* tab. 16 f. 29. E, F.

*

102

Habit. Americae et Europae ad terram et inter muscos species obvia ; in boreali regione maximam partem vegetationis constituit.

Stat. In Sicilia frequentes tam in subalpina quam alpina regione spec. et var. *b*, *c*. Madonie seu M. Heraei ; Castelbuono 1260 p. p. Mina-Palumbo. *Var. b* Palermo S. Martino 1633 p. p. Caputo 2401 p. p. ex Gussone. *Var. c* Palermo a Partinico 2000 p. p. ex Gussone.

9. CL. FURCATA.

Sommerf. lapp. pag. 134. Fries lich. europ. 200 var. racemosa pag. 230. Florke de Cladoniis pag. 141—160. Duby Bot. gall. 5 pag. 622. Ach. Pr. lich. 521 pag. 204. Schrad. spic.

Thallus horizontalis squamulosus subdissectus, crenulatus ; podecia erecta, aut recurva, fruticulosa, dichotoma, apice furcata, membranaceo-corticata, a duo ad tres pollices longa et ultra, turgida, inflata, tubulosa, levia et polita, fusco-virescentia, aliquando basi albo-viridia, axillis et apicibus fertilibus perviis, aut rimosè hiantibus, ac ramis fertilibus etiam cum podecio aliquando explanatis. Apothecia terminalia, apice podeciorum, erecta. Discus primo planus, levis, dein conve-xus, fungiformis, emarginatus, e pallido fuscus, umbilicatus.

Majo. Junio, Julio.

Cladonia spinosa Ach. Prodr. lich. pag. 205. Hoffm.

Cladonia racemosa Hoffm. Fl. Germ.

Cladonia furcellata Hoffm. Fl. Germ.

Cladonia fruticulosa Schaeerer. spic. pag. 39.

Cladonia subulata Stirp. Fems.

Cladonia pungens Florke de Cladon. pag. 160. DC. et Lk. Fl. Fr. 2 pag. 336.

Baeomyces racemosa Wahl.

Cenomyce racemosa Ach. et Biasoletto esc. bot. sullo Schneberg pag. 93.

Lichen racemosus Schrad. Crypt. Saml. n. 130.

Lichen spinosus Huds. Lighif. Relham. Hag. Neck. delic. Reich. Fl. Gmel. syst. linn.

Lichen coraloides, *tubulosus*, *medius e cinereo viridans*,

ramulis aduncis, plerumque foliosis, extremitatibus palmatis, receptaculis florum rufescens Mich. N. Pl. Gen. pag. 80 tab. 40 f. 6 optima.

Lichen coralloides, tubulosus, major, montanus, e cinereo-viridi rufescens, caulis recurvis, nonnihil foliosis, inordinate dispositis, receptaculis florum crassioribus rufescens Mich. l. c. tab. 40 f. 5 optima.

Lichen coralloides, tubulosus, major, ex cinereo-fusco virescens, caulis crassioribus, et durioribus, minus ramosis, extremitatibus palmatis, receptaculis florum exiguis, rufescens Mich. l. c. pag. 74 tab. 40 f. 3 optima.

Lichen coralloides tubulosus, medius, e cinereo-viridans, ramulis erectis, nonnihil foliosis, extremitatibus aperitis, et palmatis, receptaculis florum rufescens exiguis Mich. l. c. pag. 80 tab. 40 f. 4 optima.

Coralloides sparsum, caulis tortuosus et spinosis Dill. Hist. Musc. pag. 102 tab. 16 f. 25.

Coralloides furcellata rigida lanugine rufa aut pallida vestita ? Cup. Pamph. Sic. tab. 472 ed. Benedict. Cassinensis.

Icon. Lich. Suec. n. 58.

Schaerer. Helv. n. 80.

Hag. Hist. lich. tab. 2 f. 10, 11.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 40 f. 3, 4, 5, 6.

Taberna. Hist. pag. 1197 f. 2.

Dill. Hist. Musc. tab. 16 f. 25.

Moris. Hist. tab. 7 f. 4.

Var. b Subulata.

Fries lich. europ. l. c. pag. 230.

Thallus squamulosus crenatus, lobatus ; podetia tubulosa aequalia, tenuiora, axillis subpertusa, raro pertusa, ramosissima aut parce ramosa, erecta ramulis divergentibus, substerilia, apicibus fissis, subulatis. Apothecia badia.

Martio, Aprili.

Cladonia subulata Hoffm. Fl. Germ. Ach. Prodr. lich. pag. 203.

Cladonia furcata Hoffm. Fl. Germ.

Cladonia recurva Hoffm. Fl. Germ.

104

Cenomyce subulata Ach.

Cenomyce furcata Ach.

Baeomyces subulata Wabl.

Lichen furcatus Schreb.

Lichen subulatus Linn. Betz pr. 2. Hoffb. Liljebl. Huds.

Pollich. Lees. Neck. Lightf. Schreb. spicil. Leers. Roth. tent.

Mull. Mohr. Hag. Reh. Wither. Weis. Mattusc. Allioni. Leyss.

Scholl. Lumnitz. Gmel. syst. linn.

Coralloides corniculis brevioribus et crebrioribus Dill.

Hist. Musc. pag. 104 f. 27 A—D bonae.

Icon. Lich. Suec. n. 117.

Florke Fl. German. n. 196—197. Schaer. n. 84.

Dill. Hist. tab. 16 f. 27 A—D.

Vaill. Paris. tab. 7 f. 7.

Moris Hist. pag. 632 tab. 7 f. 4.

Habit. Species pro varietatibus polymorpha, et per omnem Europam copiosissima super muscos, ad loca sabulosa et uliginosa, tam in regionibus planis quam alpinis.

Statio. In Sicilia frequens, ad calcarea saxa alpinas et subalpinas regionis. Apud Panormum Monte Caputo 2401 p. p. ex Gussone. Actnae in sylvis, ad nemora 4734 p. p. usque ad 5892 p. p. Var. b ubique ad nemora in montibus dictis Caronie M. S. Diana 3639 p. p. Strada tra Mistretta e Niccosa 3502 p. p. Ins. Pantelleria M. S. Elmo 674 p. p. Cima dell' isola 2480 p. p. ex Gussone.

10. CL. ETNENSIS.

Nobis.

Thallus horizontalis granulosus evanescens, et in podetis abiens; podetia fistulosa, gracilissima, basi dilatata, alba, aut cinereo-rubra, divaricata, nudiuscula, at saepissime squamis thalloides sparsa, 3—5—lobatis, lobis crenatis, albido-cinereis, superne viridibus, ac tum attenuatis; podetia ramosa dichotoma, aliquando polychotoma; ramuli erecti fuscellati subpuentes, axillis imperforati, sesqui aut pollicem longiusculi; omnes maculati seu subverruculosi; verruculae albide, aut fuscae, aut viridi-fuscescentes, ramuli raro implexi. Apothecia terminalia, aliquando sparsa; raro subsolitaria, saepissime bisida, raro

trifida; primo sub-fusca acuminata, umbilicata, sub lente
sub-verruculosa, basi leviter marginata dein incrassata he-
misphaerica umbilicata, verruculosa, leviter marginata; postea
turbanata; denique fungiformia, pedicellata, levia, peltata,
verruculis et umbilico destituta. Discus levis emarginatus, con-
vexus fuscus, aut nigro-fuscus.

Dicembri, Januario, Februario, Martio.

Cladonia pungens var. *foliosa* n. 36. Florke de Clado-
niis Comm. nova 1828. pag. 156—169. Reichenbach et Schu-
ben. lichen. exycc. n. 112. Ach. Prodr. lich. pag. 202.
Wallr. pag. 144.

Cladonia fruticulosa Schaer. n. 81.

Cladonia foliosa Duf. Rev.

Cladonia furcata var. *pungens* Fries lich. europ. pag. 230.

Ach. lich. Univers.

Cladonia furcata var. *fruticulosa* Schaerer n. 459. Lich.
Helvetici.

Cladonia rangiformis Linn. ed. Spreng. 270.

Cladouia incrassata Persoon in litt. Flork.

Cenomyce rangiformis Florke Deut. liche. 1 pag. 42,
ibid. var. *foliosa* VIII pag. 15. Exs. Fl. Deutesch. lich. n. 158.
Cenomyce rangiferina var. *pungens* Ach. Syn. lich. p. 278.
Cenomyce furcata var. *pungens* ejusd. lichenolog. univ.
pag. 562.

Baeomyces pungens Ach. meth. a, b.

Lichen pungens Ach. Prodr. n. 318 pag. 202.

Coralloides fruticuli specie *candidans*, *corniculis rufescen-*
tibus Dill. Hist. Musc. pag. 110 tab. 16 f. 30 C. D. non bona.

Muscus parietinus, *incanus* *coralloides* *corticibus rufescen-*
tibus platycaulos Cup. Pamph. Sic. tab. 528 in ed. Bened.
Cassinensis; vol. 2 tab. 181 in ed. Bibl. R. Univers. Catanae.

Nom. Sic. Lippu jancu di sciara, ab aetnicolis.

Icon. Lich. Suec. n. 318.

Florke Deutesch. 158, 159.

Moug. et Nestl. n. 754.

Reich. et Schub. lich. exycc. n. 112.

Dill. Hist. Musc. tab. 16 f. 30 C. D.

Cup. Pamph. Sic. tab. 528 in ed. Bened. Cass. vol. 2
tab. 181 in ed. Bibl. Univers. Catanae.

Nostra Tab. III f. A exhibet plantam habitu proprio et naturali; podetis ramosis in ramulis divaricatis, erectis, dichotomis, vel polychotomis, basi dilatatis; squamis thallodeis 3—lobatis, sparsis: a a apothecia fusca terminalia, solitaria aut bifida: b b b maculas seu verrucas cinereo-virescentias in ramulis leute auctis, albo-cinereis: e e apothecia fusca, sparsa, aut bilida, primaeva, sphaeroidica, umbilicata, maculata, lente aucta: c c apothecia fusca sphaerica, incrassata et turgida, maculata umbilicata: f f apothecia fusca lente aucta, bifida, turbinateformia, umbilicata: d d apothecia perfecta, fusca, levia, fungiformia, convexa, bifida.

Habit. Ad plana et alpina humida et uliginosa loca Europae non infrequens.

Stat. Ubique in Sicilia, ad calcarea saxa vulcanica, et silicea; super muscos, filices, et alias lichenes. Aetnae ubique a Catana usque ad 7429 p. p. limite dell' *Astragalus*; Acicastello mari proximo ad pagum Maletto 3285 p. p. ultimum regionis aetneae habitatae locum. Portella al telegrafo 1559 p. p. ex Prestandrea. Insula Pantellaria 674 p. p. ex Gusone.

‡ 11 CL. UNCIALIS.

Fries lich. Europ. 212 pag. 244. Hoffm. Fl. Germ. Ach. Prodr. pag. 201.

Thallus crustaceus papillosus evanescens; podetia fruticulosa dichotoma laevigata, longa, et turgida, sursum incrassata axillis hiantibus, aut brevia ac angusta, subattenuata, axillis integris, at semper subperforatis; apicibus sterilibus erectis nigrescentibus, fertilibus digitato-radialis. Apothecia terminalia. Discus laevigatus, fungiformis fuscus.

Januario, Februario, Martio.

Cladonia stellata Schaefer. Florke de Cladon. pag. 171.

Cladonia biuncialis Hoffm. Fl. Germ.

Cladonia ceranoides DC. et LK. Fl. Fr. 2. Hoffm. Fl. Germ.

Cladonia attenuata Hoffm. Fl. Germ.

Cladonia uncinata Hoffm. Fl. Germ.

Baeomyces uncialis Wahl. Suec. pag. 846. Ach. Meth. lich. Lich. Univers.

Cenomyce uncialis Ach. Syn. pag. 279. Ach. Meth. et Lich. Univers.

Cenomyce oxyceras Ach. syn. prodr. var. *obtusata*.

Patellaria coccinea II f. Wallr. pag. 190.

Lichen uncialis Linn. Retz. pr. 2. Hoffb. Liljebl. Schreb. spicil. Leers. Lightf. Web. Neck. delic. Crantz. Hagen. Mat-tusc. Gmel. tubing. Huds. Wither. Wild. Relham. Lumnitz. Schrank. Roth. tent. Gunn. Allioni. Mull. Mohr. Gm. syst. linn. Sowerby Engl. Bot. tab. 174.

Lichen coralloides tubulosus albidus major et mollior, caulis crassioribus minus ramosis, receptaculis florum pere-xiguis rufescentibus Mich. N. Pl. Gen. pag. 79 tab. 40 f. 2.

Lichen coralloides tubulosus albidus, minor et mollior, caulis crassioribus minus ramosis receptaculis florum pere-xiguis rufescentibus Mich. N. Pl. Gen. pag. 79 n. 7.

Coralloides perforatum minus, molle et tenue Dill. Hist. Musc. pag. 99 tab. 16 f. 22.

Coralloides perforatum majus, molle et crassam Dill. Hist. Musc. pag. 98 tab. 16 f. 21.

Muscus ceranoides C. B. Pr. in Cup. Pamph. Sic. tab. 282 ed. Bened. Cass. ubi MSC. legitur: *Lichen platycaulos ceranoides*, cinereus, lendiginosus.

Musco-fungus ceranoides mollior et elatior, albidus tu-bulosus Moris. Hist. Ox. iii pag. 633 sec. xv tab, 7 f. 7.

Icon. Lich. Suec. n. 87, 257.

Florke Deutesch. lich. n. 155—156.

Schaer. Helv. 82—83.

Engl. Bot. tab. 174.

Mich. N. Pl. Gen. tab. 40 f. 2.

Dill. Hist. Musc. tab. 16 f. 21—22.

Cup. Pamph. Sic. tab. 282 ed. Benedictino-Cassinensis Catanae.

Moris. Hist. Ox. tab. 7 f. 7.

Habil. Ad terram, super muscos, ad uliginosa loca totius Europae frequentissima.

Stat. In Sicilia ex auctoritate Cupanii.

XVII. STEREOCAULON

Endlicher Or. IX Hymenothalami Tr. II Lecidinae gen.
169. *Fries lich. Europ. or. I Gymnocarpi Trib. II Lecidinae gen.* 9 *Lud. Eman. Schaefer lich. Europ. Gen. Meth. Art. Cl. II Lich. Capitati Or. 2 Solidi gen. 23. Meth. Nat. Cl. II lich. Capitati or. XII Cladoniacei gen. 22.*

Thallus horizontalis, granulosus tartareus, evanescens stipites (podetia) agens solidos, caulescentes, erectos verticales, iulus filamentosos extus crustaceos thallodem squamulosogranulosum sufficiientes. Apothecia sparsa, subsessilia primum turbinata, marginata, excipulo proprio thallodeo donata; dein cephaloidea seu globosa immarginata, solida. Discus excipulo proprio impositus, fuscus, aut ater.

Stereocaulon Schreber gen. n. 1668. Ach. Prodr. lich. trib. 24 pag. 208. Meth. lich. sec. III coenothalami gen. 22. Spreng. syst. veget. 4 gen. 474. Persoon in Ac. Soc. Wet. 2, pag. 19 tab. 10 f. 5. Humb. Kunt et Bompl. syn. pl. aequinoctial. T. 1 pag. 33. Fl. Dan. tab. 1771. Fries Syst. Or. veget. Sched. Crit. 4 pag. 24. Meyer. Eschweil. DC. et LK. Fl. Fr. 2. Synops. Fl. Gall. Duby Bot. gall. 5 Sommerf. Lapp. pag. 123. Laurer Monogr. ined. ex Fries lich. europ. pag. 201. Wahl. Suec. pag. 855. Florke Deutesch. lich. n. 78, 190. A. Richard Fl. N. Zelan. tab. 9 f. 3, 4.

Coralloides species Hoffm. Descr. et Adumbr. lich. vol. 1 pag. 25. Fl. Germ. pag. 130. Dillen. Hist. Musc. gen. 5 ser. II pag. 112.

Lichen species Linu. Ach. Prodr. pag. cit. Fl. Dan. Leers. Mich. N. Pl. Germ.

Thamnium species Vent.

Baeomyces species Wahl. Lapp. et Suec.

1. *ST. VESUVIANUM.*

Persoon in Act. Welt. 2 tab. 10 f. 5. Fries lich. Europ. pag. 204.

Thallus horizontalis granulosus albo-cinereus, tartareus, podetia verticalia efficiens; podetia erecta, lignosa, confertissima, cylindrica, ramosa, ramis divaricatis, irregulariter divisus,

sesqui aut pollicem et ultra elongatis, cinerea aut rubeola; tomento spongioso seu unctuoso vestita; granulis thalloideis subglobosis, lineatis, aut 3—5—sulcatis crassis, conglomeratis, fusco-punctatis, tartareis, demum apertis planiuscalis aut concavis in margine sinuato, crenato, ac 3—5—7—lobato, lobis attenuatis, strato superiori flavido, inferiori cinereo-tartareo. Apothecia sparsa, sursum conferta, libera, subpedicellata primum turbinata, thallode granuloso tartareo marginata, dein globoso-cephaloidea emarginata. Discus levis, fuscus, aut atrofuscus.

Januario, Februario:

Stereocaulon botryosum Ach. syn. lich. pag. 284. Humb. Kunt. et Bonpl. syn. Fl. aequinoct. vol. 1 pag. 53 var. *b* vesuvianum Spreng. syst. veget. 4, 3377 pag. 275.

Lichen saxatilis, cinereus, fruticulosus ramulis habitioribus, minus ramosis racemulis seminum undique, et dense refertis, receptaculis florum nigrantibus Mich. N. Pl. Gen. pag. 78 tab. 53 f. 6.

Nom. Sic. Lippu di sciara.

Icon. Persoon Act. Soc. Wett. 2 pag. 19 tab. 10 f. 5.
Mich. N. Pl. Gen. tab. 53 f. 6.

Nostra Tab. III f. B exhibet plantam habitu suo et magnitudine; podetiis ramosis ramis confertissimis, erectis, et divaricatis; granulis thalloideis vestitis nunc globosis, lineatis, 3—5—7—sulcatis, nigro-punctatis, nunc apertis et 3—5—7—lobatis, sinuato-crenatis; *a* apothecia inferne sparsa, sursum conferta, libera et subpedicellata thallode granulosocalcareo-marginata, margine sulcato: *b* apothecium lente auctum, perfectum, subpedicellatum fuscum, laeve emarginatum; pedicellum et excipulum proprium tomento seu substantia unctuosa sparsum.

Habit. super vulcanica saxa Americae et Europae, ad plana, et alpina loca.

Statio. Aetnae ubique super saxa vulcanica mari proxima usque ad loca dicta Pietra del piano del Lago 8203 p. p. Limite dell' *Astragalus* 7489 p. p. del *Berberis* 7410 p. p. della *Pteris aquilina* 5615 p. p. Limite dell' *Ilex aquifolium*

*

410

e *Betula alba* nella valle del Trifoglietto 4754 p. p. Giannicola
boschetto del *Populus tremula* 5292 p. p. Catanae al Gaito,
Villa scabrosa. Aci-Reale 570 p. p. Aci-Castello.

Observ. Haec est prima vegetatio super saxa vulcanico
igne producta ; quae annorum laxu, et aliarum lichenum ac
plantularum detritu uberem solum vulcanicum efficit.

—————

DISPOSITIO TOPOGRAPHICA

LICHENUM SICILIENSIMUM

AC INSULARUM ADIACENTIUM

» Vegetationis lichenosae conditiones primariae, humiditas aeris et lux, extensionis terminos definiunt ab ipso circulo aequinoctiali usque ad polaris glaciem, et a littorum marinorum scopolis ad alpium terminum nivalem, ubi ingenti individuorum copia regionem propriam lichenosam constituunt. Stirps omnes sociales, plurimae latae diffusae, aliae endemicae, perfectiores versus aequatorem, crustaceae et fruticulosae versus polum, et in montium cacuminibus frequentiores. »

Ex his facile deducitur quam perusile sit latitudinem et longitudinem geographicam exponere Siciliae, ac insularum adiacentium; temperaturam referre per varias anni partes, juxta latitudinem et altitudinem aliquarum stationum, ac ipsarum pluviales dies, nec non pluviae annuam quantitatem; deinde altitudinem locorum ubi species lichenosae proveniunt.

TABELLA PRIMA

Insularum nomina	Latitudo Septentrionalis	Longitudo Australis Meridiani Parisiensis	Observatio
Sicilia	36° 37'—38° 17'	10° 5'—13° 20'	Formam triangula- rem habet Sicilia: ambitum 2449074 42 pedum parisi- ensium; superfa- ciem quadratam 26057763 4794, 12 p. p.
Pantellaria	35° 45'—36° —	9° 55'—10° 17'	
Favignana	35° 50'— — —	9° 55'— —	
Marettimo	38° — — —	12° 42'— —	
Alicuri e Fi- licuri	38° 55'— —	12° 32'— —	
Lampedusa	35° 32'— —	12° 36'— —	
Ustica	38° 45'— —	12° 40'— —	
Salina	38° 37'— —	12° 31'— —	

TABELLA SECUNDA

Locorum Nomina	Altitudo	Latitudo	THERMOGRAPHIA						Diff. h. et z.
			Anni	Hiemis	Vere	Aestatis	Autumni		
Calania	60 ^p	37° 4'	19° 0	11,5	17,2	26,6	20,8	15,4	
Nicolosi	2175 ^p	37° 5'	18° 01	10,7	16,6	25,9	18,7	15,2	
Casa inglese so- pra l'Etna	9202 ^p	37° 6'	-1° 30'	-3,30	-2,7	+6,6	-0,6	15,2	
Messina	0 ^p	38° 1'	18° 26	13,0	16,1	23,4	20,3	10,4	
Palermo	229 ^p	38° 1'	17° 30	11,4	15,0	23,6	19,1	12,2	

	HYETOGRAPHIA					Pluviae quantitatem		
	Dies Pluviales	Anni	Hiemis	Vere	Aestatis	Autumni	Diff. h. et z.	Per totum annum
Catania	.59	.21	.14	.5	.19	.47	21 poll. 42 lin.	
Nicolosi	.100	.41	.29	.03	.27	.38	24 poll. 40 lin.	
Casa inglese so- pra l'Etna	--	--	--	--	--	--	--	
Messina	.100	.51	.26	.06	.17	.45	--	
Palermo	.100	.37	.22	.06	.35	.32	21 poll. 44 lin.	

Ex his colligitur, pluviam aestivalem Siciliae esse 0, 3=0, 06. Linacee isothermicae tres Siciliam habere; scilicet 17° C. 18° C. 19° C. quae transiunt per grados 40°, 38°, 37°, latitudinis septentrionalis.

Pedes parisienses 520 altitudinis verticalis ad gradum 1° C. in thermometro centesimali respondere.

TABELLA TERTIA

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Cima dell' Etna	10300		Vegetatio nulla
Piede del Cono del- l' Etna	9160		Vegetatio nulla
Casa inglese sopra l' Etna	9129		Vegetatio nulla
Torre del Filesofo	8885		Vegetatio nulla
ivi			
Cima della Valle del Bove ivi	8808		Vegetatio nulla
Limite della vege- tazione ivi	8628		<i>Anthemis aelnen- sis. Scleranthus marginalus. Se- necio aelensis.</i> ec. ec. ec.
Limite superiore del l' <i>Astragalus si- culus</i> ivi	7429	<i>Lecidea Tiae</i> <i>Stereocaulon Vesuvianum</i> <i>Cladonia Aetnensis</i>	
Limite superiore del <i>Berberis vulgaris</i> e <i>Juniperus hemi- sphaerica</i> ivi	7110	<i>Stereocaulon Vesuvianum</i> <i>Cladonia Aetnensis</i> <i>Parmelia parietina</i> var. <i>b</i> foliosa <i>Parmelia ciliaris</i> var. <i>c</i> sub- crustacea <i>Usnea florida</i> <i>Ramalina cadiicaris</i> var. <i>b</i> fastigiala var. <i>c</i> canaliculata var. <i>d</i> thrausta	

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Monte Collesano nel- la catena delle Ma- donie	6000	Usnea florida Ramalina calicaris var. b fastigiata var. c canaliculata var. d thrausta Parmelia ciliaris	Altitudo maxima Nembrodum(Ma- donie) Pizzo del- l'antenna habet, 6200 p. p. ad 37° 8 lat. 11° 7 long. merid. paris. <i>Fraxinus</i> <i>ornus</i> . <i>Fraxinus</i> <i>excelsior</i> . <i>Fra-</i> <i>xinus rostrata</i> , ad hanc maxi- mam altitudinem pertingunt.
Pizzo di Palermo nella catena del- le Madonie	5936	Parmelia parietina var. b foliosa var. c subcrustacea Parmelia tiliacea Parmelia perlata Parmelia ciliaris Umbilicaria polyyrhizos Ramalina calicaris var. b fastigiata var. c canaliculata var. d thrausta	
Limite superiore de- gli alberi sull'Etna, ossia del <i>Pinus</i> <i>laricio</i> . <i>Quercus</i> <i>ilex</i> . <i>Quercus ap-</i> <i>pennina</i> .	5892	Cladonia macilenta Cladonia furcata Usnea florida Parmelia tiliacea Parmelia caperata Parmelia olivacea Parmelia acetabulum Gasparrinia pallescens var. b parella Ramalina calicaris var. b fastigiata var. c canaliculata var. d thrausta	<i>Pinus laricio</i> a 4000 p. p. per- tingit usque ad 6000 p. p.

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Limite superiore del- la <i>Pteris aquilina</i> sull' Etna	5619	<i>Parmelia parietina</i> var. <i>b</i> foliosa var. <i>subcrustacea</i> <i>Peltigera polydactyla</i> <i>Stereocaulon Vesuvianum</i>	
Cozzo di Mofera, nel- la catena delle Ma- donie	5516	<i>Parmelia parietina</i> var. <i>b</i> foliosa var. <i>c</i> <i>subcrustacea</i> <i>Parmelia acetabulum</i> <i>Cetraria tristis</i>	
Limite superiore del- la regione nemoro- sa più densa sul- l' Etna	5470	<i>Lecidea vesicularis</i> <i>Parmelia acetabulum</i> <i>Parmelia stellaris</i> var. <i>b</i> <i>hispida</i> <i>Tenorella surfuracea</i>	<i>Fagus sylvatica.</i> <i>Pinus laricio.</i> <i>Quercus appen- nina.</i> <i>Quercus ilex</i> , constituunt nemora Aetnea.
Giannicola, limite superiore del <i>Po- pulus tremula</i> sul- l' Etna	5292	<i>Stereocaulon Vesuvianum</i> <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>b</i> <i>fastigiata</i> var. <i>c</i> <i>canaliculata</i> var. <i>d</i> <i>thrausta</i> <i>Parmelia parietina</i> var. <i>b</i> <i>foliosa</i> var. <i>c</i> <i>subcrustacea</i> <i>Gasparrinia murorum</i>	
Grotta delle capre sull' Etna	5107	<i>Gasparrinia lentigera</i> <i>Gasparrinia murorum</i> var. <i>b</i> <i>callopisma</i> var. <i>c</i> <i>chlorina</i> <i>Gasparrinia varia</i>	*

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Busambra nella ca- tena delle Madonie	4839	Endocarpon miniatum Peltigera polydactyla	
Valle del Trifogliet- to, limite superio- re dell' <i>Ilex aqui-</i> <i>folium</i> e della <i>Be-</i> <i>tula alba</i> sull' Etna	4761	Stereocaulon Vesuvianum Ramatina calicaris var. b fastigiata var. c capillulata var. d thrausta Peltigera canina Peltigera polydactyla Sticta pulmonacea Parmelia parietina Gasparrinia murorum	
Pineta piccola o <i>Pi-</i> <i>nus millella</i> , nel suo li- mite superiore sul- l' Etna	4734	Gasparrinia sophodes var. b melanochlora Parmelia caperata Parmelia ciliaris Ramatina calicaris var. b fastigiata var. c capillulata var. d thrausta Usnea florida Cladonia fuscata Evernia jubata Tenorella surfuracea	Arbor obvia est ibi <i>Pinus laricio</i>
Limite superiore de- gli alberi nel pen- dio Nord delle Con- caze sull' Etna	4586	Evernia jubata Cladonia macilenta Usnea florida Parmelia olivacea Gussonea ventosa	

Locorum Nomina	Altitudo per pedes parisienses	Nomina Generica et Specifica lichenum	Observatio
Piede del Cozzo di Mofera, nella catena delle Madonie	4411	<i>Parmelia tiliacea</i> <i>Parmelia ciliaris</i> <i>Cetraria islandica</i> <i>Umbilicaria polyrrhizos</i>	
Limite inferiore del <i>Pinus laricio</i> nella valle del Bove sull'Etna, e limite superiore dell' <i>Acer pseudoplatanus</i>	4087	<i>Evernia jubata</i> <i>Tenorella furfuracea</i> <i>Usnea florida</i> <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>b</i> fastigiata var. <i>c</i> canaliculata var. <i>d</i> thrausta	Altitudo maxima hujus vallis <i>Valle del Bove</i> est 8808 p. p.
Arcimusco, nella catena Peloritana	3851	<i>Parmelia tiliacea</i>	
Monte S. Diano nella catena delle Madonie	3639	<i>Cetraria aculeata</i> <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>b</i> fastigiata var. <i>c</i> canaliculata var. <i>d</i> thrausta <i>Cladonia furcata</i> var. <i>b</i> subulata <i>Tenorella villosa</i>	
Petralia Soprana nella catena delle Madonie	3631	<i>Ramalina calicaris</i> var. <i>b</i> fastigiata var. <i>c</i> canaliculata var. <i>d</i> thrausta	Altitudo maxima habitationum Siciliae haec, et subsequens.

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Geraci, nella catena delle Madonie	3616	<i>Parmelia parietina</i> et varietates <i>Gasparrinia murorum</i> <i>Ramalina calicaris</i> et varietates <i>Cladonia pyxidata</i> <i>Tenorea villosa</i>	
Strada che passa per M. Castelli tra Mi- stretta e Nicosia, nella catena delle Madonie e Caronie	3502	<i>Cetraria aculeata</i> <i>Cladonia furcata</i> var. <i>b</i> subulata	
Monte Granza, nella catena delle Mado- nie	3427	<i>Usnea barbata</i>	
Santo Mauro, nella catena delle Mado- nie	3400	<i>Tenorea villosa</i> <i>Parmelia perlata</i> <i>Parmelia parietina</i> var. <i>b</i> foliosa var. <i>c</i> subcrustacea <i>Gasparrioia murorum</i>	
Monte Bomiso, nel- la catena delle Ma- donie	3364	<i>Parmelia tiliacea</i> <i>Ramalina calicaris</i>	

Locorum Nomina	Altitudo per pedes parisienses	Nomina Generica et Specifica lichenum	Observatio
Monte Samperi, nella catena delle Madonie	3355	Ramalina calicaris var. <i>b</i> fastigiata var. <i>c</i> canaliculata var. <i>d</i> thrausta Peltigera polydactyla Parmelia ciliaris	
Rinazzi di Nicolosi, sopra l'Etna	3338	Lecidea Tinei Lecidea confluens Gussonea cinerea var. <i>b</i> aquatica var. <i>c</i> alpina Gasparrinia varia var. <i>b</i> saepincola Gasparrinia pallescens var. <i>b</i> parella Gasparrinia verrucosa Peltigera polydactyla	
Caltauturo, nella catena delle Madonie	3328	Peltigera polydactyla	
Malello sopra l'Etna	3285	Tenorea villosa Tenorea furfuracea Cladonia Aetnensis Ramalina calicaris var. <i>b</i> fastigiata var. <i>c</i> canaliculata var. <i>d</i> thrausta Parmelia stellaris var. <i>b</i> hispida Parmelia acelabulum Parmelia olivacea Parmelia tiliacea	Altitudo maxima habitationum Aetnensis.

Locum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Monte Cuccio, nella catena delle Madonie	3257	<i>Dermelia tiliacea</i>	
Milo sopra l' Etna	3000?	<i>Parmelia stellaris</i> var. <i>b hispida</i> <i>Garparrinia murorum</i> var. <i>b callipismata</i> var. <i>c chlorina</i> <i>Collema nigrescens</i>	<i>Olea europea.</i> <i>O-</i> <i>puntia ficus-in-</i> <i>dica.</i> <i>Opunliq</i> <i>amyclea.</i> <i>Morus</i> <i>nigra</i> ad hanc maximam altitu- dinem 3000 p.p. perlingunt.
Monte Scuderi, nella catena Peloritana	2994	<i>Umbilicaria pustulata</i> <i>Gasparrinia saxicola</i> var. <i>b versicolor</i> <i>Parmelia tiliacea</i> <i>Cetraria aculeata</i> <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>d thrausta</i>	Juxta Schouw Cli- mat de l' Italie 3860 p.p. habet. Haec est altitudo maxima montium Peloritanorum. Noata 2940? p.p. est maxima alti- tudo habitatio- num montium Pe- loritanorum.
Valle di Catanna, sull' Etna	2972	<i>Peltigera polydactyla</i> <i>Collema nigrescens</i>	
Monte Dinnamare, nella catena Pelo- ritana	2920	<i>Cetraria aculeata</i> <i>Collema nigrescens</i> <i>Gasparrinia murorum</i>	

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Mandanici nella ca- tena Peloritana	2900?	<i>Tenorea furfuracea</i> <i>Cladonia pyxidata</i> <i>Ramalina calicaris</i> <i>var. d thrausta</i> <i>Parmelia caperata</i> <i>Parmelia parietina</i> <i>et varietates</i> <i>Gasparrinia saxicola</i> <i>var. b versicolor</i> <i>Gasparrinia coarctata</i> <i>et varietates</i> <i>Gussonea cinerea</i> <i>et varietates</i> <i>Lecidea confluens</i> <i>Lecidea albo-alta</i> <i>var. b saxicola</i> <i>Lecidea geographicia</i> <i>Collema nigrescens</i>	Mandanici per xxiv millia pass.a Mes- sana distat ; et huic prope est locum dictum <i>Fos-</i> <i>se di Carnevale</i> , ubi etiam lichenes inveni.
Misirletta, nella catena delle Madonie	2828	<i>Cetraria aculeata</i> <i>Gasparrinia murorum</i> <i>Gasparrinia coarctata</i> <i>et varietates</i>	
Polizzi, nella catena delle Madonie	2627	<i>Peltigera polydactyla</i> <i>Ramalina calicaris</i> <i>et varietates</i>	
Bronte, sopra l'Etna; limite del <i>Cupressus semper-virens</i> : culto	2549	<i>Umbilicaria pustulata</i> <i>Parmelia tiliacea</i> <i>Parmelia olivacea</i> <i>Parmelia stellaris</i> <i>var. b hispida</i> <i>Sticta pulmonacea</i> <i>Cetraria aculeata</i> <i>Cladonia Aetnensis</i>	<i>Cupressus semper-</i> <i>virens</i> a Catana <i>o p. ad 2549 p.</i> <i>p. altitudinis per-</i> <i>tingit.</i>

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Randazzo , sopra l' Etna	2545	Tenoreo furfuracea Parmelia stellaris Gasparrinia lentigera Gussonea cinerea var. c alpina	
Monte Santo Calo- gero, nella catena delle Madonie	2507	Cetraria tristis	
Castagno di cento- cavalli, sopra l'Et- na ; varie altezze del suo bosco	2500 2200 2146	Gussonea ventosa Parmelia caperata Sticta pulmonacea Peltigera canina Ramatina calicaris et varietates	
Filicuri, massima al- tezza dell' isola	2497	Gasparrinia pallescens var. b parella Cetraria saepincola Ramatina calicaris var. b fastigiata var. c canaliculata var. d thrausta Cladonia pyxidata Cladonia gracilis	
Pantellaria , cima dell' isola	2480	Collema vespertilio Tenorea villosa Cladonia furcata var. b subulata Peltigera canina Roceella tinctoria Roccella fuciformis Sticta pulmonacea	

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- rienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Monte Caputo, nella catena delle Madonie	2401	<i>Cladonia furcata</i> <i>Cladonia rhangiferina</i> var. <i>b sylvatica</i> <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>d thrausta</i> <i>Usnea florida</i>	
Pollina, nella cate- na delle Madonie	2383	<i>Tenorella villosa</i> <i>Parmelia perlata</i> <i>Parmelia parietina</i> et varietates	
Valle di Troina, tra S. Filippo e Troi- na, nella catena delle Caronie	2358	<i>Peltigera polydactyla</i>	
Santo Nicola, sopra l'Etna, limite su- periore del <i>Pinus</i> <i>pinea</i> , culto.	2298	<i>Cladonia pyxidata</i> <i>Ramalina calicaris</i> et varietates <i>Peltigera canina</i> <i>Parmelia tiliacea</i> <i>Gasparrinia mororum</i> et varietates <i>Gasparrinia coarctata</i> var. <i>b ornata</i> var. <i>c mycrophillina</i> var. <i>d trapelia</i> var. <i>e granulosa</i> var. <i>f tenuissima</i> var. <i>g soluta</i> <i>Gussonea ventosa</i> <i>Gussonea verrucosa</i> <i>Lecidea confusa</i> <i>Lecidea vesicularis</i> <i>Collema nigrescens</i>	<i>Pinus pinea</i> a p. ad altitudinem 2400 p. p. per- tingit.

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Castelbuono , nella catena delle Madonie	1300	<i>Lecidea vesicularis</i> <i>Gussonea verrucosa</i> <i>Gasparrinia lentigera</i> <i>Gasparrinia saxicola</i> <i>Gasparrinia murorum</i> et varietates <i>Gasparrinia erythrocarpia</i> <i>Cladonia rhangiferina</i> <i>Cladonia cornuta</i> <i>Cladonia endiviaefolia</i> <i>Cladonia pyxidata</i> <i>Cladonia gracilis</i> var. <i>b</i> <i>hybrida</i> <i>Cladonia macilenta</i> <i>Ramalina calicaris</i> et varietates <i>Pelligera canina</i> <i>Parmelia stellaris</i> <i>Parmelia tiliacea</i> <i>Parmelia parietina</i>	
Alicuri , punta dell' Alice	1256	<i>Tenorella villosa</i>	
Favignana, castello dell' isola	1172	<i>Roccella fuciformis</i>	
Bongiardo , sopra l' Etna	1094	<i>Endocarpon miniatum</i> var. <i>b</i> <i>complicatum</i> <i>Lecidea confusa</i> <i>Lecidea vesicularis</i> <i>Gussonea verrucosa</i> <i>Gussonea ventosa</i> <i>Gasparrinia lentigera</i> <i>Gasparrinia ferruginea</i> var. <i>b</i> <i>festiva</i>	

Locorum Nomina	Altitudo per pedes parisienses	Nomina Generica et Specifica lichenum	Observatio
Bongiardo , sopra l'Etna.	1094	<i>Gasparrinia vitellina</i> <i>Parmelia stellaris</i> var. <i>b</i> <i>bispida</i> <i>Peltigera polydactyla</i> <i>Peltigera canina</i> <i>Cladonia pyxidata</i> <i>Cladonia gracilis</i> <i>Cladonia degenerans</i> <i>Cladonia cornuta</i>	
Monte Albano, nella catena delle Madonie	996	<i>Parmelia tiliacea</i>	
Pantelleria, chiesa della Sibba	965	<i>Roccella fuciformis</i>	
Ustica, massima altezza dell' isola	964	<i>Parmelia parietina</i> var. <i>b</i> <i>foliosa</i> var. <i>c</i> <i>subcrustacea</i>	
Motta Santa Anastasia, sopra l'Etna	813	<i>Gasparrinia lentigerz</i> <i>Gasparrinia murorum</i>	
Pantelleria, castello S. Elmo	674	<i>Cladonia Aetnensis</i> <i>Cladonia furcata</i> var. <i>b</i> <i>subulata</i> <i>Tenorea villosa</i>	
Misterbianco, sopra l'Etna	641	<i>Gasparrinia lentigera</i> <i>Stereocaulon Vesuvianum</i> <i>Cladonia Aetnensis</i> <i>Parmelia parietina</i> et varietates <i>Gussonea verrucosa</i>	17

Locorum Nomina	Altitudo per pe- des pa- risienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Paternò, sopra l'Etna	620	<i>Endocarpon Maravignae</i> <i>Gussonea chlorophana</i> <i>Gussonea cinerea</i> <i>Gasparrinia lentigera</i> <i>Gasparrinia coarctata</i> var. <i>b</i> ornata var. <i>c</i> mycrophillina var. <i>d</i> trapelia var. <i>e</i> granulosa var. <i>f</i> tenuissima var. <i>g</i> soluta <i>Gasparrinia murorum</i> et varietates <i>Parmelia olivacea</i> <i>Parmelia stellaris</i> var. <i>b</i> hispida	
Ustica, castello Falconera	584	<i>Parmelia ciliaris</i>	
Ustica, Monte Cavalleri	576	<i>Tenorella villosa</i> <i>Cladonia furcata</i> var. <i>b</i> subulata <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>b</i> fastigiata	
Aci-Reale, sopra l'Etna	570	<i>Stereocaulon Vesuvianum</i> <i>Cladonia macilenta</i> <i>Cladonia Aetnensis</i> <i>Parmelia stellaris</i> <i>Gasparrinia lentigera</i>	

Locorum Nomina	Altitudo per per- des pa- rienses	Nomina Generica et Spe- cifica lichenum	Observatio
Lampedusa, massi- ma altezza dell'iso- la	318	<i>Roccella fuciformis</i> <i>Ramalina caticaris</i> var. <i>c canaliculata</i> var. <i>d thrausta</i> <i>Usnea plicata</i> <i>Tenorea villosa</i>	
Giarre, sopra l' Et- na	204	<i>Cladonia degenerans</i>	
Catania, base del- l'Etna	1—200	<i>Endocarpon miniatum</i> var. <i>b Aetneum</i> <i>Collema nigrescens</i> <i>Lecidea confluens</i> <i>Gussonea chlorophana</i> <i>Gussonea verrucosa</i> <i>Gasparrinia lentigera</i> <i>Gasparrinia coarctata</i> et varietates <i>Gasparrinia murorum</i> et varietates <i>Gasparrinia erythrocarpia</i> <i>Parmelia parietina</i> et varietates <i>Parmelia caperata</i> <i>Cladonia pyxidata</i> <i>Cladonia macilenta</i> <i>Cladonia gracilis</i> <i>Cladonia cornuta</i> <i>Cladonia Aetnensis</i> <i>Stereocaulon Vesuvianum</i>	

Locorum Nomina	Altitudo per pedes parisienses	Nomina Generica et Specifica lichenum	Observatio
Siracusa, base della catena Iblea	1—200	<i>Gasparrinia murorum</i> <i>Gasparrinia erythrocarpia</i> <i>Parmelia parietina</i> <i>et varietates</i> <i>Roccella fuciformis</i> <i>Collema nigrescens</i>	
Palermo, Ficuzza, nella base delle Madonie	1—200	<i>Collema nigrescens</i> <i>Gussonea cinerea</i> <i>et varietates</i> <i>Gasparrinia coarctata</i> <i>et varietates</i> <i>Gasparrinia murorum</i> <i>et varietates</i> <i>Parmelia parietina</i> <i>et varietates</i> <i>Parmelia caperata</i> <i>Cladonia pyxidata</i> <i>Cladonia gracilis</i> <i>Cladonia uncialis?</i> <i>Cladonia alcicornis?</i>	

NOTANDA

Altitudines locorum ex operibus infra notatis acceptimus; aliae vero multae desiderantur ubi species collectae fuerunt. Hinc omisimus referre Lichenes locorum quorum altitudines ignoramus.

* Saggio di Geografia Botanica per la Sicilia del P. D. Francesco Tornabene Benedettino - Cassinese Professore di Botanica nella R. Università degli Studii in Catania — Estratto dagli atti della vii adunanza degli Scienziali italiani in Napoli — Napoli Stamperia e Cartiere del Fibreno 1836 in foglio.

* Notizia d' una Carta Topografico-Botanica per la Sicilia del Socio-Attivo P. D. Francesco Tornabene Casinese, Professore di Botanica nella R. Università degli Studii di Catania — Estratta dal vol. III Ser. II degli Atti dell' Accademia Gioenia — Catania dai tipi dell' Accademia Gioenia presso F. Sciuto 1847 — in 4.^o

* Archiv fur Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. Herausgegeben von Dr C. J. B. Karsten und Dr H. V. Dechen-Dreizehnter Band. Berlin 1839 G. Reimer, in 8.^o Geognostische Neobachtungen von Friedrich Hoffmann I Abtheilung. Nach Den Beobachtungen vor Fr. Hoffmann II Abtheilung. Mit einer goegnostenischen Karte von Sicilien.

* Ueber die Vegetation am Aetna, von Dr R. A. Philippi mit einer Tafel ; in Linnea von D. F. L. v. Schlechtendal Bd. 7 Jahrg. 1832 S. 727—764.

* Ueber die Flora Siciliens im Vergleich zu Den Floren anderer Lander in Wiegmanns Archiv. fur Naturgesch. II Jahrg. I S. 237 bis 368.

* Tableau du climat et de la vegetation de l'Italie par J. F. Schouw vol. I avec un atlas de 5 cartes. Copenhaguae 1839 in 4.^o

* Saggio di Storia-Fisica di Catania del Prof. Carlo Gemmellaro, Atti dell' Acc. Gioenia ser. II T. 5 pag. 94, Catania 1848.



LICHENUM SICILIENSIMUM AC INSULARUM ADIACENTIUM
HUCUSQUE DESCRIPTORUM GENERA JUXTA METHODUM
NATURALE FRAN. TORNABENE EXPONIT.

Classum Ordinum et Generum Characteres

Classis I. Lichenes thallo frondoso aut crustaceo orbiculato, horizontaliter extenso, apotheciis sessilibus.

Ordo I. UMBILICARIAE. Thallus frondosus, prostratus; hypothallus nudus aut fibrillosus, puncto centrali arcte saxo aut ligno adnatus, supra umbilicatus. Apothecia excipulo proprio donata atro, orbiculata. Discus gyrose plicatus.

Genus I. UMBILICARIA. « Thallus coriaceus aut cartilagineus umbilicato-affixus peltatus, junior monophyllus, adultior lobatus ac compositus, horizontalis. Apothecia primitus clausa, mox aperta, orbiculata, atra, liberae. Discus rimosus, aut saepius in gyros lirellasque dehiscentes abiens.

Species habet 2.

Varietates 0.

Ordo II. ENDOCARPEAE. Thallus frondosus, lateraliter, saxo adnatus hypothallus nudus. Apothecia intra thallum innata; pagina hypothallina protuberantia. Discus gelatinosus, carneo-ruber, tandem aterrimus.

Genus II. ENDOCARPO. « Thallus cartilagineus aut subcoriaceus; subpeltatus, per pedicellum saxo lateraliter adfixus. Apothecia thallo inclusa, globosa; excipulo simplici membranaceo, ostiolo indurato tandem elongato in pagina hypothallina, protuberante. Discus gelatinosus carneo-ruber, tandem ater.

Species habet 2.

Varietates 2.

Ordo III. COLLEMACEAE. Thallus foliaceus subcontianus gelatinosus crispus, intus albus; hypothallus fibrillosus, fibrillis saxo vel cortice affixis. Apothecia subsessilia, scutellata, marginata, nucleo albido. Discus coloratus.

Genus III. Collema. Thallus foliaceus subcontinuus gelatinosus, forma varius, eripus, intus albus. Apothecia solitaria, scutellata, thallode emergentia, excipulo nigro, subpapilloso, nucleo albido.

Species habet 2.

Varietates 0.

Ordo IV. LECIDINAE. Thallus crustaceus, aut squamulosus, aut tartareus. Apothecia excipulo proprio donata, marginata, scutelliformia aut hemisphaerica solida. Discus concavus, aut planus, solidus.

Genus IV. Incia. « Thallus crustaceus, horizontalis, macularis, saepe obliteratus. Apothecia hemisphaerica, excipulo proprio carbonaceo aterrito primitus marginata, deinceps scutelliformia aut hemisphaerica solida. Discus apertus, primo punctiformis, impressus, saepius corneus et strato carbonaceo impositus.

Species habet 5.

Varietates 2.

Genus V. Gossypina. Thallus horizontaliter expansus, irregulariter extensus, hypothallo siccus, crustaceus, granulosus, verrucosus. Apothecia thallode immersa, aut subinuata, disco marginato, margine thallode aequali.

Species habet 4.

Varietates 2.

Genus VI. Gossypina. Thallus crustaceus verrucosus vel squamulosus, squamis effiguratis, cartilagineis, membranaceis, ambitu lobatus, hypothallus albus fuscus aut niger. Apothecia regularia sessilia, aut parum elevata scutellata, nunc marginie proprio evanescente instructa, et margine accessorio thallode conformi; nunc solo margine accessorio donata persistente; lamina disci planiuscula quandoque caesia-pruina.

Sectio I. Squamosae

Thallus squamosus squamis imbricatis, membranaceis vel cartilagineis; virescenti-glaucus, albescens; ambitu lobatus, lobis crenatis; hypothallus albus. Apothecia elevata; discus nudus; mango thallodis passim disci colorem induit.

Species habet 6.

Varietates 9.

Sectio II. Leprosae

« *Thallus tartareus*, granulosus, leprosus inaequaliter extensus. Apothecia innato-elevata, et margine nunc thallode conformi instructa; nunc etiam margine proprio donata, et accessorio cingente discum.

Species habet 4.

Varietales 3.

Classis II. Lichenes thallo frondoso-foliaceo, horizontaliter extenso ac suberecto; apotheciis scutellatis, et pedicellatis: aut peltiformibus et terminalibus.

Ordo V. PARMELIACEAE. *Thallus frondoso-foliaceus laciniatus, prostratus sed adscendens, sublus varius.* Apothecia scutellata, excipulo thallodeo, normaliter centro adfixo. Discus planus colore varius.

Genus VII. PARMELIA. « *Thallus foliaceus, imbricatus, e centro horizontaliter expansus, forma et colore varius, foliolis sinuatis, crenatis, hypothallo sussultus fibrillosus.* Apothecia scutellata, elevata, plus minus pedicellata, disco vario, strato thallode conformi imposito.

Species habet 1.

Varietales 1.

Genus VIII. STRICTA. « *Thallus foliaceus membranaceus expansus e centro dilatatus, subtus villosus vel fibrillosus, cyphellis vel maculis discoloribus variegatus.* Apothecia scutelliformia, margine aut centro thalli adnata, subtus libera. Discus sub strato gonimo oriens, dein elevatus, nudus, strato medullari impositus.

Species habet 1.

Varietales 0.

Genus IX. PELTIGERA. « *Thallus centrifugo-expansus coriaceus, frondosus, lobis terminalibus elevatis productis apothecialis; hypothallus venosus aut fibrillosus.* Apothecia peltaeformia, thalli lobis marginalibus saepe antice innata; at postice sita tunc thalli lobis adnata. Discus primitus clausus inferus, seu velo thallodeo fugaci oblectus.

Species habet 2.

Varietales 0.

Classis III. Lichenes thallo frondoso, aut fruticuloso, erecto, vel pendulo undique concolore; apotheciis scutellatis, nunc terminalibus nunc lateralibus.

Ordo VI. CETRARIACEI. Thallus frondosus vel subfistulosus adscendens vel erectus, hypothallo reticulato-lacunosus vel filamentosus. Apothecia thallodea adnata scutellata. Discus planus coloratus.

Genus X. CETRARIA. « Thallus cartilagineus aut membranaceus, frondosus vel subfistulosus, adscendens: fertilis semper suberectus, lobis frondosis vel teretiusculis, levibus aut scabris. Hypothallus albidus reticulato-lacunosus. Apothecia scutellata peltata, thalli lobulis oblique aut apice adnata, excipulum proprium nullum. Discus tenuis, apertus, strato medullari impositus.

Species habet 3.

Varietates 0.

Genus XI. ROCELLA. « Thallus cartilagineo-coriaceus tereticompressus, aequabilis erectus, dein pendulus, ramosus, seu linear-i-laci-niatus, longus, strato corticali seu crista caesia conspersus, hypothallus filamentosus. Apothecia primum ornata et marginata, saepe lateralia. Discus aterrimus strato thallideo prium velatus, dein denudatus, pruina fere calcarea aspersus.

Species habet 2.

Varietates 0.

Ordo VII. RAMALINEAE. Thallus foliaceus lobatus, laci-niatus, undique similaris aut hypothallo discolori. Apothecia orbiculata, scutelliformia pedicellata. Discus coloratus strato medullari impositus.

Genus XII. RAMALINA. « Thallus cartilagineus foliaceus primitus erectus undique similaris et concolor, extensus aut linearis, lobatus aut laci-niatus, lacunosus, aetate pendulus, et filamentosus. Apothecia orbiculata scutellata, subpedicellata, thallode marginata, utrinque per thallodem sparsa; disco thallode subconcolori aut corneo-pallido.

Species habet 1.

Varietates 3.

Genus XIII. TENOREA. « Thallus subfoliaceus lobatus, lobis inaequalibus, compressis; hypothallus canaliculatus, varicoloratus. Apothecia lateralia, scutelliformia pedicellata.

Discus connivens strato medullari impositus, coloratus.

Species habet 2.

Varietates 0.

Classis IV. Lichenes thallo fruticuloso elongato erecto vel pendulo, intus filamentoso, aut cavo, (podecium) : una cum thallo mycrophyllino squamigero et crustaceo ; apotheciis discoideis peltatis ; aut turbinatis et sphaericis dein scyphiformibus.

Ordo VIII. USNEACEAE. Thallus filamentosus erectus vel pendulus, filis nunc compressis, et strato corticali cartilagineo obductus ; nunc teres et strato corticali crustaceo facile annulatim rumpente obductus. Apothecia pedicellata orbiculata peltata, excipulum thallodeum. Discus coloratus.

Genus XIV. EVERNIA « Thallus teres, aut leviter compressus, fruticulosus, undique similaris, nudus, ramosus, sarmen- taceo-pendulus ; hypothallus albus, stuppeus, centro vacuus. Apothecia scutelliformia, thallode marginata, margine demum evanescente, orbiculata. Discus primitus connivens dein apertus, strato medullari impositus.

Species habet 1.

Varietates 0.

Genus XV. USNEA. « Thallus cauliformis filamentosus, primitus erectus, dein pendulus ; filis teretibus, strato corticali crustaceo, facile annulatim rumpente obductis, ac strato medullari filamentoso instructis. Apothecia orbiculata, pelta- ta, terminalia, raro sparsa, excipulo thallodeo suffulta, ac fibrillis thallodeis radiata. Discus apertus, strato medullari impositus, cum thallo subconcolor, vel coloratus.

Species habet 3.

Varietates 0.

Ordo IX. CLADONIACEAE. Thallus crustaceus aut mycrophyllinus, stipites (podelia) agens cavos vel solidos, simplices vel ramosos. Apothecia turbinata sphaerica, stipiti insidentia, excipulo proprio donata. Discus levis, convexus fungiformis.

Genus XVI. CLADONIA. « Thallus horizontalis, squamuloso-foliaceus, vel crustaceo-granulosus ; a quo surgit verticalis, (podelium), caulescens, fistulosus, cartilagineus, subulatus aut turbinato-scyphiferus ; aut pedetium fruticulosum ascy- phiferum definite ramosum. Apothecia discreta, podelii innata, e peculiari excipulo prodientia primitus scyphulifor-

mia, marginata, dein inflata cephaloidea, fungosa, immarginata. Discus primo apertus, mox protuberans, reflexus, excipulum proprium abscondens.

Sectio I. Scyphiferae

« *Thallus horizontalis mycrophyllinum*; podetia normaliter simplicia, vel prolifero-ramosa, scypho terminata, diafragmate clausa; cartilagineo-corticalia glabra vel furfuracea.

Species habet 7.

Varietales 1.

Sectio II. Ascypiferae

« *Thallus horizontalis crustaceo-granulosus*, granulis in podetia abeuntibus. Podetia uniformia, fruticulosa, ascypha, definite ramosa, quandoque thallode squamuloso sparsa.

Species habet 11.

Varietales 3.

Genus XVII. STENOCAULON. « *Thallus horizontalis*, granulosus tariareus, evanescens, slipites (poretia) solidos, caulescentes, erectos, verticales, intus filamentosos, extus crustaceos agens, thallodem squamulosum granulosum suffulcantes. Apothecia sparsa, subsessilia, primum turbinata, marginata, excipulo proprio thallodeo donata; dein cephaloidea seu globosa immarginata, solida. Discus excipulo proprio impositus, fuscus, aut ater.

Species habet 1.

Varietales 0.

Partes hujus Methodi summatim sumptae.

Classes 4. Ordines 9. Genera 17. Species 67. Varietales 28.

* Species duo incertae.

** Num. Tenoreae est XIII et Everniae XIV, juxta methodum naturale.

*** Lichenes inferioris ordinis alibi descripturi sumus.

**** Lichenes per genera et species in praecedentibus operibus nostris descripti, et in hoc opere nondum memorati delendi sunt.



TABULARUM EXPLICATIO

TABULA I.

A ENDOCARPON MINIATUMVAR. *b* **ÆTNÆUM**

- A** exhibet plantam habitu suo, thallode monophyllo, lobato,
sinuato, viridi-cinereo colorato; apothecia sparsa pun-
ctiformia, nigrescentia, orificiis prominulis nigris.
a particulam plantae lente auctam.
b apothecia fusco-nigra prominula, orificia nigra, lente aucta.
c plantam habitu suo, thallode polyphyllo, lobato, obversa
facie, seu hypothallo, notatam.
d hypothallum fulvo-carneum punctis fuscescentibus, seu apo-
theciis obversa facie thalli prominentibus, sparsum, pe-
diculum hypothalli fulvo-carnei subtripartitum.
-

B ENDOCARPON MARAVIGNAE

- B** exhibet plantas confertas saxo adnatas.
a plantam unam lente auctam, thallode obscure-viridi coloratam.
b apothecia protuberantia fusca, orificio nigro.
cde plantam unam valde auctam, et obverse nolatam.
c thallum revolutum olivaceum, punctis nigris sparsum, seu
apothecia enascentia.
d pedicellum unum subtripartitum.
e hypothallum luteo-fuscum leve, et punctis nigris sparsum,
seu apotheciis obversa facie thalli prominentibus.

TABULA II.

A GUSSONEA CLOROPHANA.

- A** exhibet plantam habitu suo et colore, thallo crustaceo, rimoso, areolato, tessulato, cum apotheciis imperfectis, thallode immersis.
- b** plantam lente valde auctam, cum apotheciis imperfectis, marginatis, margine tumidulo thallodeo; et thallo areolato, rimoso, crustaceo.
- c** plantam habitu et colore proprio, thallo crustaceo, rimoso, areolato subverrucoso, cum apotheciis perfectis, subinnotatis; margine subvanescente; disco convexo, levi.
-

B LECIDEA TINCI.

- B** exhibet plantam habitu suo saxo adherens, hypothallo nigro, distincto, et thallo viridi-luteo; areolis discretis et coailitis; apotheciis solitariis et adpressis, crustae adnatis nigris.
- a** apothecium lente auctum, excipulo carbonaceo, prominulo, disco plano.

C LECIDEA CONFLUENS

- C** exibet plantam habitu suo, crusta rimoso-areolata ; apothecis atris, confluentibus, adpressis, nunc contiguis, nunc subcontiguis.
- a** apothecia alra, e crusta evidenter distincta per areolam ; disco alto, margine planiusculo, et obtusiusculo, centro prominulo-pustulato.
-

D LECIDEA VESICULARIS

- D** exhibet plantam habitu suo, crusta madida bullata plicata, congesta, pruinosa, plicis intricatis, basi radiculosum cum apotheciis nunc solitariis nunc confluentibus.
- a** plantam crusta sicca, plicata, rugosa, pruinosa, inferne radiculosa, cum apotheciis adpressis et solitariis, disco pruinoso.
- bcd** plantam lente valde auctam.
- b** squamam, seu crustam, bullosam et plicatam, lineolatam, lineolis, nigris, aut fuscis.
- dd** pruinam nigram, aut cinereo-caesiam.
- c** apothecium aternum, subpellatum obtuse marginatum, disco convexiusculo.

TABULA III.

A CLADONIA AETNENSIS

- A** exhibet plantam habitu suo, podetii ramosis, ramulis divaricatis, erectis, dichotomis, vel polychotomis, basi dilatatis, squamis thalloideis 3—lobatis, sparsis.
- aa* apothecia fusca terminalia, solitaria aut bifida.
- bbbb* maculas seu verrucas cinereo-virescentias in ramulis lente auctis, albo-cinereis.
- cc* apothecia fusca sphaerica, incrassata et turgida, maculata, umbilicata.
- dd* apothecia perfecta, fusca, levia, fungiformia convexa, bifida.
- ee* apothecia fusca, primaeva, sparsa, aut bifida, sphaeroidica, umbilicata, maculata, lente aucta.
- ff* apothecia fusca lente aucta, trifida, turbinatoformia, umbilicata.

B STEREOCAULON VESUVIANUM

- B** exibet plantam habitu suo podetii ramosis, ramis confertissimis, erectis et divaricatis ; granulis thalloideis

vestitis, nunc globosis, linealis, 3—5—7— sulcatis,
nigro punctatis; nunc apertis et 3—5—7— lobatis,
sinuato-crenatis.

- aa* apothecia inferne sparsa, sursum conferta, libera, et sub-pedicellata, thallode granuloso-calcareo marginata, margine sulcato.
- b* apothecium lente valde auctum, perfectum, subpedicellatum, fuscum, leve, emarginatum, pedicellum et excipulum proprium tomento seu substantia unctuosa sparsum.









INDEX OPERIS

	pag.
Lecturis	2
Lithenes	6
UMBILICARIAE Or. I.	135
1. <i>Umbilicaria</i>	7
» Pustulata	8
» Polyrrhizos	9
ENDOCARPEAE Or. II.	135
2. <i>Endocarpon</i>	10
» Miniatum	10
» var. b <i>Aetneum</i>	11
» var. c <i>Complicatum</i>	11
» Maravignae	12
COLLEMACEAE Or. III.	135
3. <i>Collema</i>	13
» Nigrescens	13
» Vespertilio	14
LECIDIACEAE Or. IV.	136
4. <i>Lecidea</i>	15
» Geographica	16
» var. b <i>Contigua</i>	16
» Tinei	17
» Confluens	18
» Vesicularis	19
» Albatra	20
» var. b <i>Saxicola</i>	21
5. <i>Gussonea</i>	22
» Clorophana	23
» Cinerea	23
» var. b <i>Aquatica</i>	24
» var. c <i>Alpina</i>	24
» Verrucosa	24
» var. b <i>Perlusaria</i>	25

6: Gasparrinia	» Ventosa	pag.	25
	Sec. I SQUAMOSAE		27
	» Lentigera		27
	» Saxicola		28
	» var. b Versicolor		29
	» Coarctata		30
	» var. b Ornata		30
	» var. c Mycrophyllina		31
	» var. d Trapelia		31
	» var. e Granulosa		31
	» var. f Tenuissima		31
	» var. g Soluta		31
	» Murorum		32
	» var. b Gallospuma		33
	» var. c Chlorina		33
	» Varia		33
	» var. b Saepincola		34
	Sec. II LEPROSAE		35
	» Pallescens		36
	» var. b Parella		36
	» Sophodes		37
	» var. b Melanochlora		38
	» Ferruginea		38
	» var. b Festiva		39
	» Vitellina		40
PARMELIACEAE	Or. V.		136
7: Parmelia			41
	Sec. I IMBRICARIAE		42
	» Tiliacea		42
	» Parietina		43
	» var. b Foliosa		45
	» var. c Subcrustacea		45
	» Caperata		47
	» Olivacea		48
	» Acetabulum		50
	» Perlata		51
	Sec. II. PHYSCIAE		52

	151
» Ciliaris	pag. 52
» Stellaris	» 54
» var. b Hispida.	» 56
8. Sticta	» 57
» Pulmonacea	» 58
9. Peltigera	» 61
» Polydactyla	» 62
» Comina	» 43
CETRARIACEAE Or. VI.	» 137
10. Cetraria	» 65
» Tristis	» 66
» Aculeata	» 67
» Saepincola	» 69
11. Roccella	» 70
» Tinctoria	» 70
» Fuciformis	» 72
RAMALINAE Or. VII.	» 137
12. Ramalina	» 73
» Calicaris	» 73
» var. b Fastigiata	» 75
» var. c Canaliculata	» 76
» var. d Thransta	» 76
13. Evernia	» 78
» Jubata	» 78
14. Tenorea	» 80
» Furfuracea	» 80
» Villosa	» 82
USNEACEAE Or. VIII.	» 139
15. Usnea	» 83
» Florida	» 84
» Barbata	» 85
» Plicata	» 87
CLADONIACEAE Or. IX.	» 139
16. Cladonia	» 88
SEC. I SCYPHIFERAE	» 89
» Pyxidata	» 89
» Macilenta	» 91
» Gracilis	» 92

Tav. I.



Arch. Caro inc.


Tav II



A



b



c



D

a



E




a



G



a




b

c

d

Sol. Cryst. dis.

Marcis Sintetizati.



ERRORES

Pag.	3 lin.	22	frigida
—	9	—	spinor
—	17	—	Speeiminibus
—	18	—	Cinerascente
—	26	—	1 crusta
—	26	—	35 Querci
—	27	—	35 thallodi
—	27	—	35 disco
—	41	—	17 fibrillosus
—	45	—	33 concolori
—	51	—	20 profuude
—	61	—	6 hypothallns
—	61	—	22 ver-
—	63	—	Pn-
—	70	—	13 Europeo
—	70	—	22 pruinafere
—	80	—	6 reticulato
—	89	—	3 mycrophyllinuu
—	105	—	18 Cladovia
—	123	—	21 Umbiliceria
—	124	—	4 Tenoreo
—	124	—	29 Roceella
—	128	—	26 var. b
—	131	—	4 Corticatis
—	137	—	24 2
—	137	—	25 1
—	137	—	25 adde

CORRECCIONES

frigidi
opinor
Speciminibus
Cinerascente
crustae
Quercus
thallodeus
disci
fibrilloso
concolora
profunde
hypothallus
ser-
Po-
Europea
pruina fere
reticulato
mycrophyllinus
Cladonia
Umbilicaria
Tenorea
Roccella
var. c
Corticalis
6
2

Sectio II Physciæ

» Thallus foliaceus, adscendens aut prostratus, stellaris; hypothallus fibrilosus aut nudus. Apothecia primo clausa, dein dehiscentia ; disco crassiusculo strato medullari imposito.

Species habet 2.

Varietates 1.

