

BULLETTINO

DELLA

SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

ANNO TREDICESIMO - Quattordicesimo

TIPOGRAFIA CENNINIANA

FIRENZE

Via Ghibellina, 8.

ROMA

Via Torino, 133.

1881-82

ARACNIDI DELLE MADONIE

NOTA

del dott. ELVEZIO CANTONI

ASSISTENTE AL R. MUSEO ZOOLOGICO DI PAVIA

Fino dal 1844 il dott. Francesco Minà Palumbo, in un suo scritto introduttivo a future pubblicazioni sulla Storia Naturale delle Madonie, ricordando i nomi dei diversi scienziati, che fino allora eransi occupati dalla storia naturale della Sicilia, pur convenendo nel molto già fatto, mostrava quanto ancora rimanesse a compiere, per giungere alla compilazione di un'opera, la quale racchiudesse tutte le notizie naturali di cui tanta messe offre quella florida regione. E per conclusione al suo scritto, l'egregio dottore, rivolgendosi agli scienziati siciliani, poneva un augurio, che tutti cooperassero ad illustrare quel monte *si interessante e vasto* dell'isola sicula. Fermo nel suo proposito, il Minà Palumbo, oltre la pubblicazione di importanti lavori, illustrativi di diversi ordini d'animali delle Madonie, s'occupava ancora di raccolte da distribuirsi per studio ai cultori dei diversi rami e della zoologia e delle altre scienze naturali, onde più attendibili riuscissero le varie pubblicazioni. Ed appunto lo scorso anno egli faceva una prima spedizione di Aracnidi delle Madonie all'insigne aracnologo prof. P. Pavesi, il quale, molto cortesemente, affidava a me l'incarico della determinazione delle specie inviate e della compilazione di un elenco di esse, lavoro cui ben volentieri m'accingevo, sicuro del valido aiuto del mio caro Maestro e volonteroso di rendere un contributo alla fauna aracnologica sicula, di cui ben pochi si sono in modo speciale occupati.

Scopo adunque di questa mia pubblicazione si è di dare un elenco delle specie di Aracnidi raccolti sulle Madonie, monti posti, come scrive Minà Palumbo, sulla spiaggia settentrionale della Sicilia, tra il fiume Monalo e l' Imera settentrionale, con Geraci ad oriente, Castelbuono ed Isnello a nord, Gollisano ad ovest, Polizzi al sud.

Le specie da me determinate, distribuite come nell' unito prospetto, ascendono al numero di 72, di cui 36 non trovai indicate come appartenenti alla fauna sicula, ed una, l'*Acantholophus echinatus* (Lucas), mi risulta nuova per la fauna d'Italia.

Nella enumerazione della specie feci seguire a ciascuna il nome del suo Autore, nonchè il suo *habitat* mediterraneo.

PROSPETTO DEGLI ORDINI, FAMIGLIE E GENERI.

Clas. ARACHNOIDEA	sp. 72.
Ord. SCORPIONES	» 1
Fam. PANDINIDAE	» 1
Gen. Euscorpius Th.	» 1
Ord. ARANAE	» 68
Fam. EPEIRIDAE	» 13
Gen. Argiope Sav. et Aud.	» 2
» Epeira Walck.	» 8
» Singa C. L. Koch.	» 1
» Zilla C. L. Koch.	» 1
» Meta C. L. Koch.	» 1
Fam. THERIDIIDAE	» 6
Gen. Linyphia Latr.	» 1
» Theridium Walck.	» 2
» Lithyphantes Th.	» 1
» Lathrodetus Walck.	» 1
» Asagena Sund.	» 1
Fam. SCYTODIDAE	» 1
Gen. Loxosceles Hein. et Lowe	» 1
Fam. UROCTEIDAE	» 1

Gen.	Uroctea Duf.	sp.	1
Fam.	AGALENIDAE	»	8
Gen.	Dictyna Sund.	»	3
»	Amaurobius C. L. Koch.	»	1
»	Tegenaria Latr.	»	1
»	Agalena Walck.	»	1
»	Histopona Th.	»	1
»	Textrix Sund.	»	1
Fam.	DRASSIDAE	»	3
Gen.	Zoropsis Sim..	»	1
»	Chiracanthium C. L. Koch.	»	1
»	Drassus Walck..	»	1
Fam.	DYSDERIDAE	»	2
Gen.	Dysdera Latr.	»	2
Fam.	FILISTATIDAE	»	1
Gen.	Filistata Latr.	»	1
Fam.	THERAPHOSIDAE	»	2
Gen.	Cyrtuchenius Th.	»	1
»	Nemesia Sav. et Aud.	»	1
Fam.	HETEROPODIDAE	»	2
Gen.	Micrommata Latr.	»	1
»	Sparassus Walck.	»	1
Fam.	THOMISIDAE	»	10
Gen.	Artanes Th.	»	1
»	Philodromus Walck.	»	1
»	Thomisus Walck..	»	1
»	Misumena Latr.	»	3
»	Diae Th.	»	1
»	Xysticus C. L. Koch.	»	3
Fam.	LYCOSIDAE	»	6
Gen.	Tarentula Sund.	»	4
»	Trochosa C. L. Koch..	»	1
»	Ocyale Sav. et Aud..	»	1
Fam.	OXYOPIDAE	»	3
Gen.	Oxyopes Latr.	»	3
Fam.	ERESIDAE	»	2
Gen.	Eresus Walck.	»	2
Fam.	ATTIDAE	»	8

Gen.	Heliophanus C. L. Koch.	sp.	3
»	Ballus C. L. Koch.	»	1
»	Menemerus Simon.	»	1
»	Philaeus Th.	»	1
»	Icius Simon.	»	1
»	Attus Walck.	»	1
Ord.	OPILIONES	»	1
Fam.	PHALANGIDAE.	»	1
Gen.	Acantholophus C. L. Koch.	»	1
Ord.	PSEUDOSCORPIONES	»	2
Fam.	OBISIDAE	»	2
Gen.	Obisium Ill.	»	2

Questa raccolta ha un carattere evidentemente meridionale, impressole da molte forme, come *Argiope lobata*, *Loxosceles*, *Uroctea*, *Zoropsis*, *Chiracanthium pelasgicum*, *Misumena Savignyi*, *Tarentula albofasciata*, gli *Eresi*, il *Menemerus semilimbatus*, l'*Attus jucundus*, l'*Icius notabilis*, l'*Acantholophus echinatus*, che riuniscono così la fauna sicula a quella dell'Africa meridionale. Cionullameno l'*Epeira marmorea*, la *ceropégia*, la *diodia*, ecc. indicano che si tratta di una collezione fatta in regione montana, per cui l'altitudine compensa la bassa latitudine, e viene collegata la Sicilia anche alle parti elevate e settentrionali d'Europa. Ciò mostra la necessità di avere collezioni di tutte le zone altimetriche di un paese, perchè riesca più conforme al vero il criterio che si vuol formare sopra la relativa fauna.

1. **Euscorpius carpathicus** (Linn.) 1767. *Syst. nat.*, I. II, p. 1038, n. 2,
sub: *Scorpio*.

var.: **sicanus** (C. L. Koch) 1836. *Arachn.*, III°, p. 108. tav. CVII, fig. 249,
sub: *Scorpius*.

Hab. — Della varietà: Italia continentale, Sicilia, Gorgona. Della specie: Spagna, Francia, Corsica, Turchia, Grecia, Italia continentale, Sardegna, Capraia, Antiparo.

2. **Argiope lobata** (Pall.) 1772. *Spicil. zool.*, I° fasc. 9, p. 46, tav. III,
fig. 14, 15, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Spagna, Portogallo, Italia continentale, Istria, Dal-

mazia, Capraia, Montecristo, Topi, Pianosa, Giglio, Giannutri, Serpentara, Corsica, Sardegna, Caprera, Vacca, Ischia, Capri, Lipari, Sicilia, Linosa. Lampedusa, is. Capo Verde, Canarie, Algeria, Tunisia, Galita, Tripoli, Egitto, Cerigo, Grecia, Santorino, Turchia, Asia minore.

3. **A. Brünnichii** (Scop.) 1772. *Ann. hist. nat.*, V^o, p. 125, sub: *Aranea*.

Hab. — Spagna, Francia, Italia continentale, Istria, Dalmazia, Corsica, Montecristo, Giannutri, Sardegna, Serpentara, Ischia, Capri, Sicilia, Madera, Marocco, Algeria, Egitto, Turchia, Candia, Grecia.

4. **Epeira dromedaria** (Walck.) 1802. *Faune paris.*, II^o, p. 191, sub: *Aranea*.

Hab. — Portogallo, Francia, Italia continentale, Sardegna, Ischia, Capri, Sicilia, Egitto, Turchia, Palestina.

5. **E. marmorea** (Clerck.) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 29, pl. 1, tab. 2, sub: *Araneus*.

var. *pyramidata*.

Hab. — Francia, Italia continentale. Nuova per la Sicilia.

6. **E. cucurbitina** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 44, pl. 2, tab. 4, sub: *Araneus*.

Hab. — Portogallo, Francia, Italia continentale, Istria, Sardegna, Ischia, Capri, Sicilia, Algeria, Palestina.

7. **E. Redii** (Scop.) 1763. *Ent. Carniol.*, p. 394, sub: *Aranea*.

Hab. — Portogallo, Francia, Corsica, Sardegna, Capri, Sicilia, Algeria, Egitto, Turchia, Palestina.

8. **E. ceropégia** (Walck.) 1802. *Faune paris.*, II^o, p. 199, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Italia continentale. Nuova per la Sicilia.

9. **E. adianta** (Walch.) 1802. *Faune paris.*, II^o, p. 199, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Italia continentale, Capraia, Elba, Giglio, Corsica, Sardegna, Caprera, Ischia, Capri, Sicilia, Marocco, Algeria, Grecia, Palestina.

10. **E. acalypha** (Walck.) 1802. *Faune paris.*, II^o, p. 199, sub: *Aranea*.

Hab. — Portogallo, Francia, Italia continentale, Sardegna, Capraia, Elba, Montecristo, Giglio, Ischia, Salina, Madera. Non ancora ricordata di Sicilia.

11. **E. diodia** (Walck.) 1802. *Faune paris.*, II^o, p. 200, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Italia continentale, Ischia, Sardegna. Nuova per la Sicilia.

12. **Singa semiatra**, L. Koch., 1867. *Zur Arachn. — u. Myriapod.* —

Fauna Sud-Europa's (Verhandl. d. k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien, XVII B., s. 860).

Hab. — Italia, Algeria, Egitto ?, Corfù, Grecia, Palestina ?. Nuova per la Sicilia.

13. **Zilla x-notata** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 46, pl. 2, tab. 5, sub: *Araneus*.

Hab. — Francia, Italia continentale, Capri, Capraia, Pianosa, Algeria, Candia. Non ancora riscontrata nella Sicilia.

14. **Meta segmentata** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 45, pl. 2, tab. 6, sub: *Araneus*.

Hab. — Portogallo, Francia, Italia continentale, Ischia, Capri. Non mai trovata nella Sicilia.

15. **Linyphia frutetorum**, C. L. Koch, 1834, in Herr. Schaeff. *Deutschl. Ins.*, 127, 19, 20.

Hab. — Spagna, Francia, Corsica, Italia continentale, Sicilia, Palestina.

16. **Theridium sisypnum** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 54, pl. 3, tab. 5, sub: *Araneus*.

Hab. — Italia continentale, Corsica, Algeria, Grecia. Nuovo per la Sicilia.

17. **Th. pictum** (Walck.) 1802. *Faune paris.*, II^o, p. 207, sub: *Aranea*.

Hab. — Italia continentale, Capri. Nuovo per la Sicilia.

18. **Lithyphantes Paykullianus** (Walck.) 1806-08. *Hist. nat. Aran.*, 4, fig. 4. sub: *Theridion*.

Hab. — Portogallo, Spagna, Italia continentale, Corsica, Caprera, Asinara, Sardegna, St. Antioco, Galita, Algeria, Tunisia, Tripoli, Egitto, Grecia, Turchia, Siria, Penisola Sinaitica, Palestina. Non ancora ricordato della Sicilia.

19. **Lathrodetus tredecim-guttatus** (Rossi) 1790. *Fauna etrus.*, II^o, p. 136, tab. IX, fig. 10, sub: *Aranea*.

Hab. — Spagna, Italia continentale, Corsica, Elba, Sardegna, Capri, Sicilia, Galita, Algeria, Tunisia, Lampedusa, Gerba, Porto Santo, Madera, Canarie, Tripoli, Egitto, Grecia, Palestina, Siria.

20. **Asagena phalerata** (Panz.) 1801. *Fauna Ins. Germ.*, 78, 21, sub: *Phalangium*.

Hab. — Italia continentale, Capri, Algeria. Non per anco ricordata della Sicilia.

21. *Loxosceles erytrocephala* (C. L. Koch) 1839. *Arachn.* V^o, p. 90, tav. CLXVIII, fig. 399-400, sub: *Scytodes*.

Hab. — Italia continentale, Pianosa, Asinara, St. Antioco, Capri, Nisida, Algeria, Tunisia, Seikli, Egitto, Lampedusa, Grecia. Per la prima volta ricordata di Sicilia.

22. *Uroctea Durandii* (Walck.) 1809, in Latr., *Gen. Crust. et Ins.*, IV^o, p. 370, sub: *Clotho*.

Hab. — Portogallo, Spagna, Francia, Dalmazia, Sicilia, Algeria, Egitto, Morea, Corfù, Siria.

23. *Dictyna viridissima* (Walck.) 1802. *Faune par.*, II^o, p. 212, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Corsica, Italia continentale, Capri, Sicilia, Algeria.

24. *D. civica* (Lucas) 1849. *Descr. et fig. d'une nouv. esp. d'Aran. du genre Therid.*, in *Ann. Soc. entom. Franc.*, 2^a ser., VIII^o, p. 181, tav. 6, n. V.

Hab. — Spagna, Francia, Italia continentale, Corsica, Ischia, Capri. Nessuna indicazione per la Sicilia.

25. *D. arundinacea* (Linn.) 1758. *Syst. nat.* ed. 10^a, I^o, p. 620, sub: *Aranea*.

Hab. Spagna, Francia, Corsica, Italia continentale, Sicilia, Palestina.

26. *Amaurobius claustrarius* (Hahn) 1831. *Arachn.*, I^o, p. 114, tav. XXX, fig. 86, sub: *Clubiona*.

Hab. — Francia, Italia continentale. Inedito di Sicilia.

NOTA — Riferisco a questa specie un'esemplare femmina, forse una forma meridionale, che non offre nessuno dei caratteri di colorazione assegnatigli da L. Koch, presentando un addome di uniforme colore bruno oscuro. Inoltre la epigina, conformata anteriormente siccome nella figura data dal Koch (*Die Arachn. — gatt. Amaur., Caelotes u. Cybaeus*, fig. 7), prolunga i margini laterali del claustro, a modo di processi cultriformi, fin dietro le due grandi borse seminali. Gli occhi della linea posteriore sono spaziati come indica L. Koch nell'opera suddetta, e cioè: « die Mittelaugen etwas weiter von den seitlichen, als von einander entfernt », e non come Simon (*Araen. d. Franc.* vol. I^o, p. 223) « les médians un peu plus petits que les latéraux, leur intervalle plus large (non double) que leur diamètre; celui des latéraux un peu moins large que la paire médiane. »

27. *Tegenaria parietina* (Fourcr.) 1785. *Entom. paris.*, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Corsica, Italia continentale, Ischia, Nisida, Capri, Algeria, Galita, Tunisia, Pantelleria, Egitto, Palestina, Santorino, Grecia, Turchia. Nuova per la Sicilia.

28. **Agalena labyrinthica** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 79, pl. 2, tab. 8,
sub: *Araneus*.

Hab. — Francia, Italia continentale, Ischia, Corsica, Sardegna, Sicilia,
Cerigo, Grecia, Milo, Serpho, Antiparo, Asia minore, Marmara, Turchia.

29. **Histopona torpida** (C. L. Koch.) 1841. *Arachn.*, VIII^o, p. 48, tav. CCLXVI,
fig. 625, 626.

Hab. — Italia continentale e Francia. Non venne mai nominata di Sicilia.

30. **Textrix coarctata** (Duf.) 1831. *Deser. et fig. de quelques Aran. nouv.*
in *Ann. Sc. nat.*, XXII^o, p. 358, tav. X, fig. 1, sub: *Aranea*.

Hab. — Portogallo, Francia, Corsica, Asinara, Sardegna, St. Antioco,
Vacca, Italia continentale, Capri, Pantellaria, Lampedusa, Tunisia, Egitto,
Grecia. Si ricorda per la prima volta di Sicilia.

31. **Zoropsis ocreata** (C. L. Koch.) 1841, in Wagner *Reis. in d. Regentsch.*
Algier, III^o, p. 212, sub: *Dolomedes*.

Hab. — Spagna, Francia, Corsica, Italia continentale, Capri, Sicilia,
Algeria.

32. **Chiracanthium pelasgicum**, C. Koch, 1837. *Uebers. Arachn. Syst.*,
I^o, p. 9, sub: *Bolyphantes*.

Hab. — Portogallo, Spagna, Francia, Corsica, Italia continentale, Capri,
Sicilia, Algeria, Tunisia, Egitto, Palestina, Grecia.

33. **Drassus cerdo**, Thor., 1875. *Diagn. Aran. Europ.* in *Tijdshr. v. Entom.*,
Deel XVIII^o, p. 97 (17).

Hab. — Italia continentale. Nuovo per la Sicilia.

34. **Dysdera crocota**, C. L. Koch, 1839. *Arachn.* V^o, p. 81, tav. CLXXI,
fig. 392-94.

Hab. Italia continentale, Topi, Pianosa, Montecristo, Sardegna, Vacca,
Nisida, Capri, Sicilia, Galita, Galitone, Algeria, Pantelleria, Egitto, Grecia,
Turchia.

35. **D. Cambridgii**, Thor. 1873. *Rem. Syn.* p. 465.

Hab. — Francia, Italia continentale, Turchia. Nuova per la Sicilia.

36. **Filstata testacea**, Latr. 1810. *Consider. gén.*, p. 121.

Hab. — Spagna, Francia, Italia, Sardegna, St. Antioco, Capri, Tenoriffa,
Algeria, Tunisia, Tripoli, Egitto, Palestina, Asia minore, Candia, Grecia.
Finqui non ricordata di Sicilia.

37. **Cyrtachenius Doleschallii**, Auss. 1871. *Beitr. zur Kennin. Arachn.*
fam. Territelariae, p. 46 (162); *Zweit. Beitr.*, tav. V^a, fig. 2.
Hab. — Sicilia, Tunisia.
38. **Nemesia caementaria** (Latr.) 1798. *Extr. d'un mém. sur la fam. des*
Araign. mineuses in *Bull. Soc. Phil.* II^o, p. 169, fig. 1, A-F.
Hab. — Spagna, Francia, Italia continentale, Corsica, Sardegna, Capri,
Sicilia, Lampedusa, Algeria.
39. **Micrommata ligurina** (C. L. Koch) 1845. *Arachn.*, XII^o, p. 89, fig. 1020,
sub: *Sparassus*.
Hab. — Portogallo, Spagna, Francia, Corsica, Italia continentale, St. An-
tioco, Tunisia, Grecia, Dalmazia. Nuova per la Sicilia.
40. **Sparassus spongitarsis** (L. Duf.) 1820. *Descr. de six Arachn. nouv.*,
in *Ann. Sc. phys.*, IV^o, p. 12, tav. 69, fig. 6, sub: *Micrommata*.
Hab. — Spagna, Francia, Corsica, Italia continentale, Capri, Sicilia, Al-
geria, Tripoli.
41. **Artanes margaritatus** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 130, pl. 6, tab. 3,
sub: *Araneus*.
Hab. — Francia, Italia. Non mai ricordata di Sicilia.
42. **Philodromus aureolus** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 133, pl. 6, tab. 9,
sub: *Araneus*.
Hab. — Portogallo, Francia, Italia, Corsica. Non per anco citato di Sicilia.
43. **Thomisus albus** (Gmel.) 1778 in Linne, *Syst. nat.*, ed. 13^a, I^o. V, p. 2961,
sub: *Aranea*.
Hab. — Portogallo, Francia, Corsica, Sardegna, Italia continentale,
Pianosa, Capri, Ischia, Sicilia, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Palestina,
Asia minore, Candia, Grecia, Turchia, Istria.
44. **Misumena vatia** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 128, pl. 6, tab. 5,
sub: *Araneus*.
Hab. — Francia, Italia continentale, Capri, Sicilia, Algeria, Grecia, Candia
Turchia.
45. **M. Savignyl** (E. Simon) 1875. *Les Arachn. de France*, tom. II^o, p. 205,
sub: *Heriaeus*.
Hab. — Spagna, Francia, Corsica, Italia continentale, Ischia, Capri,
Sicilia, Algeria.

46. **M. truncata** (Pall.) 1772. *Spicil. zool.* 9, p. 47, tab. 1, fig. 15, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Italia continentale, Corsica, Algeria, Egitto, Palestina, Candia, Turchia, Istria. Nuova per la Sicilia.

47. **Diae globosa** (Fabr.) 1775. *Syst. Entom.* p. 432, sub: *Aranea*.

Hab. — Portogallo, Spagna, Francia, Italia continentale, Gorgona, Elba, Corsica, Sardegna, Ischia, Capri, Sicilia, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Palestina, Candia, Turchia, Dalmazia, Istria.

48. **Xysticus lateralis** (Hahn) 1831. *Arachn.* I^o, p. 40, tav. X, fig. 31, sub: *Thomisus*.

Hab. — Francia, Corsica, Italia continentale, Istria, Turchia.

49. **X. acerbus**, Thor. 1872, *Rem. on Synon.*, p. 237, nota 1.

Hab. — Francia, Corsica, Turchia. Nuovo per la Sicilia.

50. **X. horticola**, C. Koch, 1837, *Uebers. d. Arachn. Syst.*, I^o, p. 26.

Hab. — Francia, Italia continentale, Corsica. Nuova per la Sicilia.

51. **Tarentula albofasciata** (Brullè) 1832. *Exped. scient. de Morée, Zool.* III^o, p. 54, tav. XXVIII, fig. 7, sub: *Lycosa*.

Hab. — Portogallo, Spagna, Francia, Italia continentale, Corsica, Sardegna, Capri, Ischia, Sicilia, Algeria, Tunisia, Tripoli, Palestina, Asia minore, Turchia, Grecia, Dalmazia.

52. **T. radiata** (Latr.) 1817. *Nouv. Dict. hist. nat.*, 2^a ed., XVIII^o, p. 292. sub: *Lycosa*.

var. **maxima**, E. Simon, 1876. *Arachn. d. France*, tom. III^o, p. 244-45 (*Lycosa radiata*).

Hab. — Spagna, Francia, Corsica, Italia continentale, Pianosa, Monte-cristo, Caprera, Sardegna, Vacca, Capri, Sicilia, Marocco, Algeria, Tunisia, Galita, Egitto, Asia minore, Grecia, Turchia.

53. **T. andrenivora** (Walck.) 1825. *Fn. franc., Arachn.*, p. 23, tav. 3, fig. 2, 3.

Hab. Francia, Italia continentale, Dalmazia, Sicilia.

54. **T. pulverulenta** (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 93, pl. 4, tab. 6, sub: *Araneus*.

Hab. — Spagna, Francia, Italia continentale, Sardegna, Algeria, Siria. Non peranco citata di Sicilia.

55. **Trochosa cinerea** (Fab.) 1793. *Entom. syst.* II^o, p. 423, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Italia continentale, Dalmazia. Non mai ricordata di Sicilia.

56. *Ocyale mirabilis* (Clerck) 1757. *Sv. Spindl.*, p. 108, pl. 5, tab. 10,
sub: *Araneus*.

Hab. — Portogallo, Spagna, Francia, Italia continentale, Montecristo,
Corsica, Sardegna, Ischia, Madera, Algeria, Tunisia, Grecia, Turchia. Nuovo
alla Sicilia.

57. *Oxyopes transalpinus* (Walck.) 1806-08. *Hist. nat. d. Aran.*, fas. 2,
tav. 8; Simon, *Arach. d. Franc.*, tom. III^o, p. 217 (*O. lineatus*, Latr.)

Hab. — Spagna, Italia continentale, Francia, Corsica, Sardegna, Ischia,
Sicilia, Grecia, Asia minore, Palestina.

58. *O. lineatus*, Latr. 1806. *Gen. Crust. Ins.*, I^o, p. 117, tav. V, fig. 5.

Hab. — Spagna, Francia, Italia continentale, Capraia, Corsica, Algeria,
Tunisia, Egitto, Palestina, Grecia, Istria. Nuovo per la Sicilia.

59. *O. ramosus* (Panz.) 1804. *Syst. Nomencl.* p. 165.

Hab. — Francia, Italia continentale. Non è citata di Sicilia.

60. *Eresus Audouinii*, Brullè, 1832. *Expéd. Mor.* III^o, I. 2, p. 51, tav. XXVIII,
fig. 10.

Hab. — Italia continentale, Istria, Dalmazia, Sicilia, Algeria, Grecia.

61. *E. frontalis*, Latr. 1816. *Nouv. Dict. hist. nat.*, 2^a ed., X^o, p. 393.

Hab. — Spagna, Francia, Italia continentale, Istria, Sicilia, Algeria,
Tunisia, Gerba, Egitto, Grecia, Corfù,

62. *Heliophanus flavipes* (Hahn) 1831. *Arach.* I^o, p. 66, tav. XVII, fig. 50,
sub: *Salticus*.

Hab. — Francia, Italia continentale, Dalmazia, Corsica, Capri. Non ancora
indicato della Sicilia.

63. *H. furcillatus*, Simon, 1867. *Monogr. d. Attides*, p. 696 (230).

Hab. — Italia meridionale, Sicilia, Corfù.

64. *H. aeneus* (Hahn) 1831. *Arach.*, I^o, p. 65, tav. XVII, fig. 49, sub: *Salticus*.

Hab. — Francia. Nuova per la Sicilia.

65. *Ballus depressus* (Walck.) 1802. *Faune paris.*, II^o, p. 242, sub: *Aranea*.

Hab. — Francia, Italia continentale, Capri. Non lo trovai ricordato di
Sicilia.

66. **Menemerus semilimbatus** (Hahn) 1829. *Monogr. d. Spinn.* 5, tav. 3,
fig. B, sub: *Salticus*.

Hab. — Portogallo, Spagna, Francia, Italia continentale, Corsica, Sardegna, Ischia, Nisida, Capri, Lipari, Sicilia, Pantelleria, Algeria, Tunisia, Galita, Egitto, Palestina, Grecia, Corfù, Dalmazia.

67. **Philaeus chrysops** (Poda) 1761. *Ins. Mus. Graec.*, p. 123.

Hab. — Spagna, Francia, Italia continentale, Corsica, Ischia, Capri, Sicilia, Algeria, Palestina, Siria, Penisola Sinaitica, Turchia, Grecia, Corfù, Dalmazia, Istria.

68. **Icius notabilis** (C. L. Koch) 1846. *Arachn.*, XIII^o, p. 174, tav. CCCCLX,
fig. 1225, sub: *Icelus*.

Hab. — Spagna, Francia, Italia continentale, Corsica, Capri, Sicilia, Algeria.

69. **Attus jucundus** (Lucas) 1845-47. *Expl. Alg. Artic.*, I^o, p. 146, *Aracn.*,
tav. 6, fig. 8, sub: *Salticus*.

Hab. — Portogallo, Spagna, Francia, Italia continentale, Corsica, Gorgona, Giannutri, Ischia, Capri, Sicilia, Algeria, Tunisia, Galita, Siria, Timos, Grecia, Corfù, Dalmazia.

70. **Acantholophus echinatus** (Lucas) 1845-47. *Expl. Alg. Artic.* I^o, p. 298,
Aracn. tav. 19, fig. 2, sub: *Phalangium*.

Hab. — Francia, Algeria. Nuovo per la fauna italiana.

71. **Obisium muscorum**, Leach, 1817, *Zool. Miscell.* III^o, p. 51, pl. CXLIV.

(*Obisium muscorum*, C. Koch).

Hab. — Francia, Italia continentale, Corsica, Algeria, Grecia. Inedito di Sicilia.

72. **Obisium simile**, L. Koch, 1873. *Darst. Eur. Chernet.*, p. 58.

Hab. — Francia, Italia continentale, Corsica. Nuovo per la Sicilia.

Dal Laboratorio Zoologico della R. Università di Pavia, giugno 1881.